Dix regards sur la mathématique contemporaine

Yves André

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

© Spartacus-Idh 2021

Spartacus Supérieur
Nouvelles visions des sciences

Dix regards sur la mathématique contemporaine

Yves André

2021

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Spartacus IDH

Collection dirigée par :

Giuseppe Longo, mathématicien et épistémologue, est DR émérite CNRS à l'ÉNS, Paris. Il a été chercheur et a enseigné à l'université de Pise, et, aux USA, au MIT, à Berkeley et à Carnegie Mellon University.

Maël Montévil, théoricien de la biologie et épistémologue, est chercheur à l'Institut de Recherche et d'Innovation. Il a été chercheur à l'ÉNS, à Tufts University, à l'Université Paris 1 et à l'Université Paris 7.

Matteo Mossio est chargé de recherche en philosophie des sciences au CNRS. Il est membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST, CNRS/Paris 1), à Paris.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

ISBN : 978-2-36693-078-8
© Spartacus-idh, Paris 2021

an die Glasperlenspieler

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

© Spartacus-Idh 2021

Sommaire

Introduction ix

I Infini 1

II Espace I 15

III Espace II 33

IV Temps 51

V Symétries I. 61

VI Symétries II 75

VII Singularités 91

VIII Dualité I. 105

IX Dualité II 115

X Épilogue 123

Index & glossaire 131

Table des matières 139

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

© Spartacus-Idh 2021

Introduction

Ce petit livre recueille et complète les « leçons de Mathématiques contemporaines » données par l'auteur à l'IRCAM [1] autour de 2007–2009, devant un public d'intellectuels venant d'horizons divers (musiciens, musicologues, informaticiens, physiciens, architectes, plasticiens, philosophes, psychanalystes,... et quelques mathématiciens).

Son propos est de donner accès à la pensée mathématique d'aujourd'hui, en présentant, au cours de chaque leçon, un concept central, une idée-force des Mathématiques contemporaines à des non-mathématiciens.

Il ne s'agit pas d'un cours au sens usuel : il n'y a ni parcours graduel, ni visée de transmission d'un quelconque savoir-faire mathématique. Il ne s'agit pas non plus d'une introduction historique, d'un essai philosophisant, d'une apologie, d'une anthologie, d'un survol panoramique [2].

En dépit de son titre, ce n'est pas davantage un ouvrage de vulgarisation. Certes, il existe des exemples réussis de vulgarisation qui, évitant les lieux communs rabachés sur un ton guilleret (les Mathématiques sont partout...), ne se contentent pas d'amusettes de mathématiques récréatives pour allumer la curiosité mais offrent les éléments d'une sérieuse culture générale mathématique ; ils invitent en douceur à d'authentiques voyages sur les terres de l'Algèbre, de la Géométrie ou de l'Analyse, et permettent parfois d'en apercevoir quelque sommet, même si le souci pédagogique les confine souvent aux Mathématiques anciennes ou classiques.

Ce livre se situe sur un tout autre plan. Basé sur la conviction que les Mathématiques sont une pensée [3] avant d'être une technique (ou un jeu), son objectif est précisément de contribuer à *ouvrir cette pensée vivante méconnue à d'autres formes de pensée contemporaines*, dans l'espoir de susciter des résonances (ou mieux : des r*ai*sonances, selon le mot de F. Nicolas, c'est-à-dire des résonances de pensée entre raisons hétérogènes, émancipées du schème modélisation/application).

(1) Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Paris.

(2) Encore que l'on puisse peut-être tirer de ces pages une table d'orientation pour un assez vaste pan des Mathématiques contemporaines. Pour une présentation organique des notions et résultats de base des Mathématiques, nous recommandons le livre *Mathematics, Form and Function* de S. MacLane : cet ouvrage limpide et extrêmement soigné permet d'acquérir rapidement un solide bagage mathématique. Pour une anthologie ou un panorama de sujets plus contemporains, on pourra consulter un recueil de conférences d'initiation par divers auteurs, tel que *Leçons de mathématiques d'aujourd'hui*, vol. I, II, Cassini. Contrairement au présent livre, ces ouvrages s'adressent d'abord à un public d'étudiants en Mathématiques.

(3) En contradiction frontale avec la thèse 6.21 du Tractactus Logico-philosophicus de Wittgenstein : « Les théorèmes mathématiques n'expriment aucune pensée ». Pour un réquisitoire contre ce type de thèse péremptoire (qui n'est bien sûr jamais le fait d'auteurs de théorèmes sérieux) et pour une défense-illustration de l'importance de la pensée mathématique pour la philosophie, on pourra consulter l'article « Mathématiques et Philosophie » d'A. Badiou, revue Failles, n° 2 (2006).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Pour mieux saisir la singularité de ce projet mené à l'IRCAM, on peut imaginer ce que serait le projet « symétrique » : donner accès à la Musique d'aujourd'hui à des non-connaisseurs (par exemple mathématiciens), non par le biais d'un cours intensif de solfège ou d'un discours musicologique, mais par une confrontation, préparée, aux œuvres elles-mêmes — et non pas à des versions édulcorées ou rabougries, voire maculées de fausses notes au prétexte qu'elles s'adresseraient à des non-initiés.

L'analogie laisse penser que la compréhension passe par une phase de « choc » qu'il s'agit de dépasser. Elle suggère de ne pas chercher à s'approprier le contenu de ces leçons sur le mode des dictées musicales, mais de *construire sa propre écoute*.

Dans l'antiquité, les Mathématiques passaient pour le modèle réalisé de l'idéal d'une raison commune. Comment en sont-elles venues à passer pour le discours le plus impénétrable ? Comment retrouver, après des siècles de divorce, une intelligibilité commune entre mathématiques, philosophie et arts libéraux ? Comment renouer le dialogue entre raisons désormais hétérogènes ?

À cet égard, on ne peut tout à fait compter sur la vulgarisation, qui s'adresse à un fictif « public général » et diffuse un discours calibré mais de seconde main. Nous misons ici sur une compréhension « par osmose », ce qui ne nous paraît pas plus extravagant que la croyance à l'impénétrabilité de la pensée mathématique (quelle que soit la technicité de son expression, c'est tout autre chose).

Construire sa propre écoute, ou sa propre lecture, c'est d'ailleurs ce qu'ont coutume de faire les mathématiciens pour leur propre compte. « La magie de la fiction narrative n'opère que si le lecteur feint de croire ce que l'auteur feint d'asserter : il n'y a pas de "plaisir du texte" pour les mauvaises têtes. [...] Le ressort du texte mathématique est très exactement contraire : son lecteur idéal est le lecteur vicieux et malveillant qui résiste aux suggestions de l'auteur en essayant systématiquement d'envisager d'autres mondes possibles que ceux qu'il avait en tête. » (4)

Les sept principes directeurs de ce projet sont les suivants.

1. Parmi les éléments constitutifs des mathématiques vivantes (formation de concepts, raisonnement, calcul...), c'est l'*élément conceptuel* que nous privilégierons, presque exclusivement.

2. Les concepts fondamentaux dont il s'agira seront non seulement situés, mais effectivement *présentés*. Il ne sera donc pas question de se contenter de les enrober d'un discours décoratif et métaphorique, mais d'aller « à la chose même ». Nous essaierons en contrepartie de réduire les détails techniques au minimum compatible avec cette rude exigence.

3. Pour atténuer l'impression d'hermétisme des Mathématiques si souvent alléguée, nous choisirons ces concepts fondamentaux sur le critère qu'ils condensent des points de vue mathématiques contemporains sur des *notions communes*, c'est-à-dire n'appartenant pas en propre aux Mathématiques. Les principales notions communes retenues ici sont :

infini, espace, temps, symétrie, singularité, dualité (5).

(4) J. et M. Dubucs, La couleur des preuves, in : *Structures rhétoriques en science*, P.U.F. 1994.

(5) Pour une fresque plus complète, il faudrait ajouter le thème tout aussi important du *hasard*, avec par exemple une leçon sur le mouvement brownien (P. Cartier s'est chargé de présenter ce thème à l'IRCAM en complément de ces leçons). Par ailleurs nous avons fait le choix, peu commun sans doute, d'exclure les thèmes directement apparentés à nos propres travaux (géométrie arithmétique, théories p-adiques, motifs...), de manière à prévenir les « erreurs de parallaxe » issues d'une confusion toujours à craindre entre prédilection et importance.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Chacun pourra confronter ces points de vue à ceux qui lui sont plus familiers (musicaux, architecturaux, philosophiques...) sur ces mêmes notions, disposer d'un point d'ancrage et, le cas échéant, puiser ou composer les *mathèmes* susceptibles d'inspirer ou soutenir ses propres objectifs de pensée et ses théorisations.

4. Nous nous attacherons à dessiner avec netteté les *mouvements de pensée et enjeux* entourant chacun de ces concepts. Quelques perspectives historiques seront évoquées ça et là, non pour elles-mêmes, mais comme moyen d'éclairer ces enjeux. Surtout, sans craindre le mélange des genres, nous nous évertuerons à restituer « ce surplus de sens que l'écriture formalisée croit bon d'évacuer, alors même que là gît l'essence de la pensée mathématique » [(6)].

5. Pour autant, nous ne nous priverons pas d'écrire quelques formules [(7)]. Elles joueront le même rôle que jouent en musique les courts extraits de partition dans une monographie, permettant de suivre et préciser le propos sans se substituer à lui : pas plus que le lecteur d'une telle monographie n'est censé « lire la musique », on ne supposera ici que le lecteur « lit les mathématiques ».

6. Les chapitres, très largement indépendants les uns des autres, pourront se lire dans le désordre ou, de préférence, en circulant de l'un à l'autre (l'index et le glossaire pourront aider en cas de désorientation passagère). Toutefois, les concepts présentés réapparaîtront discrètement sous diverses perspectives au fil des chapitres, de manière à favoriser une compréhension rétrospective et surtout à laisser entrevoir la fascinante et mystérieuse *unité* des Mathématiques (comme une intégration progressive dans un vaste contrepoint).

7. Enfin, sans tabler sur aucun prérequis mathématique (ce qui ne revient pas à nier le rôle d'une culture mathématique dans l'appropriation de ces leçons), nous supposerons le lecteur non seulement rompu à la pensée spéculative, mais aussi animé d'un fort intérêt *a priori*, d'une oreille aiguisée, pour la pensée mathématique en général et ses liens avec d'autres modes de penser.

Ce lecteur, cette lectrice, devineront que le poème de Mandelstam qui ouvre la première leçon n'est ni plus ni moins facile à « comprendre » dans sa concision que tel beau théorème contemporain ; que les deux sont même susceptibles de résonner, et qu'il est intéressant et peut-être important d'en écouter la résonance.

Paris, Septembre 2018.

(6) F. Patras, *La pensée mathématique contemporaine*, PUF 2001, p. 6.

(7) Communément bannies par les éditeurs d'ouvrages de vulgarisation au prétexte qu'elles font fuir le lecteur ; à l'aune de ce type de critère, ce petit livre pourrait passer pour un manifeste de mystagogie !

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Remerciements. Je remercie l'IRCAM et son directeur Frank Madlener, ainsi que le séminaire MaMuX d'avoir accueilli ce projet, qui s'inscrit dans le bouillon d'activités mathématiques-musique-philosophie (MaMuPhi) développées à partir du Forum Diderot 1999 de la Société Européenne de Mathématique. Je remercie Moreno Andreatta et François Nicolas d'en avoir assuré l'organisation avec beaucoup de dynamisme. Si le projet a pu aboutir, c'est grâce à la fidélité d'un public motivé et réactif.

Les nombreuses discussions avec F. Nicolas, acteur principal de MaMuPhi, son soutien et son enthousiasme constants m'ont été très précieux ; je lui en suis reconnaissant. C'est d'ailleurs sa demande impromptue, au château de Cerisy, d'un exposé de la théorie des facteurs de von Neumann de type II_1 moyennables (*cf.* chap. III) qui est à l'origine de ce projet — demande si surprenante de la part d'un compositeur qu'il eût été impensable de refuser !

Je remercie les collègues qui m'ont encouragé dans cette entreprise, particulièrement Pierre Cartier pour sa lecture critique très attentive et les corrections et suggestions qu'il m'a communiquées.

Enfin je remercie l'éditeur, qui en publiant ce livre risque peu d'être taxé de succomber à la facilité (« *Sed omnia præclara tam difficilia quam rara sunt* » — aujourd'hui comme du temps de Spinoza).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

« Des infinis subtils »

« Nous buvons la hantise des causes
dans le pétillement vénéneux de nos coupes
et nous frôlons de nos crochets
des infinis subtils comme une mort légère.
Mais où les jonchets s'entremêlent
l'enfant reste sans mots :
l'univers dort dans le berceau
d'une petite éternité. »

O. Mandelstam (1933), *Simple promesse* (1).

Les Mathématiques passent, pour de bonnes et de mauvaises raisons, pour la science de l'infini.

S'il est indéniable que l'infini est, de nos jours, le pain quotidien du mathématicien, sa mie n'est pas toujours tendre ; mais il a perdu sa croûte métaphysique, et avec elle la méfiance ou la répugnance qu'il inspirait aux mathématiciens, de l'antiquité jusqu'au début du XX^{e} siècle (2).

1 — L'infini(tésimal) et son calcul

1.1 — L'infini à penser — à propos du mouvement

Durant près de deux millénaires en effet, les mathématiciens, échaudés par les fameux paradoxes de Zénon, sont restés fidèles à la conception essentiellement négative de l'infini portée par la tradition philosophique grecque. En reprenant la distinction aristotélicienne, on peut dire qu'ils se sont prudemment rangés du côté du fini et de l'« infini en puissance », et ont constamment rejeté l'« infini en acte » (gouffre de perdition pour l'« évidence géométrique », voire pour la raison).

Ainsi, par exemple, Euclide n'énonçait pas : « il existe une infinité de nombres premiers », mais : « les nombres premiers sont plus nombreux que toute multiplicité donnée (sous-entendu : finie) de nombres premiers ».

Ce qui fit entrer « le loup dans la bergerie », dans la première moitié du XVII^{e}, ce fut le problème galiléen de la géométrisation du mouvement (*cf.* chap. IV, 1.1). La question du passage graduel du repos au mouvement et *vice-versa*, celle plus générale de l'indivisibilité de l'espace, du temps et du mouvement, semblaient faire ressurgir inexorablement les apories de l'infini en acte et le spectre des paradoxes de Zénon. Les savants de l'époque entreprirent alors de

(1) La Dogana, trad. L. Martinez, J.-C. Schneider, P. Jaccottet. « Des infinis subtils » est aussi le titre d'une œuvre pour piano de F. Nicolas, qui nous a fait découvrir ces vers de Mandelstam.
(2) Leçon MaMuX du 7 février 2009.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

répondre à l'exigence qui se posait de (re)penser l'infini, dans le cadre d'une intelligibilité géométrique.

Tandis que Pascal admettait dans la nature, en les soulignant,

> les merveilleuses infinités qu'elle a proposées aux hommes, non pas à concevoir mais à admirer ;

tandis que Descartes préconisait dans ses *Principes de la philosophie* (§26)

> qu'il ne faut point tâcher de comprendre l'infini, mais seulement penser que tout ce en quoi nous ne trouvons aucunes bornes est indéfini ;

Leibniz, dans sa *Théorie du mouvement abstrait* (antérieur de cinq ans environ à son invention du Calcul infinitésimal), expliquait quant à lui que le mouvement est un continu et

> [qu']il y a des parties données en acte dans le continu. [...] Celles-ci sont infinies en acte. [...] Des indivisibles ou inétendus sont donnés, sans quoi ni le commencement, ni la fin du mouvement et du corps ne sont concevables.

(Certes, plus tard Leibniz en rabattit un peu sous le feu de la critique, et ne défendit plus ces infinitésimaux qu'au titre de « fictions ».)

C'est sur fond de tels débats philosophiques, et dans le prolongement d'une intense activité autour de calculs de tangentes et d'aires, que Newton et Leibniz élaborèrent dans les dernières décennies du XVII^e^ leurs « calculs de l'infini » [3]...

> des œuvres où le futur souligne à nos yeux des manques, ceux des concepts de fonction, de variable, de continuité, de limite, de nombre réel, mais où la confiance dans un symbolisme tout neuf pour Leibniz, l'extraordinaire habileté arithmétique et algébrique pour Newton et l'unification des recherches antérieures pour les deux ont permis qu'une nouvelle étape soit franchie et vienne justement combler ces manques. C'est l'ambiguïté même de leurs positions, les lacunes de leurs concepts qui ouvrent un champ de recherches propres à les faire disparaître à leur tour [4].

1.2 — Calcul et écriture de l'infini

Il est très remarquable que la confrontation des mathématiciens à l'exigence de penser l'infini ait fait éclore, non pas (d'abord) un *concept* mathématique de l'infini, mais un *calcul* et une *écriture* de l'infini — de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand.

Le symbole ∞ lui-même, dû à Wallis (*Arithmetica infinitorum*, 1655), inaugure cette écriture opératoire et survivra jusqu'à aujourd'hui, tout comme les symboles leibniziens pour les différentielles $\mathrm{d}x$ et pour les intégrales $\int$ (pensées comme sommations d'une infinité d'éléments), et le symbole $\sum$ de sommation d'Euler. L'écriture ouvre et jalonne la voie du progrès conceptuel.

(3) « Calcul des fluxions » et « calcul différentiel » respectivement, assez différents d'esprit. Si le calcul de Leibniz (et de ses successeurs les Bernoulli) fait la part belle à l'algorithme, celui de Newton invoque une analyse des « premières et dernières raisons », ancêtre des limites. Sur tout cela, voir l'ouvrage *Reading the Principia* de N. Guicciardini (Cambridge 1999), qui mène le lecteur par la main, avec douceur, à travers les textes originaux de Newton, Leibniz et des Bernoulli, en faisant percevoir leurs échos réciproques.

(4) P. Raymond, La naissance du calcul infinitésimal, *Philosophie et calcul de l'infini* (Maspéro 1976), p. 72.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Écrire $\sum_1^\infty \frac{1}{2^n} = 1$, $\sum_1^\infty \frac{1}{n} = \infty$, $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = 1$, $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = \infty$, *etc* suppose déjà qu'on distingue clairement entre *processus opératoire infini* [ou non] (indiqué par le ∞ en haut du signe somme), et *résultat infini* [ou non] de l'opération (indiqué au membre de droite), et marque en particulier le dépassement des paradoxes de Zénon.

Euler place au cœur de l'Analyse la notion de *fonction*, et

> c'est avec une passion d'entomologiste qu'[il] consacre la plus grande partie de son œuvre en Analyse à découvrir sans cesse de nouvelles et surprenantes propriétés de fonctions particulières, qui excitent encore aujourd'hui notre admiration (5),

à commencer par la fonction exponentielle (6), dont la notation e^x absorbe et étend toute l'efficace souplesse de l'écriture algébrique des exposants (7).

Le lien entre calcul différentiel et calcul intégral s'écrit sous la forme compacte :

$$f(b) - f(a) = \int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \cdot \mathrm{d}x.$$

(rappelons que l'intégrale $\int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \cdot \mathrm{d}x$ représente, géométriquement, l'aire limitée par le graphe de f entre a et b (et par le segment $[a, b]$ de l'axe des x)). Si,

(5) Dieudonné, L'Analyse mathématique au dix-huitième siècle, *Abrégé d'Histoire des Mathématiques*, I, V.

(6) Cette fonction apparaît « toutes les fois que la pesanteur et la flexibilité agissent de concert » : comme l'ont montré simultanément Leibniz, Joh. Bernoulli et Huygens (1691), la courbe suivant laquelle s'infléchit une chaîne suspendue en deux de ses points non situés sur la même verticale est, non pas un arc de parabole comme a pu le croire un temps Galilée (*cf.* chap. IV, 1.2), mais un arc de *chaînette*, dont l'équation peut s'écrire $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. Elle a inspiré à l'entomologiste J.-H. Fabre cette page délicieuse (*Souvenirs entomologiques*, IX, 10, Les épeires. Géométrie de la toile) :

> C'est la forme d'un cordon souple que l'on abandonne à lui-même en tenant les deux bouts ; c'est la ligne qui régit la configuration d'une voile gonflée par le vent ; c'est la courbure de la sacoche à lait de la bique revenant de remplir sa traînante mamelle. Et tout cela fait appel au nombre e.
>
> Que de science abstruse pour un bout de ficelle ! N'en soyons pas surpris. Un grain de plomb qui oscille à l'extrémité d'un fil, une goutte de rosée qui ruisselle le long d'une paille, une flaque d'eau qui se ride aux caresses de l'air, un rien, en somme, exige un échafaudage de Titans lorsqu'il faut y plonger le regard du calcul. [...] Certes, nos méthodes d'investigation mathématique sont ingénieuses ; on ne saurait trop admirer les puissantes cervelles qui les ont inventées ; mais combien lentes et pénibles en face des moindres réalités ! Ne nous sera-t-il jamais donné de scruter le vrai de façon plus simple ? L'intelligence pourra-t-elle un jour se passer du lourd arsenal des formules ? [...]
>
> Voici que l'abracadabrant nombre e reparaît, inscrit sur un fil d'araignée. Considérons, par une matinée brumeuse, le réseau qui vient d'être construit pendant la nuit. À cause de leur hygrométrie, les gluaux se sont chargés de gouttelettes et, fléchissant sous le poids, sont devenus autant de chaînettes, autant de chapelets de gemmes limpides, gracieux chapelets rangés en ordre exquis et retombant en courbes d'escarpolette. Si le soleil perce le brouillard, l'ensemble s'illumine de feux diaprés et devient splendide girandole. Le nombre e est dans toute sa gloire. La géométrie, c'est-à-dire l'harmonie dans l'étendue, préside à tout. Elle est dans l'arrangement des écailles d'un cône de pin comme dans l'arrangement des gluaux d'une épeire, elle est dans la rampe d'un escargot, dans le chapelet d'un fil d'araignée, comme dans l'orbite d'une planète ; elle est partout, aussi savante dans le monde des atomes que dans le monde des immensités.

(7) C'est encore Euler qui introduit la notation $i = \sqrt{-1}$, impose la notation $\pi = 3,14...$, et découvre la formule $e^{\pi i} = -1$.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

suivant Lagrange, on pense à $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ comme à une nouvelle fonction, la *dérivée* de f (la pente de la tangente du graphe, ou, en cinématique, la vitesse), toute référence à l'infini a disparu de cette formule. Le calcul s'oriente alors vers celui des dérivées et des primitives, et vers la résolution des équations différentielles, porté par un symbolisme affuté, aussi élégant qu'efficace.

1.3 — L'Analyse du XVIII^{e} et la maîtrise du calcul

Le développement de la puissance et de la cohérence opératoire du Calcul infinitésimal au XVIII^{e} s'accompagne d'un double mouvement de conquête de nouveaux territoires en aval et d'élucidation de ses propres fondements en amont.

Longtemps, en effet, on a louvoyé avec l'infini, comme en témoignent les traités successifs encombrés d'avertissements, explications et réponses aux objections à propos des infinitésimaux, bien plus proches en cela de la tradition métaphysico-théologique que du grand style géométrique hérité des grecs, comme le fait remarquer non sans malice l'évêque G. Berkeley dans son pamphlet *The Analyst* (1734).

Le nouveau calcul essuie, à son grand profit, les critiques de théologiens attendues, puisque la notion d'infini actuel, logico-métaphysique chez Aristote, avait pris une très forte connotation théologique chez les Scolastiques, de philosophes, et aussi et surtout de géomètres. Voici par exemple la critique bien sentie de MacLaurin [8] à propos de la « Géométrie de l'infini » de ses prédécesseurs (parfois appelée « Géométrie sublime » par ses thuriféraires !) :

> En voulant ainsi élever la Géométrie, il peut bien se faire qu'on la dégrade et qu'on la dépouille du caractère qui lui est propre, et qui consiste dans l'évidence la plus parfaite. Car une idée aussi arbitraire [que des quantités infinies de divers ordres, voire intermédiaires entre finies et infinies, entre nulles et non nulles] ne laisse dans l'esprit que des connaissances obscures et imparfaites, au lieu de la clarté qui résulte des démonstrations vraiment géométriques. C'est de là que vient le penchant que l'on a fait paraître dans ces derniers temps d'introduire des mystères dans une science où tout doit être démontré.

À la fin du siècle, l'Analyse a relevé le défi et revendique hautement le non-recours à l'exutoire de l'infini métaphysique, comme en témoigne le titre de l'ouvrage de Lagrange : *Théorie des fonctions analytiques contenant les principes du calcul différentiel, dégagés de toute considération d'infiniment petits ou d'évanouissants, de limites ou de fluxions, et réduits à l'analyse algébrique des quantités finies* (1797) [9].

(8) *Treatise of fluxions*, 1742. Cité par P. Raymond, *op. cit.*

(9) Il faut sans doute ouvrir ici une parenthèse anachronique sur la prétendue « analyse non-standard », compte tenu de l'incroyable publicité dont elle a joui. Reposant sur des principes bien établis en Logique et en Théorie des ensembles (ultraproduits), elle a tendance à glisser vers un combat d'arrière-garde pour « justifier les indivisibles » des débuts du Calcul infinitésimal, sans regard épistémologique critique sur les liens supposés entre ses « néo-infinitésimaux » et ceux, fort divers, des anciens. Loin des problèmes qui drainent l'Analyse contemporaine, il n'est pas étonnant que ses contributions y soient minimes, mais elle s'est bien vendue auprès d'épistémologues friands de curiosités « non-standard ». Dieudonné ironisait sur cette tendance qui

> consiste à consacrer beaucoup de développements aux courants d'idées hétérodoxes [...], qui n'influencent pas plus d'un mathématicien sur cent, et à négliger complètement ce que font les quatre-vingt-dix-neuf autres.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Du côté des philosophes, c'est Hegel (lecteur attentif de Lagrange) qui a pris la mesure de la hardiesse du Calcul infinitésimal comme réponse mathématique aux problèmes de l'infini dépassant les conceptions métaphysiques classiques.

> Dans une perspective philosophique, l'infini mathématique est important pour cette raison qu'en fait c'est le concept de l'infini véritable qui se trouve à son fondement, et qu'il se tient beaucoup plus haut que ce qu'habituellement on appelle l'infini métaphysique, à partir de quoi sont faites des objections contre le premier (10).

Il conclut que c'est à la Philosophie qu'il revient toutefois d'élucider le concept dialectique de l'infini que les Mathématiques ont dégagé et mis en œuvre.

1.4 — L'Analyse du XIX^{e} et la rigueur du calcul

Les acquis du calcul infinitésimal à la fin du XVIII^{e} sont éclatants (11). Si éclatants que Lagrange a pu écrire — enthousiasme ou pessimisme ? — qu'il

> reste peu de moyens de faire de grands progrès avec l'Analyse dans l'état actuel où elle se trouve (12).

Une période de stagnation a suivi en effet, où l'on s'est rendu compte que l'on s'était débarrassé à trop bon compte des difficultés liées aux infinitésimaux. D'Alembert notait déjà que Euler se souciait

> d'agrandir l'édifice plus que d'en éclairer l'entrée.

Si l'algébrisation progressive de l'Analyse, poussée par Lagrange, avait évacué les mystères de l'infini, le caractère trop formel des opérations symboliques du calcul infinitésimal et l'usage immodéré des développements en séries laissait planer une ombre sur les fondements ; et tout particulièrement sur la faculté même d'une fonction d'être développée en série de puissances (son analyticité).

En entreprenant d'éclairer « l'entrée de l'édifice », Bolzano puis Cauchy se sont vus contraints de penser à nouveaux frais les notions de fonction continue et de limite (ces limites que Lagrange se faisait fort de contourner !).

Pour eux, une fonction (d'une variable x) est *continue* en un point x_0 si la valeur absolue de la différence $f(x) - f(x_0)$ décroît indéfiniment avec celle de $x - x_0$. On peut, suivant Weierstrass, exprimer cette condition de manière encore plus explicite (ou plus pédante) : pour tout nombre réel $\epsilon > 0$, il en existe un autre δ tel que $|x - x_0| < \delta$ implique $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

De même, la notion de *limite* est posée, aussi transparente et non métaphysique, et l'*intégrale* est rigoureusement construite (Cauchy, Riemann).

(10) Science de la Logique, remarque suivant l'infinité du quantum.

(11) citons les séries trigonométriques $\sum_0^\infty a_n e^{inx}$, le calcul des variations et l'équation de Euler-Lagrange $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}\right)$, les développements asymptotiques, l'application du Calcul infinitésimal à l'étude et parfois à la résolution des équations différentielles à une ou plusieurs variables...

(12) cité par P. Dugac, Fondements de l'analyse, in *Abrégé d'histoire des mathématiques*, VI. Hermann 1978.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Pour finir de bâtir solidement l'édifice de l'Analyse classique, pour achever ce qu'on appelait « l'arithmétisation de l'Analyse » et comprendre à fond le continuum, il ne restait plus qu'une tâche : élucider la notion même de *nombre réel*.

Cette tâche fut menée à bien, quelques 200 ans après les débuts du Calcul infinitésimal, par Weierstrass, Méray, Dedekind et Cantor [13].

Ainsi, au bout de deux siècles et demi d'efforts, les mathématiciens, initialement confrontés à l'exigence de penser l'infini sur fond problématique du continu et du mouvement, ont produit, en s'abstenant de forger un concept mathématique de l'infini, un calcul de l'infini, *calcul dont l'approfondissement les a conduits à un* concept mathématique du continu (*nombres réels et fonctions continues*).

2 — Les multiplicités infinies et leur mesure

2.1 — Dedekind et Cantor

C'est à ce moment, où l'on pouvait croire l'infini actuel définitivement délogé des Mathématiques, à ce point précis où l'on achevait « l'arithmétisation de l'Analyse », que « le loup entra de nouveau dans la bergerie ». Non plus au niveau des grandeurs numériques, mais au niveau des multiplicités, des ensembles.

En effet, les constructions du continu à partir des nombres entiers et des nombres rationnels brisaient un tabou — elles faisaient intervenir inexorablement des multiplicités infinies en acte —, et s'y brisaient elles-mêmes en tant que tentatives de ramener le continu au fini illimité. La construction de Dedekind, par exemple, assimilait un nombre réel à une totalité infinie de nombres rationnels : précisément, à un ensemble de nombres rationnels formant intervalle sans extrémités, borné inférieurement et non borné supérieurement.

Cette intrusion *in extremis* de l'infini actuel si longtemps traqué convainquit les mathématiciens de son irréductibilité.

Faute de pouvoir le chasser, il s'est agi alors de le domestiquer — c'est-à-dire d'apprendre *à connaître et maîtriser les multiplicités infinies, et à en prévenir les paradoxes*. C'est l'objet de la Théorie des ensembles, dont Dedekind et Cantor sont les fondateurs [14] (on oublie trop souvent le premier).

Une fois admis l'existence d'ensembles infinis et légitimé leur emploi, la confrontation de Dedekind et Cantor à l'axiome euclidien « le tout est plus grand que la partie » les conduit tout d'abord à préciser ce que « plus grand » peut vouloir dire dans le cas d'ensembles éventuellement infinis.

(13) Il restait encore à définir rigoureusement les *nombres entiers* « naturels » eux-mêmes, ce qu'a fait Peano (1889) — on oublie trop souvent ce « fin mot » de l'histoire du nombre (oubli qui qui, nous ramenant au point de départ, complète parfaitement le cycle (comparer avec les tentatives de fondation des nombres rapportées dans le livre N de la *Métaphysique* d'Aristote : solution différente, mais souci identique ou presque). Au reste, « fin mot » est abusif : il restait enfin à définir rigoureusement *l'égalité* elle-même — problème qui remonte au moins aux indiscernables de Leibniz, qui a reçu très récemment une réponse dans la théorie des fondements univalents de V. Voevodsky.

(14) La construction des nombres réels n'est d'ailleurs pas la seule source de la théorie : l'arithmétique des idéaux de Dedekind (1871), ensembles infinis sujets à des opérations algébriques, comme des nombres, en est une autre. L'étude de Cantor (1871) des parties de $\mathbb{R}$ où les séries de Fourier s'annulent, une autre encore.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Réponse : un ensemble A est (strictement) « plus grand » qu'un autre B s'il existe une application injective de B dans A (c'est-à-dire une règle associant à tout élément de B un élément de A, des éléments distincts de B correspondant par cette règle à des éléments distincts de A ; de sorte qu'on peut identifier B, au moyen d'une telle règle, à une partie de A), mais pas dans l'autre sens.

Par exemple, Cantor observe que l'ensemble des parties d'un ensemble est toujours « plus grand » que cet ensemble. Il observe aussi qu'étant donnés deux ensembles qui ne sont pas en bijection (*cf.* chap. II, 1.5), il y en a forcément un qui est « plus grand » que l'autre.

Dedekind et Cantor montrent que l'axiome euclidien caractérise en fait les ensembles finis. D'où un renversement de perspective : au lieu de concevoir négativement l'infini comme « apeiron » (in-fini, illimité), est déclaré *infini* tout ensemble A qui est en bijection avec une de ses parties $B \neq A$.

2.2 — Le transfini. Procession des ordinaux et cardinaux

Cantor est allé plus loin et a introduit des *nombres transfinis*, initiant une *combinatoire de l'infini*. Les entiers naturels servent d'une part à mesurer la taille d'un ensemble fini et d'autre part à repérer la position d'un terme dans une suite. Dans le domaine transfini, ces deux usages sont portés par des notions distinctes : les *cardinaux* et les *ordinaux*.

Les cardinaux sont associés aux ensembles amorphes, c'est-à-dire sans structure supplémentaire : deux ensembles en bijection ont même cardinal. Le premier cardinal transfini, noté $\aleph_0$, est celui de l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. Le cardinal $2^{\aleph_0}$ de l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ est aussi celui du continu, c'est-à-dire de l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels. La relation « être plus grand que » entre ensembles ordonne les cardinaux en une « procession ».

Les ordinaux sont associés aux ensembles *bien ordonnés*, c'est-à-dire munis d'un ordre total pour lequel toute partie a un minimum. Le premier ordinal transfini, noté ω, est celui de $\mathbb{N}$ avec son ordre naturel : $0 < 1 < 2 < \ldots$. On peut effectuer des opérations sur les ordinaux : addition, multiplication, puissance. Par exemple, $\omega + 1$ est $\mathbb{N}$ auquel on ajoute un élément $+\infty$ plus grand que tous les précédents. S'ensuit toute une procession : $\omega + 2, \ldots, \omega + \omega = \omega \times 2, \ldots, \omega^2, \ldots, \omega^\omega, \ldots, \omega^{\omega^\omega} \ldots$

2.3 — L'infini derrière le fini. La patience de Goodstein

« une petite éternité. »



Voici un jeu de patience fort simple, inventé par le logicien R. Goodstein, qui se joue non pas avec des cartes, mais avec des chiffres. Il est basé sur l'écriture en base b itérée. On part de l'écriture en base b, puis on écrit tous les exposants en base b, de même pour les exposants des exposants, etc. Par exemple, l'écriture en base 2 itérée de 25 est $2^{2^2} + 2^{2+1} + 1$.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

On « pioche » pour commencer un entier $n > 0$, qu'on écrit en base 2 itérée. On change tous les 2 en 3 (par exemple $25 = 2^{2^2} + 2^{2+1} + 1$ devient $3^{3^3} + 3^{3+1} + 1 = 7625597485069$), et puis *on retranche* 1.

On écrit derechef le nombre ainsi obtenu en base 3 itérée (ce qui dans l'exemple donne $3^{3^3} + 3^{3+1}$), puis on change tous les 3 en 4, et on retranche 1, etc.

Par convention, le jeu s'arrête dès qu'on tombe sur 0, si jamais...

Ainsi, si l'on part de $n = 1$, on obtient la séquence

$$1 \rightsquigarrow 1 - 1 = 0,$$

qui s'arrête immédiatement. Pour $n = 2$, on a la séquence

$$2^1 \rightsquigarrow 3^1 - 1 = 2 \rightsquigarrow 2 - 1 = 1 \rightsquigarrow 0.$$

Le jeu s'arrête dès la troisième étape. Pour $n = 3$, on a la séquence

$$3 = 2^1 + 1 \rightsquigarrow 3^1 + 1 - 1 = 3 \rightsquigarrow 4^1 - 1 = 3 \rightsquigarrow 2 \rightsquigarrow 1 \rightsquigarrow 0.$$

Le jeu s'arrête à la cinquième étape. Pour $n = 4$, on a la séquence

$$4 = 2^2 \rightsquigarrow 3^3 - 1 = 26 = 2\cdot 3^2 + 2\cdot 3^1 + 2 \rightsquigarrow 2\cdot 4^2 + 2\cdot 4^1 + 1 = 41 \rightsquigarrow 2\cdot 5^2 + 2\cdot 5^1 = 60 \rightsquigarrow 83...$$

Il s'avère que le jeu ne s'arrête qu'à l'étape $3\cdot(2^{402653211} - 1)$. Le jeu de patience traîne invraisemblablement en longueur lorsque n croît... Pourtant, le jeu s'arrête toujours. La « souris qui grignote » une unité à chaque étape finit par avoir raison des sauts gigantesques occasionnés par les changements de base itérée de b à $b + 1$. « Patience et longueur de temps... »

La démonstration qu'a donnée Goodstein (1944) de cet étonnant résultat passe par l'infini, comme suit. On observe que la fonction qui à l'écriture en base b d'un entier m associe l'ordinal obtenu en changeant tous les b en ω est croissante en m. Donc si l'on mime la patience en remplaçant, à chaque étape k, la base $b = k + 2$ par ω (au lieu de $b + 1$) puis en retranchant 1, on obtient une suite *strictement décroissante* d'ordinaux dénombrables, à cause de l'unité soustraite à chaque étape. Une telle suite aboutit nécessairement à 0, et il en est donc de même de la suite originale.

N'y aurait-il pas une démonstration plus standard, par récurrence, n'utilisant pas l'infini ?

Eh bien, non [15]. Le déroulement de l'algorithme est si lent — pire que ce que peut contrôler toute fonction de n définie par récurrence — qu'il échappe aux axiomes de Peano du fini : toute preuve du fait qu'elle s'arrête (toujours) requiert l'existence de l'ordinal infini ω.

On peut donc voir ce jeu d'innocente apparence comme un *reflet, dans le monde fini, de l'axiome de l'infini* ; mieux : comme un marqueur de la *suture ontologique entre fini et infini*.

Mais la présence de l'infini derrière le fini, en Mathématiques, ne se borne pas, tant s'en faut, à de tels exemples limites un peu artificiels.

La plus grande partie de la combinatoire finie témoigne de cette présence. Sa technique fondamentale, remarquablement efficace, est celle des *séries génératrices*. *Grosso modo*, s'agissant de dénombrer les configurations de tel ou tel

(15) Kirby et Paris, Bull. London Math. Soc. 14 (1982).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

type A, la méthode consiste à insérer A dans une hiérarchie de types de configurations A_n liées par des relations de récurrence, et à introduire la série $f(x) = \sum_1^\infty a_n x^n$ dont les coefficients a_n dénombrent les configurations de type A_n. Les récurrences se traduisent par une équation différentielle ou fonctionnelle satisfaite par $f(x)$. Même lorsque l'on ne sait pas (ou peut pas) résoudre explicitement l'équation, l'Analyse asymptotique permet souvent d'obtenir le comportement de $f(x)$ à l'infini, et partant, de bonnes estimations pour les a_n.

Au reste, la question du comportement de grands nombres issus de la combinatoire et des probabilités a été l'un des moteurs du développement de l'Analyse asymptotique [16] au XVIII[e].

2.4 — L'enjeu des grands cardinaux

Disons quelques mots de ces fameux grands cardinaux qui fascinent tant, pour des raisons souvent bien éloignées des enjeux proprement mathématiques.

Partant du cardinal $\aleph_0$ dénombrable, on forme la suite croissante de cardinaux

$$\aleph_0,\ 2^{\aleph_0}\ \text{(cardinal du continu)},\ 2^{2^{\aleph_0}},\ 2^{2^{2^{\aleph_0}}},\ldots$$

Deux questions se posent :

1) en bas de l'échelle, y a-t-il des cardinaux intermédiaires entre les deux premiers barreaux (entre le dénombrable et le continu) ? Plus généralement, y a-t-il des intermédiaires entre les barreaux ?

2) et en haut de l'échelle ? Y a-t-il des cardinaux au-delà ?

La question **1**) est indécidée (Cantor penchait pour la réponse négative : c'est l'*hypothèse du continu*). En fait, l'axiomatique usuelle des ensembles, ZFC (Zermelo-Fraenkel + axiome du choix), est trop faible pour la trancher, comme l'ont démontré Gödel et Cohen.

Ce résultat négatif n'est nullement une liquidation de la question 1), mais instille plutôt une critique de ZFC. Comment compléter ZFC devient un problème, qui est loin d'être réglé, mais l'histoire récente de la Théorie des ensembles montre qu'une réponse précise à la question **2**) est une clé. C'est la problématique des grands cardinaux [17].

Quoi qu'il en soit, le haut de l'échelle influe sur le bas ; le phare des grands cardinaux éclaire les eaux troubles entre le dénombrable et le continu, et c'en est le véritable enjeu pour les mathématiciens.

2.5 — (Non-)influence de la Théorie des ensembles sur les Mathématiques

Que retiennent les Mathématiques de tous ces travaux sur les multiplicités infinies ? La réponse est double, et assez tranchée.

(16) Formule sommatoire d'Euler-MacLaurin pour $\sum_0^n f(k)$, méthode de Laplace pour les intégrales $\int_0^\infty f(x)g(x)^n\,dx$, etc.

(17) Voir P. Dehornoy, Les travaux de Woodin sur l'hypothèse du continu, *Encyclopedia Universalis*, La science au présent 2004, p. 123–128.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

• En ce qui concerne l'usage et le langage (élémentaire) des ensembles, à la manière de Dedekind disons, ils ont envahi toutes les Mathématiques. L'usage des ensembles a ouvert la voie à la Topologie générale. D'autre part, le langage des ensembles, sous l'impulsion de Bourbaki notamment, a beaucoup contribué à la précision du langage mathématique en général. Les mathématiciens ont aussi retenu quelques règles d'« hygiène logique » pour éviter les paradoxes de l'infini (dont une forme sophistiquée est l'usage « préventif » des univers de Grothendieck), ainsi que l'usage conscient mais circonspect de l'axiome du choix et de ses variantes (la plupart du temps, l'axiome du choix dénombrable suffit — qui pose qu'à partir d'une suite d'ensembles non vides X_n, on peut légitimement construire une suite d'éléments $x_n \in X_n$).

Au reste, la plupart des ensembles considérés par les mathématiciens sont des ensembles définis « en compréhension », pour lesquels l'appartenance veut dire, concrètement, satisfaire une certaine propriété explicite ; à ce niveau basique, les ensembles n'offrent guère qu'un langage « réaliste » un peu plus commode que le maniement logique des propriétés elles-mêmes.

• En revanche, en ce qui concerne les travaux de Cantor sur la combinatoire transfinie, l'axiomatique ensembliste et tous les développements ultérieurs de la Théorie des ensembles, l'immense majorité des mathématiciens n'en retiennent *quasi-rien* (au-delà de quelque récurrence transfinie occasionnelle ou du choix rassurant d'un grand cardinal bornant prudemment l'univers du discours). Dans l'autre sens, il est extrêmement rare qu'un théoricien des ensembles contribue au « reste » des Mathématiques ou utilise des méthodes issues d'un domaine autre que la Théorie des ensembles ou la Logique (les exceptions confirment la règle !).

Cet isolement, non irrémédiable au demeurant [18], est l'un des arguments qui empêchent de prendre au sérieux le discours conventionnel, bien dépassé, sur la Théorie des ensembles comme fondement des Mathématiques [19]. Pour des bataillons de mathématiciens, les théoriciens des ensembles apparaissent plutôt comme des *sentinelles de l'infini*, qui de loin rassurent sur les questions de fondements des multiplicités infinies (par exemple, le résultat de Gödel « si ZF est cohérent, ZFC l'est aussi » rassure sur l'usage de l'axiome du choix), et évitent aux autres mathématiciens, pour qui les questions fondamentales ne sont pas du tout des questions de fondements, d'y penser. Si ZFC a le grand mérite d'avoir mis fin aux paradoxes, elle n'est nullement « gravée dans le marbre » et ne devrait pas devenir « le carcan de la théorie des ensembles », *cf.* chap. II, 6.1. L'argument parfois avancé que modifier ZFC demanderait à réécrire toutes les mathématiques est une imposture : la quasi-totalité de la littérature mathématique ne fait aucune référence, ni explicite ni implicite, à ZFC.

Au reste, la Théorie des ensembles, tout occupée de très grandes multiplicités, n'a essentiellement rien à dire sur l'infiniment petit, ni sur l'infiniment loin ou sur l'infiniment proche.

(18) La théorie toute récente des fondements univalents des mathématiques évoquée ci-dessus pourrait changer la donne, en convoquant théorie des ensembles et topologie algébrique en vue de vérification automatiques de preuves.

(19) Voir chap. X, 1. Il convient aussi de rappeler que la Théorie des ensembles a par ailleurs une influence nulle dans les sciences de la nature, ce qui n'ôte rien à l'importance de ses enjeux intellectuels.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

3 — L'horizon : l'infiniment loin

3.1 — Points de fuite

Passons maintenant à l'infini géométrique, et revenons d'abord aux XV^e^ et XVI^e^ siècles, où concevoir l'infini en acte était non seulement difficile, mais même dangereux (Giordano Bruno...).

À cette époque, pourtant, les artistes italiens, en mettant au point et en pratique la *perspective centrale*, avaient donné [20] une première représentation de l'infini actuel, marquée comme *point de fuite* sur l'horizon.

Après deux siècles de pratique de la perspective centrale et d'« éducation de l'œil », Desargues [21] en théorise la géométrie d'un point de vue radical : plutôt que de borner la perspective à une représentation fictive de la réalité géométrique familière, il « croit ses yeux » et identifie parallélisme et concours à l'infini. Ce qui l'amène à revisiter et subvertir la géométrie des coniques des Anciens en y introduisant des considérations d'infini, et lui permet de montrer l'équivalence de toutes les coniques par changement de perspective.

Ces idées hétérodoxes pour l'époque, violemment combattues puis oubliées, préfigurent la Géométrie projective (*cf.* chap. VIII, 1.1), où l'espace usuel est « compactifié » par ajout d'un plan à l'infini.

3.2 — Compactifications

Une question récurrente dans toutes sortes de recherches mathématiques est : que se passe-t-il à la limite ?

« À la limite » peut vouloir dire, quand tel paramètre devient infiniment grand ou petit, quand le nombre de paramètres devient infiniment grand, etc... La question suppose un « horizon » bien défini, et se traduit par : que se passe-t-il lorsqu'on s'approche de l'horizon ?

Une façon de définir un horizon consiste à *compactifier* : empêcher en quelque sorte les points de « fuir » à l'infini, en captant les « fuyards » ; plus précisément : de toute suite de points de X on peut extraire une sous-suite qui a une limite dans la compactification $\bar{X}$.

Par exemple, on peut compactifier la droite réelle $\mathbb{R}$ en ajoutant un seul point à l'infini, ce qui la transforme en un cercle (droite projective réelle) ; de même avec $\mathbb{C}$, ce qui donne la *sphère de Riemann* (droite projective complexe).

Ces exemples montrent déjà que le procédé n'est pas aussi rudimentaire qu'il paraît : l'« horizon » qu'il campe n'est pas un simple bord recollé (en effet, le cercle et la sphère n'ont pas de bord !). On remarque aussi qu'après compactification, ces espaces deviennent plus homogènes, c'est-à-dire *acquièrent davantage de symétries*. En Géométrie projective, c'est en fait cette homogénéité renforcée par l'incorporation du plan à l'infini qui permet d'éliminer toutes les fastidieuses considérations de « cas de figures ». Intégrer l'horizon à la réalité familière libère bien des potentialités (du moins chez les artistes et les géomètres)...

(20) G. Longo, S. Longo, *Infini de Dieu et espace des hommes en peinture, conditions de possibilité pour la révolution scientifique*, in « Les mathématiques dans l'œuvre d'art » (R. Scheps et M.-C. Maurel resp.), ISTE-WILEY, 2020.

(21) *Brouillon project d'une atteinte aux evenemens des rencontres d'un Cone avec un Plan*, 1639.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

> Avec l'horizon, l'infini trouve enfin un lieu d'accouplement avec le fini. Son absence ruine l'homogénéité créarice que donne la profondeur. [...] La finitude fétichise l'itération. [...] Une itération privée d'horizon doit renoncer à tirer parti de l'enveloppement des choses.
> Toute timidité à décider l'horizon fait basculer l'infini dans un *indéfini*. [...] Dans l'indéfini, tout « finit » par être la même chose : ce sont les « lointains », et ces « lointains » se risquent parfois jusqu'aux premiers plans, un peu comme les fantômes errants de l'infini qui n'a pas été résolument tranché. Il faut donc, pour refuser toute concession à l'indéfini et s'approprier un infini géométrique, *décider l'horizon*, en se pénétrant de la discipline de discernement qu'il propose et qui fait resplendir l'infini dans chaque chose finie [22].

3.3 — L'infiniment proche

Il y aurait tout autant à dire sur « l'infiniment proche ». On pourrait évoquer notamment le parcours conceptuel menant des *germes* (de fonctions analytiques) à la Weierstrass (*cf.* chap. VII, 5.1) aux *fibres* (de faisceaux) à la Leray-Cartan (*cf.* chap. II, 5.4) *via* l'étude des variétés analytiques, ou celui menant des *points infiniment proches* de la Géométrie algébrique du début du XX^{e} — points dont l'existence séparée se révèle par éclatement (*cf.* chap. VII, 5.2) — à la refonte algébrique, par Grothendieck, du calcul infinitésimal au moyen des *éléments nilpotents* et à son invention du *topos infinitésimal*. Nous y reviendrons dans la suite de ce livre.

4 — L'infini importun

4.1 — Contrôler la divergence

Même domestiqué, l'infini reste un « loup » qui sévit en Analyse sous la forme de la divergence. Conjurer la divergence, c'est d'abord la domestiquer, la contrôler. On dit qu'il y a *divergence* lorsqu'un processus opératoire aboutit à un résultat infini. Par exemple, la série $\sum_1^\infty \frac{1}{n}$ diverge.

Mais comment, à quelle vitesse ? Euler savait par exemple que $\sum_1^N \frac{1}{n}$ croît comme $\log N + 0,577...$ Comme le note Dieudonné dans la préface de son manuel classique [23],

> pour acquérir le « sens de l'Analyse » indispensable jusque dans les spéculations les plus abstraites, il faut avoir appris à distinguer ce qui est « grand » de ce qui est « petit », ce qui est « prépondérant » de ce qui est « négligeable ». En d'autres termes, le Calcul infinitésimal [...] est l'apprentissage du maniement des *inégalités* bien plus que des égalités, et on pourrait le résumer en trois mots : MAJORER, MINORER, APPROCHER.

L'Analyse a mis au point tout un arsenal de microscopes et télescopes virtuels pour appréhender, à leurs différentes échelles, l'infiniment petit et l'infiniment grand. La sensibilité dont parle Dieudonné guide le choix délicat de

(22) G. Châtelet, *Les enjeux du mobile*, Seuil, ch. 2.
(23) *Calcul infinitésimal*, Hermann, 1980. Il existe des manuels moins austères : par exemple J. Steele, *The Cauchy-Schwarz master class : an introduction to the art of mathematical inequalities*, Cambridge.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

ces instruments d'observation et de mesure (métriques, mesures, espaces fonctionnels adaptés à chaque problème), ainsi que l'usage d'une formidable boîte à outils techniques (prolongement analytique, résidus, distributions, régularisations, transformée de Fourier, ondelettes, etc.) [24].

Le « sens de l'Analyse », c'est cet esprit de finesse face aux deux infinis, et sa virtuosité.

C'est vers l'Analyse que se tourne la Théorie des nombres lorsqu'elle aborde les redoutables problèmes de répartition des nombres premiers, c'est à l'Analyse que sont dues les avancées les plus considérables de la Géométrie différentielle (comme la classification des formes de dimension 3, *cf.* chap. IV, 2).

Car c'est bien *l'Analyse* (et non la Théorie des ensembles) qui est la *« science dure » de l'infini mathématique, science « des infinis subtils », qualitatifs.*

4.2 — Dépasser la divergence

Ainsi, le plus souvent, c'est une analyse prudente et fine qui permet de conjurer la divergence. Pourtant, un Euler n'hésitait pas à la braver en écrivant des formules comme :

$$1+2+4+8+16+\cdots=-1, \quad 1+2+3+4+5+\cdots=-1/12,$$

ou en attribuant une valeur précise à la somme $1-1!+2!-3!+4!-5!+\cdots$ Ces formules « scandaleuses », sévèrement critiquées aux temps de la quête de la rigueur en Analyse, furent pleinement éclaircies et justifiées ultérieurement (à l'abus de notation près qu'elles commettent, elles témoignent d'une intuition phénoménale). La première formule n'est autre que l'évaluation en $x=1$ de la série de puissances $1+2x+4x^2+\cdots=1/(1-2x)$; *stricto sensu*, c'est la valeur en 1 du *prolongement analytique* (*cf.* chap. VII, 5.1) de la fonction $1/(1-2x)$ de la variable complexe x définie par cette série (série qui ne converge que pour $|x|<1/2$).

Mais la seconde formule est nettement plus profonde et attendit 120 ans sa justification : elle exprime la valeur en $s=-1$ du prolongement analytique de la fonction

$$\zeta(s)=\sum_1^\infty n^{-s}=\prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$$

de Riemann (qui contrôle la répartition des nombres premiers p) [25].

La troisième formule est la valeur en 1 de la sommation canonique $\int_0^x e^{-t/x}\frac{dt}{1+t}$ de la série formelle $y=x-1!x^2+2!x^3-3!x^4+\cdots$, *cf.* chap. V, 4, et Euler lui-même en donna plusieurs justifications dans son mémoire prémonitoire « De seriebus divergentibus » (1760).

(24) E. Hairer, G. Wanner, *L'analyse au fil de l'histoire*, Springer, 2000.

(25) Dans son article visionnaire de 1859 (Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, *Monatsberichte der Berliner Akademie*), Riemann prouve, et étend à tout nombre complexe s, la symétrie suggérée par Euler entre $\zeta(s)$ et $\zeta(1-s)$, et il explique le lien entre la distribution des nombres premiers et la position des *zéros* de ζ (c'est-à-dire des valeurs de s pour lesquelles $\zeta(s)$ s'annule). C'est en suivant ces arguments que J. Hadamard et C. de la Vallée-Poussin ont démontré qu'entre 1 et n, il y a environ $\frac{n}{\log n}$ nombres premiers (1896). La célèbre *conjecture de Riemann*, qui préciserait de manière essentielle et optimale ce résultat, dit que les zéros non triviaux (c'est-à-dire distincts des entiers pairs strictement négatifs) de ζ se trouvent tous sur l'axe de symétrie, c'est-à-dire sur la droite verticale d'abscisse 1/2.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

La divergence est encore bien plus importune en Physique qu'en Mathématiques. Elle infeste pourtant la Physique des champs quantiques et, comme on l'a brièvement évoqué au chapitre V.6, les physiciens ont dû bâtir un arsenal de techniques, bien plus élaborées que celles de Euler, pour la dépasser. C'est la théorie de la *renormalisation*. Les séries de puissances y sont remplacées par des séries indexées par des graphes de Feynman de complexité croissante) mettent en jeu des changements d'échelles en cascade.

Il est fascinant de constater qu'en jonglant avec des intégrales divergentes, donc dépourvues de sens physique (et même mathématique, *a priori*), la renormalisation aboutit à des quantités finies, en accord remarquable avec l'expérience de surcroît. Elle réussit le tour de force d'*extraire, systématiquement, du (dé)fini de l'in(dé)fini*.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Espace I. Topos

« C'est le thème du topos qui est ce « lit » où
viennent s'épouser la géométrie et l'algèbre,
la topologie et l'arithmétique, la logique mathématique
et la théorie des catégories, le monde du continu
et celui des structures « discontinues » ou « discrètes ».
Il est ce que j'ai conçu de plus vaste, pour saisir avec finesse,
par un même langage riche en résonances géométriques,
une « essence » commune à des situations
des plus éloignées les unes des autres. »

A. Grothendieck, *Récoltes et Semailles*, p. 59.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Ce chapitre et le suivant évoquent deux points de vue mathématiques les plus avancés et les plus profonds sur la notion d'*espace* : à savoir, la géométrie des topos et la géométrie non commutative. Chacune représente un aboutissement de la très longue maturation de la pensée mathématique autour de la problématique de la « localité » et des rapports du « local » au « global ». Dans les deux cas, nous verrons l'espace se métamorphoser et les points disparaître dans l'ombre.

Nous commençons par la géométrie des topos, initiée par Alexander Grothendieck dans les années 1960, vaste extension de la topologie générale. D'inspiration algébro-géométrique, la notion de topos intègre et fusionne les notions fondamentales de surface de Riemann et de faisceau [1], notions que nous déclinerons tour à tour. Après une introduction très condensée au point de vue catégorique, nous indiquerons ensuite le chemin mathématique qui relie « topos » et « logos » [2].

(1) Pour le lecteur pressé de lire la « morale de l'histoire », signalons d'emblée qu'elle se trouve aux paragraphes 4.2 et 6.1 de ce chapitre.
(2) Leçon MaMuX du 24 mars 2007.

1 — Topologie générale

Ce qu'on appelle aujourd'hui Topologie générale est l'étude mathématique *qualitative* des « lieux » et des « relations spatiales » : elle théorise les notions de proximité, frontière, localité, continuité, etc. et leurs liens mutuels.

On peut sans doute faire remonter le projet de la topologie (analysis situs, en latin) à Leibniz, mais c'est Riemann qui en jeta les bases dans sa célèbre dissertation ; Poincaré lui donna une nouvelle impulsion, et la Topologie générale fut ensuite axiomatisée par Hausdorff (1914).

Topologie désigne à la fois un chapitre des Mathématiques et un objet mathématique dont s'occupe cette discipline.

1.1 — Ce que c'est

Lisons donc la définition d'une topologie dans le « texte canonique » : Bourbaki, *Topologie générale*, chapitre 1 [3].

> Définition 1. *On appelle structure topologique* (ou plus brièvement *topologie*) *sur un ensemble X une structure constituée par la donnée d'un ensemble $\mathfrak{O}$ de parties de X possédant les propriétés suivantes :*
>
> (O_I) *Toute réunion d'ensembles de $\mathfrak{O}$ est un ensemble de $\mathfrak{O}$.*
>
> (O_{II}) *Toute intersection finie d'ensembles de $\mathfrak{O}$ est un ensemble de $\mathfrak{O}$.*
>
> *Les ensembles de $\mathfrak{O}$ sont appelés ensembles ouverts.*
>
> Définition 2. *On appelle espace topologique un ensemble muni d'une structure topologique.*
>
> Les éléments d'un espace topologique sont appelés *points*. [...] L'axiome (O_I) implique en particulier que la réunion de la partie vide de $\mathfrak{O}$, c'est-à-dire *l'ensemble vide*, appartient à $\mathfrak{O}$. L'axiome (O_{II}) implique en particulier que l'intersection de la partie vide de $\mathfrak{O}$, c'est-à-dire de *l'ensemble X*, appartient à $\mathfrak{O}$. » [4].

Écoutons à présent le commentaire du poète mathématicien J. Roubaud [5]

> J'ai lu et relu d'innombrables fois ces définitions, toute cette première page et les pages suivantes, sans rien comprendre, littéralement sans rien comprendre. Mais je n'ai pris que peu à peu conscience du fait que la difficulté essentielle venait non d'une extrême impénétrabilité du sujet (ce n'est certes pas le cas) ni d'une incapacité congénitale de ma part à le comprendre (heureusement), mais de ce que je ne savais pas lire.
>
> [...] Le mode de lecture romanesque, l'extrême rapidité qui m'était coutumière depuis l'enfance pour la dévoration des romans, ne pouvait à l'évidence pas me servir dans ces circonstances nouvelles.

(3) Hermann, 1971.

(4) Ce commentaire de Bourbaki sur la définition 1, qui semble de prime abord assez obscur, explique que, comme conséquence des axiomes, dans tout espace topologique X, le tout X et la partie vide $\varnothing$ sont des ouverts : pour Bourbaki (bon barbier selon Ockham), une réunion vide de parties (de X) est la partie vide, une intersection vide de parties est la partie pleine. Cela se justifie pleinement du point de vue « catégorique », mais guère du point de vue pédagogique, et bien d'autres exposés préfèrent être clairs et pécher par redondance en ajoutant aux axiomes (O_I) et (O_{II}) l'axiome suivant lequel X et $\varnothing$ sont des ouverts.

(5) *Mathématique : (récit)*, Seuil 1997, p. 159–160.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

> [...] Restait la poésie. [...] (à la différence de ce qui se passait pour la prose) je relisais la poésie sans cesse jusqu'au point d'une réappréhension de tous ses éléments au présent, dans la simultanéité du temps intérieur. [...] Je me mis donc, et sans réfléchir, à lire les paragraphes du chapitre 1 du livre de Topologie comme s'il s'agissait d'une séquence de poèmes.

Qu'est-ce donc que comprendre une notion mathématique ?

Cela paraît plus subtil que comprendre une démonstration. Comprendre littéralement — connaître la signification des termes employés dans la définition formelle — n'est pas suffisant. Il faut un complément heuristique. Il ne suffit pas de savoir lire. Il faut disposer d'exemples significatifs pour donner corps à la définition, et éventuellement de contre-exemples pour la baliser. Il faut par ailleurs saisir la motivation et surtout l'usage de la notion, ce qui relève tant de la connaissance de l'histoire de la discipline que de la pratique. Enfin et surtout, il faut voir « fonctionner » la notion dans divers contextes.

Revenant aux espaces topologiques, l'exemple de base est la droite réelle $\mathbb{R}$ munie de la topologie dont les ouverts sont les réunions (éventuellement infinies) d'intervalles privés de leurs extrémités ; et plus généralement, l'espace $\mathbb{R}^n$ à n dimensions muni de la topologie dont les ouverts sont les réunions de boules ouvertes (la boule ouverte de centre x et de rayon r est l'ensemble des points à distance strictement inférieure à r de x).

1.2 — Voisinages

Un *voisinage* d'un point $x \in X$ est une partie de X contenant un ouvert contenant x.

Si cette notion dérive de celle d'ouvert, on récupère, réciproquement, la notion d'ouvert à partir de celle de voisinage : un ouvert est une partie de X qui est voisinage de chacun de ses points. Ces notions sont ainsi logiquement équivalentes et il est donc possible de définir, de manière équivalente, une topologie par une axiomatique des voisinages. Cette axiomatique consiste en fait à dire que l'ensemble $\mathfrak{V}(x)$ des voisinages d'un point quelconque $x \in X$ forme un *filtre* (à savoir :

($\mathrm{V_I}$) toute partie de X qui contient un élément de $\mathfrak{V}(x)$ (c'est-à-dire un voisinage de x) est un élément de $\mathfrak{V}(x)$,

(V_{II}) toute intersection finie de parties de X qui sont des éléments de $\mathfrak{V}(x)$ est un élément de $\mathfrak{V}(x)$,

(V_{III}) le vide n'est pas un élément de $\mathfrak{V}(x)$ (en effet x appartient à chacun de ses voisinages)),

en ajoutant que

(V_{IV}) si V est un voisinage de x, il en existe un autre W tel que V soit voisinage de chacun des points de W.

Revenons au problème de la compréhension des notions mathématiques. Il suit de ce que nous en avons dit qu'il s'agit d'un processus progressif — qui peut passer par le malentendu. Il est en tout cas fort utile de se forger une représentation (même fantaisiste) donnant un contenu intuitif à la présentation formelle — sans jamais toutefois confondre celle-ci avec celle-là.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Écoutons l'évocation de Roubaud à propos du filtre des voisinages [6] :

> C'est ici que le mot *filtre*, et l'image qu'aussitôt il évoque vient s'interposer entre la topologie telle qu'elle est [...] et le souvenir que j'en ai gardé.
> Cela veut dire qu'il ne m'était pas possible alors, qu'il ne m'est pas possible encore aujourd'hui de ne pas *voir* ces filtres, et surtout de ne pas les voir comme liés, et même surimprimés à une représentation mentale de ces objets exaspérants qu'étaient les cafés-filtres des cafés.
> [...] Je pense tout particulièrement à la lenteur générale de l'écoulement de leur contenu, cette soupe brunâtre qualifiée sans honte de café, qui m'amenait à les saisir, en dépit de toutes mes expériences antérieures, avant l'achèvement du trajet de haut en bas du liquide et par conséquent à me brûler les doigts ; puis à me brûler la langue en essayant de m'en débarrasser trop tôt en les buvant. Je les vois et je vois aussitôt quelque chose comme une icône d'espace topologique, une sorte de grande prairie de « points », chacun placé au-dessous d'une tasse-filtre, son « filtre de voisinages ».
> Cette image donnait à l'idée de point une tout autre représentation que celle de la géométrie élémentaire scolaire et elle s'est pour moi entièrement substituée à la première.
> Et je ne vous parlerai pas des divins et singuliers ultrafiltres.
>
> [...] Si je m'y attarde un peu, le paysage glisse vers autre chose, vers un support de narration ; il devient un paysage « carrollien », où une licorne vient boire dans les tasses avec une unique paille au-dessus de son unique corne. Elle en fausse la topologie, bien sûr. [...] Tel est le scénario irrémédiablement frivole, mathématiquement irresponsable, dont j'accompagne en pensée l'idée de topologie. [...] On ne commande pas aisément ce qui peuple notre espace intérieur, et ses lointains.

1.3 — Intérieur et frontière

L'*intérieur* d'une partie A de X est l'ensemble des points de A dont A est un voisinage. On le note $\mathring{A}$.

C'est encore une notion logiquement équivalente à celle d'ouvert : une partie est ouverte si et seulement si elle est son propre intérieur. On peut donc définir une topologie, de manière alternative, par une axiomatique des intérieurs, qui est la suivante [7] :

$$\mathring{X} = X, \quad \mathring{A} \subset A, \quad (A \mathring{\cap} B) = \mathring{A} \cap \mathring{B}, \quad \mathring{\mathring{A}} = \mathring{A}.$$

La *frontière* d'une partie A de X est l'ensemble des points de X qui ne sont ni à l'intérieur de A, ni à l'intérieur du complémentaire de A.

Voici la vision « éthologique » de l'intérieur et de la frontière (d'un territoire) que propose le mathématicien R. Thom [8], fondateur d'une théorie topologique de la morphogenèse :

(6) *Op. cit.* p. 164–165, 199.

(7) C'est cette axiomatique qui est utilisée, par exemple, par A. Badiou, *Logiques des Mondes*, Seuil 2006, ch. VI. Ici, comme dans toute la suite, on utilise les symboles « ensemblistes » usuels : $\cap$ pour l'intersection de deux ou plusieurs parties d'un ensemble, $\cup$ pour leur réunion, $X \setminus A$ pour le complémentaire de la partie A dans l'ensemble X, $A \subset X$ pour indiquer que A est une partie de X, $x \in X$ pour indiquer que x est un élément de X (ou, en langage géométrique, que x est un point de l'espace X), $\varnothing$ pour l'ensemble vide.

(8) Aristote topologue, *Revue de Synthèse* (1999), p. 39–48.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

> Si l'on examine les emplois actuels du mot *lieu* en français, on observera qu'un lieu demande toujours un habitant qui en fait sa résidence. [...] De là l'hypothèse que le mot *topos* implique un être humain ou un animal qui séjourne (normalement) en ce lieu.
> [...] On peut partir de l'hypothèse (simpliste) qu'Aristote, s'imaginant un être vivant, le dotera d'un territoire. [...] Mais ce domaine aura, dans la pratique, des bornes que l'individu préférera ne pas franchir. De là la notion [...] de limites : les *eschata*.
> [...] En fait, selon la conception ici proposée, la théorie des lieux serait liée à un problème central de l'éthologie actuelle : comment un animal (ou un humain) se repère-t-il au sein de son territoire ?

On a donc une variété de définitions « cryptomorphes » de la topologie, chacune à la source de telle ou telle résonance dans tel domaine (poésie, philosophie, éthologie, psychanalyse...).

1.4 — De l'espace topologique au treillis de ses ouverts

Bien que moins « intuitive » que la notion de voisinage, la notion d'ouvert s'avère souvent techniquement plus utile.

L'ensemble $\mathfrak{O}$ des ouverts d'un espace topologique X est muni d'une structure de *treillis*, c'est-à-dire un ensemble (partiellement) ordonné [9] (par l'inclusion $\subset$), muni de deux lois de composition associatives $\cap$ et $\cup$ (en général : la borne inférieure et la borne supérieure ; ici, l'intersection et la réunion) qui vérifient la propriété suivante :

$$\text{pour tous } U, V \in \mathfrak{O}, \qquad U \cap (U \cup V) = U \cup (U \cap V) = U.$$

En associant à l'espace topologique $(X, \mathfrak{O})$ le treillis des ouverts $\mathfrak{O}$, il semble donc qu'on oublie les points de X. Or il n'en est rien : sous une condition extrêmement faible de séparation des points — la *sobriété*, toujours vérifiée en pratique [10] — on ne perd rien : *on peut reconstruire l'ensemble X à partir du treillis $\mathfrak{O}$*.

L'idée pour retrouver les points est simple : on identifie un point $x \in X$ au filtre de ses voisinages ouverts.

1.5 — Applications continues

Une application $f : X \to Y$ entre espaces topologiques (c'est-à-dire une règle $f : x \mapsto f(x)$ qui associe à tout élément de X un élément de Y) est dite *continue* si l'image *inverse* par f de tout ouvert de Y est un ouvert de X ; autrement dit, si pour tout ouvert V de Y, l'ensemble U des points de X que f envoie dans V est un ouvert de X.

Une application continue f induit donc une application f^*, dans l'autre sens, entre le treillis des ouverts de Y et celui des ouverts de X.

(9) Un ordre (partiel) $\leqslant$ sur un ensemble X est une relation binaire $x \leqslant y$ entre des éléments de X, qui vérifie les conditions suivantes : $x \leqslant x$, $(x \leqslant y \text{ et } y \leqslant x) \Rightarrow x = y$, $(x \leqslant y \text{ et } y \leqslant z) \Rightarrow x \leqslant z$.

(10) La définition technique, que nous donnons pour les lecteurs-mathématiciens qui se sont aventurés dans ce livre, est la suivante : X est sobre si pour tout fermé (*i.e.* complémentaire d'un ouvert) non vide A qui ne s'écrit pas comme réunion propre de deux fermés, il existe un unique point x tel que A soit le plus petit fermé contenant x.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Dans le cas particulier où l'espace but Y est la droite réelle $\mathbb{R}$ ou le plan complexe [11] $\mathbb{C}$ (muni de sa topologie naturelle), on dit que f est une *fonction* [12] *continue*.

Concluons que la topologie générale a réussi à *formaliser les notions de voisinage, frontière, continuité* (et bien d'autres : limites, connexité, compacité, etc.) *de manière purement qualitative*, sans faire appel à la notion de distance ou de mesure.

2 — L'idée de surface de Riemann. Sites

2.1 — « Ambiguïtés »

Tout polynôme, tel que x^2 ou bien $x^3 + x$, définit une fonction continue d'une variable, réelle ou complexe : $x \mapsto x^2$, *resp.* $x \mapsto x^3 + x$.




Figure II.1.

La situation est plus délicate pour une fonction algébrique telle que $\sqrt{x}$ ou bien $\sqrt{x^3 + x}$. Elle définit bien une fonction (continue) d'une variable réelle positive. En revanche, elle n'est pas bien définie en tant que fonction d'une variable complexe : si l'on part d'un point x non nul, et qu'on tourne autour de 0, cette fonction variera continûment, mais en revenant à x au bout d'un tour, la valeur ne sera pas la valeur initiale, mais son opposé : $-\sqrt{x}$ ou $-\sqrt{x^3 + x}$. On n'obtiendra la valeur initiale qu'au bout d'un second tour.

Il y a donc une ambiguïté (dans notre exemple : un signe) qui empêche de considérer une fonction algébrique comme une fonction (d'une variable complexe) bien définie.

(11) Rappelons que les nombres complexes s'écrivent sous la forme $z = x + \sqrt{-1}y$ où x et y sont des nombres réels, et $\sqrt{-1}$ est le nombre « imaginaire » racine carrée de -1. Ainsi, $\mathbb{C}$ s'identifie canoniquement à $\mathbb{R}^2$ (en décomposant tout nombre complexe z en sa partie réelle x et sa partie imaginaire y), ce qui donne la topologie sur $\mathbb{C}$. Rappelons par ailleurs que le conjugué de z, noté $\bar{z}$, est le nombre complexe $x - \sqrt{-1}y$; le module de z, noté $|z|$, est la racine carrée de $z\bar{z} = x^2 + y^2$.

(12) De manière générale, une *fonction* f sur un ensemble X est une règle qui associe à tout élément de X (ou parfois, selon le contexte, seulement à certains d'entre eux) un nombre réel ou complexe. Cette notion fondamentale en Mathématiques, depuis Euler, formalise l'idée de dépendance d'une quantité par rapport à des quantités variables.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2.2 — Revêtements à plusieurs feuillets

C'est Riemann qui a trouvé comment lever l'ambiguïté et donner à ces « fonctions multiformes » f le statut d'authentiques fonctions bien définies [13]. Pour cela, il convient de regarder f comme une fonction définie non pas sur le plan complexe $X = \mathbb{C}$ ou l'un de ses ouverts, mais sur un *revêtement à plusieurs feuillets* de $\mathbb{C}$, appelé *surface de Riemann* de f.

L'exemple de $f(x) = \sqrt{x}$ est trivial à cet égard : on considère une autre copie Y de $\mathbb{C}$ qu'on voit comme revêtement à deux feuillets du plan complexe original X *via* la fonction $y \mapsto x = y^2$ (les deux feuillets se touchent au point de ramification $y = 0$). Alors f devient la fonction identique $y \mapsto y = \sqrt{x}$ sur Y.

Nettement plus subtil est le cas de $f(x) = \sqrt{x^3 + x}$. Sa surface de Riemann est encore un revêtement à deux feuillets (qui se touchent en trois points de ramification), qui n'est plus du tout le plan complexe, mais a la forme d'une bouée.

2.3 — Du treillis des ouverts aux sites de Grothendieck

Retenons de cela que pour traiter correctement des fonctions algébriques, il convient de remplacer les ouverts de X par des revêtements à plusieurs feuillets d'ouverts de X.

Grothendieck, élargissant cette idée aux *variétés algébriques* de dimension quelconque [14], a proposé de généraliser « catégoriquement » la notion de topologie de la manière suivante, en introduisant les sites.

Un *site* est une catégorie $\mathcal{S}$ muni de la donnée, pour chaque objet U de $\mathcal{S}$, de familles $(U_i \to U)$ (dites couvrantes) de morphismes de but U, stables par changement de base U et composition.

Tout espace topologique classique fournit un site : le treillis de ses ouverts (vu comme catégorie, les morphismes étant donnés par les inclusions [15]), une famille couvrante de but l'ouvert U étant une collection d'ouverts U_i contenus dans U dont la réunion est égale à U.

La première application (et la plus importante, sans doute) de cette généralisation de la notion de topologie est la construction du site étale attaché à une variété algébrique X, dont les objets sont les morphismes $U \to X$ « étales » — variante algébrique de la notion de revêtement non ramifié (cas où les feuillets « ne se touchent pas ») [16].

3 — Du local au global. Faisceaux

> Un des traits caractéristiques du développement des Mathématiques depuis le milieu du XIX^e^ siècle, c'est que les recherches mathématiques les plus différentes aient pu être poursuivies à un double point de vue, le

(13) Voir par exemple l'ouvrage classique de H. Weyl, *Die Idee der Riemannschen Fläche*, 1913.
(14) *Grosso modo*, une variété algébrique est un espace défini par des équations polynomiales (à plusieurs variables). Aucune familiarité avec cette notion n'est requise ici, les variétés algébriques n'étant mentionnées qu'à l'occasion d'allusions « historiques » sporadiques.
(15) Voir plus bas, 5.1.
(16) Ce site pallie l'absence de théorème des fonctions implicites en Géométrie algébrique.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

> point de vue local et le point de vue global. L'étude locale se porte vers l'élément, le plus souvent infinitésimal, de la réalité [...] L'étude globale cherche au contraire à caractériser une totalité indépendamment des éléments qui la composent ; elle s'attaque d'emblée à la structure de l'ensemble [...].
> La dualité du point de vue local et du point de vue global s'est tout d'abord présentée aux mathématiciens comme une opposition entre deux modes d'étude, irréductibles l'un à l'autre. Il semblait qu'il fallût choisir entre ces deux conceptions incompatibles [...]

écrivait le philosophe A. Lautman [17] peu d'années avant l'introduction des faisceaux.

3.1 — Données locales (préfaisceaux)

Les espaces topologiques les plus familiers sont ceux qui sont *localement* isomorphes à des ouverts de $\mathbb{R}^n$. On les appelle *variétés* topologiques de dimension n. Par exemple, la sphère est une variété de dimension deux ; en effet, tout point de la sphère admet une calotte sphérique comme voisinage ouvert, et une telle calotte est isomorphe (par « aplatissement ») à un disque ouvert, qui est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

En général, bien entendu, les variétés ne sont pas *globalement* isomorphes à des ouverts de $\mathbb{R}^n$ (par exemple, la sphère n'est pas isomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^2$). C'est la source des problèmes de passage du local au global (problèmes de recollement, en particulier), qui sont fondamentaux en Géométrie.

Un concept universel pour poser et traiter ces problèmes est celui de *faisceau*, introduit par J. Leray vers 1945 et mis au point par H. Cartan.

Pour commencer, on formalise l'idée de données locales par la notion de préfaisceau : un *préfaisceau* $\mathcal{F}$ sur un espace topologique X est une règle qui associe à chaque ouvert U de X un ensemble $\mathcal{F}(U)$ (de « données locales ») et à chaque inclusion d'ouverts $V \subset U$ une application dite de *restriction* $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$. On demande que pour une inclusion composée $W \subset V \subset U$, la restriction correspondante soit la composée des restrictions.

Les éléments de $\mathcal{F}(U)$ s'appellent les *sections* de $\mathcal{F}$ au-dessus de U.

Un *morphisme de préfaisceaux* $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ est la donnée, pour tout ouvert U d'une application $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ compatible aux applications de restriction.

3.2 — Recollement de données locales compatibles (faisceaux)

Un préfaisceau $\mathcal{F}$ est un *faisceau* si toute famille $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ de sections « locales » compatibles (*i.e.* telles que les restrictions de s_i et s_j coïncident dans $\mathcal{F}(U_i \cap U_j)$) se recolle en une unique section « globale » $s \in \mathcal{F}(\bigcup U_i)$ (dont la restriction à U_i est s_i). Ici les U_i sont des ouverts quelconques de X.

Par exemple, si X est un espace topologique, les fonctions continues forment un faisceau sur X. Si X est en outre une variété lisse [18], on dispose du *faisceau tangent* $\mathcal{T}_X$ des champs de vecteurs [19] sur X.

(17) *Essai sur les notions de structure et d'existence en Mathématiques*. Réédition Vrin 2006, p. 133.
(18) On s'étendra au chapitre V sur cette notion.
(19) C'est-à-dire la donnée, pour tout point x de X d'un vecteur tangent $\vec{v}(x)$ qui varie de manière continue et même lisse avec x.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

3.3 — Théorie des obstructions et cohomologie des faisceaux

L'obstruction à recoller des données locales compatibles s'exprime donc en général par le fait qu'un certain préfaisceau n'est pas un faisceau. Mais on peut souvent aller plus loin, et donner à une telle obstruction le statut d'un objet mathématique.

Voici un cas typique. Considérons un faisceau abélien $\mathcal{F}$ (c'est-à-dire un faisceau de groupes commutatifs), et un sous-faisceau abélien $\mathcal{G}$. On peut alors former le quotient au sens naïf : c'est le préfaisceau qui associe à tout ouvert U le groupe quotient $\mathcal{F}(U)/\mathcal{G}(U)$. En général, ce n'est pas un faisceau : l'obstruction à ce qu'il en soit ainsi peut être vue comme un élément d'un certain « groupe de cohomologie » $H^1(\mathcal{G})$.

La Théorie des obstructions a pour objet de fournir des interprétations « cohomologiques » aux obstructions à diverses constructions mathématiques : recollement, déformation, etc. Par exemple, l'obstruction à déformer un variété X peut être vue comme un élément du groupe de cohomologie $H^1(X, \mathcal{T}_X)$ du faisceau tangent.

Dans un second volet, la théorie fournit des critères généraux pour l'annulation de ces groupes de cohomologie — annulation qui entraîne l'absence d'obstruction au problème posé.

Par ailleurs, les obstructions elles-mêmes, une fois interprétées cohomologiquement, posent des problèmes de recollement, qui conduisent à considérer aussi des obstructions supérieures, « vivant » dans des groupes $H^i(U, \mathcal{F}), i > 1$. La cohomologie des faisceaux (dont les pionniers sont Leray, A. Borel, H. Cartan, et Grothendieck), c'est-à-dire la théorie de ces groupes $H^i(U, \mathcal{F})$, est un outil souple et puissant, fondamental en Géométrie analytique ou algébrique.

Donner à une obstruction (ou une ambiguïté) à effectuer une construction mathématique le statut d'un objet mathématique à part entière, et passer de la confrontation à l'obstruction à l'étude structurale de l'objet obstructeur, s'est avéré un geste de pensée extrêmement fécond, initié par Galois (*cf.* chap. V, 2).

4 — Faisceaux sur un site. Topos de Grothendieck

4.1 — Ce que c'est

Comme Grothendieck l'a observé, la définition des préfaisceaux et faisceaux se transpose à tout site $\mathcal{S}$: un préfaisceau sur $\mathcal{S}$ est un foncteur contravariant $\mathcal{F}$ de $\mathcal{S}$ vers la catégorie des ensembles, et c'est un faisceau si pour toute famille couvrante $(U_i \to U)$, une section globale $s \in \mathcal{F}(U)$ s'identifie à une famille de sections locales $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ « compatibles ».

Dans le cas où $\mathcal{S} = \mathfrak{O}$ est le treillis des ouverts d'un espace topologique X, on retrouve bien la notion de faisceau sur X.

Grothendieck appelle *topos* toute catégorie $\mathcal{X}$ équivalente à la catégorie $\mathcal{F}aisc_{\mathcal{S}}$ des faisceaux sur un site.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Exemples.
• le topos ponctuel, *i.e.* la catégorie des faisceaux sur l'espace réduit à un point, n'est autre que la catégorie des ensembles.
• Si G est un groupe, la catégorie des ensembles sur lesquel G opère est un topos.
• Le topos étale d'une variété algébrique X est la catégorie des faisceaux sur le site étale de X.

Chaque topos donne lieu à une théorie de cohomologie. Celle du topos étale, appelée *cohomologie étale* s'est avérée parfaitement adaptée à la Géométrie algébrique (et a constitué l'outil principal de démonstration des conjectures de Weil [20]).

4.2 — Espaces et topos

Des sites différents peuvent donner des topos équivalents. En revanche, le topos des faisceaux sur un espace topologique (sobre) détermine cet espace — nous verrons comment ci-dessous (5.4). C'est en ce sens qu'on peut dire que la notion de topos généralise celle d'espace topologique tout en englobant à la fois l'idée de surface de Riemann et celle de faisceau de Leray [21]. Au bout de ce double mouvement, on a remplacé les espaces topologiques par les topos de faisceaux associés :

$$\text{Espace topologique} \quad (X, \mathfrak{O}) \rightsquigarrow \text{Site} \quad \mathfrak{O} \rightsquigarrow \text{Topos} \quad \mathcal{X} = \mathcal{F}aisc_X.$$

Ce faisant, *on n'a rien perdu, puisqu'on peut reconstruire l'espace topologique à partir du topos associé, et on a gagné une structure beaucoup plus souple, puisque les topos permettent essentiellement toutes les opérations familières dans la catégorie des ensembles. En mettant l'accent sur les conditions de recollement, on a ainsi extrait les propriétés intrinsèques de localisation de X en « oubliant » ses points.*

Comme l'écrit Grothendieck [22] :

> Cette notion [de topos] constitue une extension insoupçonnée, pour mieux dire, *une métamorphose de la notion d'espace*. [...] Elle possède les deux caractères complémentaires essentiels pour toute généralisation fertile, que voici. Primo, la nouvelle notion n'est pas trop vaste, en ce sens que dans les nouveaux « espaces », les intuitions et les constructions « géométriques » les plus essentielles, familières pour les bons vieux espaces d'antan, peuvent se transposer de façon plus ou moins évidente. [...]
> Et secundo, la nouvelle notion est en même temps assez vaste pour englober une foule de situations qui jusque là, n'étaient pas considérées comme donnant lieu à des intuitions de nature « topologico-géométrique » — aux intuitions, justement, qu'on avait réservées par le passé aux seuls espaces topologiques ordinaires.

(20) Ces conjectures arithmético-géométriques datant de 1949 concernent le nombre de solutions modulo un nombre premier — ou plus généralement dans un corps fini — d'un système d'équations polynômiales à coefficients entiers. Elles étaient l'horizon des recherches de Grothendieck, et ont finalement été démontrées en partie par lui, puis par Deligne (1973). Voir chap. X, 5 pour la signification et le rôle des conjectures en général.
(21) Pour plus de précisions, voir le survol de L. Illusie, What is a topos ?, *Notices of the AMS* 51, 9 (2004), p. 1060–1062.
(22) « Récoltes et Semailles », notes miméographiées (désormais accessibles sur la Toile comme fichier pdf), §56–57.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

5 — Interlude : catégories, foncteurs, adjonction

Les catégories ont fait leur apparition discrète à plusieurs reprises dans ce chapitre. La notion de foncteur vient même d'être évoquée. Il est temps de faire halte pour préciser ces notions fondamentales [23].

5.1 — Catégories

De l'aveu de l'un des fondateurs de la théorie, S. MacLane [24],

> c'est une notation (la flèche) qui a conduit à un concept (catégorie).

Plus précisément, c'est l'introduction (au tout début des années 1940 dans le contexte de la Topologie algébrique) de la notation extrêmement suggestive

$$X \xrightarrow{f} Y$$

pour désigner une application au moyen d'une flèche, et celle des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow{g} & T \end{array}$$

qui lui emboîte le pas, qui sont à l'origine directe de la notion de catégorie.

Une *catégorie* $\mathcal{C}$ consiste d'une part en une collection d'*objets* A, et d'autre part en la donnée, pour tout couple d'objets (A, B), d'un ensemble $\mathcal{C}(A, B)$ dont les éléments sont appelés *morphismes* ou *flèches* de A vers B (notés $A \xrightarrow{f} B$).

On requiert que les morphismes se composent lorsque cela fait sens (*i.e.* le composé gf de $f \in \mathcal{C}(A, B)$ et de $g \in \mathcal{C}(B, C)$ est un élément de $\mathcal{C}(A, C)$), la composition étant associative [25]. On requiert aussi qu'il y ait un morphisme identité 1_A de A vers lui-même, qui composé avec tout morphisme de source ou de but A, ne le modifie pas.

On dit que $f \in \mathcal{C}(A, B)$ est un *isomorphisme* s'il admet un inverse, *i.e.* s'il existe $g \in \mathcal{C}(B, A)$ tels que $fg = 1_B$, $gf = 1_A$; que f est un *automorphisme* si de plus $A = B$.

C'est l'accent mis sur les flèches (et leur composition) qui fait la spécifité du concept mathématique de catégorie (on peut d'ailleurs identifier l'objet A au morphisme 1_A, et donc penser aux objets comme à des morphismes particuliers).

L'exemple de base est la catégorie *Ens* des ensembles (les morphismes entre deux ensembles étant les applications quelconques entre ces ensembles). On en déduit d'autres catégories par addition de structure : par exemple la catégorie des espaces topologiques (objets : espaces topologiques, morphismes : applications continues).

(23) En première lecture, on peut sauter sans.inconvénient ce paragraphe un peu austère... ou bien le lire comme Roubaud lisait naguère les premiers éléments de topologie de Bourbaki, *cf.* supra. Voir aussi le glossaire.

(24) *Categories for the working mathematician*, Springer (1978), Notes du ch. 1.

(25) Notion précisée au chapitre III.1.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Dans les exemples de cette nature, la spécificité du point de vue catégorique (par opposition au point de vue ensembliste) consiste à ne considérer et manipuler que les espaces et surtout les morphismes qui les relient, et non les points de ces espaces : *on occulte délibérément la structure interne des objets, pour mettre l'accent sur leurs rapports mutuels.*

Voici quelques exemples de catégories dont les objets ne se donnent pas (du moins d'emblée) comme ensembles structurés :

• la catégorie $\mathcal{F}aisc_X$ des faisceaux sur un espace topologique fixé X,
• tout groupe peut être vu comme une catégorie à un seul objet, les morphismes étant les éléments du groupe,
• tout ensemble (partiellement) ordonné $(X, \leqslant)$ — par exemple un treillis — peut être vu comme une catégorie (objets : les éléments x de X, morphismes de x vers y : un seul si $x \leqslant y$, aucun sinon).

5.2 — Foncteurs

De même que les ensembles sont reliés par des applications, les catégories sont reliées par des foncteurs, qui agissent tant sur les objets que sur les morphismes.

Un *foncteur* (covariant) $\phi : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ associe à chaque objet A de $\mathcal{C}$ un objet $\phi(A)$ de $\mathcal{D}$ et à chaque morphisme $f \in \mathcal{C}(A, B)$ un morphisme $\phi(f) \in \mathcal{D}(\phi(A), \phi(B))$. On requiert que ϕ préserve les identités et la composition.

Soulignons que c'est la *variance* de F (*i.e.* le fait qu'un morphisme entre A et B se reflète en un morphisme de $F(A)$ vers $F(B)$) qui est ici fondamentale : c'est de cette variance qu'il s'agit lorsqu'on parle du caractère *fonctoriel* d'une règle $A \mapsto F(A)$.

Un *foncteur contravariant* ψ de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{D}$ est un foncteur $\psi : \mathcal{C}^{op} \to \mathcal{D}$, où $\mathcal{C}^{op}$ désigne l'opposée de $\mathcal{C}$, qui s'obtient en prenant les mêmes objets et en renversant le sens des flèches : $\mathcal{C}^{op}(A, B) = \mathcal{C}(B, A)$.

Donnons deux types d'exemples, d'allure banale, mais très utiles en pratique :

• si $\mathcal{C}$ est une catégorie d'ensembles enrichis d'une structure (espaces topologiques, etc.), on dispose d'un foncteur d'oubli de la structure $\mathcal{C} \to Ens$ qui ne retient que l'ensemble sous-jacent.

• Tout objet A de $\mathcal{C}$ donne lieu à un foncteur contravariant de $\mathcal{C}$ vers Ens : $\mathcal{C}(?, A)$, où ? désigne un objet variable. Un foncteur contravariant de cette forme est dit *représentable* (par A).

Dans un topos, le foncteur contravariant qui à tout objet U associe l'ensemble de ses sous-objets est représentable par un objet Ω appelé classifiant. Pour le topos ponctuel, Ω est l'ensemble à deux éléments.

Les foncteurs eux-mêmes (de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{D}$) peuvent être vus comme objets d'une nouvelle catégorie : un morphisme (on dit aussi *transformation naturelle*) entre deux foncteurs ϕ_1, ϕ_2 est une règle qui associe fonctoriellement à tout objet A de $\mathcal{C}$ un morphisme $u_A \in \mathcal{D}(\phi_1(A), \phi_2(A))$ (« fonctoriellement » voulant dire que pour tout $f \in \mathcal{C}(A, B)$, on a $\phi_2(f) \circ u_A = u_B \circ \phi_1(f)$).

Deux catégories $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ sont dites *équivalentes* s'il existe des foncteurs *quasi-inverses* $\phi : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, $\psi : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$; quasi-inverses voulant dire que $\psi \circ \phi$ et $\phi \circ \psi$ sont isomorphes aux foncteurs identiques $Id_{\mathcal{C}}$ et $Id_{\mathcal{D}}$ respectivement [26].

(26) C'est le primat des morphismes sur les objets, dans la perspective catégorique, qui impose cette notion d'équivalence de catégories, au détriment de celle d'isomorphisme de catégories.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Le *lemme de Yoneda* dit précisément que $A \mapsto \mathcal{C}(?, A)$ induit une équivalence entre $\mathcal{C}$ et la catégorie des foncteurs représentables de $\mathcal{C}$ vers *Ens*. En particulier, le foncteur $\mathcal{C}(?, A)$ détermine l'objet A (à isomorphisme unique près).

5.3 — Foncteurs adjoints

Soit $(\phi : \mathcal{C} \to \mathcal{D},\ \psi : \mathcal{D} \to \mathcal{C})$ un couple de foncteurs allant en sens opposés.

Ces foncteurs sont dits *adjoints* si pour tout objet A de $\mathcal{C}$ et tout objet B de $\mathcal{D}$, $\mathcal{C}(A, \psi(B))$ s'identifie [27] à $\mathcal{D}(\phi(A), B)$.

Il s'agit là d'un concept aussi fondamental que difficile à comprendre : c'est semble-t-il un cas extrême d'« hysteresis » entre compréhension littérale et compréhension réelle. On prendra garde à ne surtout pas confondre cette notion avec celle d'inverse ou de quasi-inverse : il n'y a ici d'inversion que le sens des foncteurs [28].

Bien des foncteurs d'oubli $\psi : \mathcal{D} \to \mathit{Ens}$ admettent un adjoint à gauche ϕ, $\phi(A)$ correspondant à l'objet « libre » de base A (c'est par exemple le cas lorsque $\mathcal{D}$ est la catégorie des espaces vectoriels : $\phi(A)$ est l'espace vectoriel de base A, *cf.* chap. III, 2.3).

Bien des foncteurs d'inclusion admettent aussi un adjoint à gauche :

- l'inclusion de la catégorie des faisceaux dans celle des préfaisceaux a un adjoint à gauche appelé *faisceautisation*,
- l'inclusion de la catégorie des espaces topologiques sobres dans celle de tous les espaces topologiques a un adjoint à gauche (qu'on pourrait appeler sevrage !).

D'autre part, bien des foncteurs diagonaux $\mathcal{D} \to \mathcal{D}^I$ admettent à la fois un adjoint à gauche (appelé limite inductive et noté $\varinjlim_I$) et un adjoint à droite (appelé limite projective et noté $\varprojlim_I$) [29].

5.4 — Application : morphismes de topos et points d'un topos

Soit $f : X \to Y$ une application continue. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X, on définit un faisceau $f_*\mathcal{F}$ sur Y par $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V))$. Si $\mathcal{G}$ est un faisceau sur Y, on définit un faisceau $f^*\mathcal{G}$ sur X par $f^*\mathcal{G}(U) = \varinjlim_{V \supset f(U)} \mathcal{G}(V)$; en particulier, si f est l'inclusion d'un point $y \in Y$, l'ensemble $f^*\mathcal{G}(\{y\})$ est la *fibre de* $\mathcal{G}$ *en* y.

(27) Fonctoriellement en A et B bien entendu. Noter que la notion n'est pas symétrique ; on dit que ϕ est adjoint à gauche de ψ, et ψ adjoint à droite de ϕ.

(28) Il y a une analogie formelle (et non fortuite) avec la définition des opérateurs adjoints ϕ et ψ sur un espace euclidien ou de Hilbert $\mathcal{H}$ qu'on verra au chapitre suivant (*cf.* chap. III, 4.1, 4.2) : pour tout couple de vecteurs x, y de $\mathcal{H}$, $\langle x, \psi(y)\rangle = \langle \phi(x), y\rangle$.

(29) Comme le fait remarquer P. Cartier, c'est dans l'Analyse fonctionnelle du milieu du XX^e, notamment à propos de distributions (*cf.* chap. VIII, 3.2), que viennent se mêler aux limites « classiques » les limites « catégoriques » inductives et projectives (*espaces de Fréchet* et leurs duaux) ; et c'est de là que Grothendieck a importé l'usage massif de méthodes « infinitaires » dans son traitement catégorique des faisceaux et de la cohomologie.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

On obtient ainsi un couple de foncteurs adjoints

$$(f^* : \mathcal{F}aisc_Y \to \mathcal{F}aisc_X,\ f_* : \mathcal{F}aisc_X \to \mathcal{F}aisc_Y) :$$
$$\mathcal{F}aisc_Y(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}) = \mathcal{F}aisc_X(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}).$$

On peut maintenant préciser comment on récupère un espace topologique (sobre) X à partir du topos $\mathcal{X} = \mathcal{F}aisc_X$ de ses faisceaux : l'idée est simplement d'identifier un point $x \in X$ au foncteur « fibre en x » : $\mathcal{X} \to Ens$.

Plus généralement, Grothendieck définit la notion de *morphisme de topos* $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ comme la donnée d'un couple de foncteurs adjoints $f = (f^* : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}, f_* : \mathcal{X} \to \mathcal{Y})$, f^* commutant aux limites projectives finies (c'est-à-dire des $\varprojlim_I$ avec I fini). Prenant pour $\mathcal{X}$ le topos ponctuel, on obtient la notion de *point* du topos $\mathcal{Y}$.

Mais il existe des topos exotiques sans aucun point !

5.5 — Du bon usage des catégories

De même que nous avons averti des limites, et critiqué l'hégémonie, de la théorie de ensembles vis-à-vis de l'infini (*cf.* chap. I, 2.5), il convient ici d'émettre quelques réserves sur l'usage des catégories.

En dehors de la communauté mathématique, la théorie des catégories tire sa popularité de trois raisons :

1. L'accessibilité : on y entre de plain-pied, sans prérequis (ce qui peut induire l'illusion d'une voie royale d'accès aux mathématiques). L'accessibilité de la théorie est renforcée par son caractère essentiellement diagrammatique, donc visuel.

2. L'« anti-réalisme » : le philosophe retient qu'il s'agit d'un canevas, formalisé de manière aussi rigoureuse qu'accessible, où la nature des objets est indifférente : seules comptent leurs relations. Ce primat de la relation sur l'objet a évidemment une résonance philosophique forte.

3. L'universalité, sur un double plan : *i*) la mise à l'écart de la nature des objets permet à la théorie de s'appliquer a priori à toute sorte d'objet (ce qui peut induire l'illusion que les catégories sont d'usage dans toute la mathématique, alors qu'elles ne sont guère pertinentes en Analyse ou en Théorie des probabilités) ; *ii*) la thématisation de la notion même d'universalité comme concept interne à la théorie.

De fait, *ce sont les morphismes qui importent dans une catégorie*, même si par tradition et pour faire court, on n'en nomme souvent que les objets (exemple : la catégorie des espaces topologiques — sous-entendu : dont les morphismes sont les applications continues). Mais l'axiome essentiel est que *les morphismes se composent* : c'est cette opération de composition qui rapproche les catégories de l'algèbre.

Il est donc abusif d'invoquer la théorie des catégories dans un contexte où les morphismes et leur composition ne sont pas clairement dégagés (c'est d'ailleurs ce qui limite son domaine d'application en Mathématique même). Faute de prendre en compte ce point capital, bien des tentatives d'exportation de concepts catégoriques échouent dans l'inconsistant.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

Par ailleurs, le lemme de Yoneda a suscité nombre de gloses et d'interprétations. L'interprétation perspectiviste, qui énonce qu'*un objet s'identifie à l'intégrale des points de vue sur cet objet*, est éclairante — à condition d'insister sur le fait que le point de vue de l'objet sur lui-même, crucial dans la démonstration du lemme, fait partie de l'intégrale ; éclairante mais pourtant guère rigoureuse : il faudrait convenir que les « points de vue » réciproques sont les morphismes de la catégorie que l'on considère ; or il n'est pas toujours facile de donner sens à la composition de deux points de vue, comme il serait requis dans une catégorie...

6 — Topos et Logique intuitionniste

6.1 — Les topos entre Géométrie et Logique

La transition est excellemment présentée par P. Cartier [30] :

> [Grothendieck] avait remarqué que les faisceaux sur un espace donné formaient une catégorie qui avait, en gros, toutes les propriétés de « la » catégorie des ensembles. Or, après les résultats d'indécidabilité de Gödel et de Cohen en théorie des ensembles, il y a non pas *une* théorie des ensembles, mais *divers modèles* non équivalents de la théorie des ensembles (au sens logique de « modèle »). Il était donc naturel d'explorer les relations entre topos et modèles de la théorie des ensembles. [...]
> Il appartint à d'autres (surtout Bénabou, Lawvere et Tierney) de résoudre l'énigme : les topos sont exactement les modèles de la théorie des ensembles, mais dans une logique particulière, qu'on appelle « intuitionniste », et où le prinicipe du tiers exclu n'est pas valable. Il est très remarquable que cette logique ait été inventée par un fameux topologue, Brouwer, et qu'avec un peu de recul, elle s'impose naturellement en vertu du fait que l'intérieur de l'adhérence d'un ensemble ouvert ne lui est pas égal.
> Mais l'invention des topos donne une liberté inouïe au jeu mathématique, et permet de briser le carcan de « la » théorie des ensembles. Rejouer une pièce mathématique bien connue dans le décor nouveau d'un topos exotique peut amener des surprises, et faire découvrir des accents nouveaux dans des vers ressassés ; parfois, cette nouvelle représentation révèle des trésors mathématiques. D'un point de vue plus général, un topos porte en lui sa propre logique, et définit donc une espèce de logique modale, ou plutôt une logique du *hic* et du *nunc*, une logique spatio-temporelle où la valeur de vérité d'une assertion peut dépendre du lieu et du temps.

6.2 — Règles du calcul propositionnel : formulaire

Nous nous limiterons à la logique des propositions, pour simplifier au maximum. Mais ce qui suit s'étend à la logique des prédicats [31] et même à la logique plus sophistiquée des « types ».

(30) « Grothendieck et les motifs », Prépublication IHES (2000). Voir aussi P. Cartier, « Catégories, logique et faisceaux ; modèles de la théorie des ensembles », Séminaire Bourbaki, exposé 513, 1978.
(31) La logique des prédicats fait intervenir les quantificateurs universel $\forall$ et existentiel $\exists$, qui du reste peuvent s'interpréter comme adjoints à gauche et à droite respectivement d'un même foncteur.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Commençons par rappeler le formulaire des règles de déduction en logique des propositions. Si p et q sont des propositions (ou formules logiques), notons $\neg p$ la négation de p, $p \wedge q$ la conjonction de p et q, $p \vee q$ leur disjonction, $p \Rightarrow q$ la proposition « p implique q », et $\vdash$ l'inférence : de p on infère q. On note 0 le faux et 1 le vrai. On utilise une notation fractionnaire, par laquelle on entend que le dénominateur se déduit du numérateur.

Voici le tableau des axiomes et règles de déduction — qu'utilise Monsieur Jourdain depuis toujours lorsqu'il raisonne correctement ! « Qu'on apprenne à penser grâce [à l'étude des règles de la logique...] comme si on apprenait à digérer et à se mouvoir grâce à l'étude préalable de l'anatomie et de la physiologie — ce préjugé s'est perdu depuis longtemps » ironisait Hegel au seuil de sa *Science de la Logique*) :

$$0 \vdash p, \quad p \vdash 1, \quad p \vdash p,$$

$$\neg p \vdash (p \Rightarrow 0), \quad (p \Rightarrow 0) \vdash \neg p,$$

$$\frac{p \vdash q,\ q \vdash r}{p \vdash r},$$

$$\frac{p \vdash q \wedge r}{p \vdash q}, \quad \frac{p \vdash q \wedge r}{p \vdash r}, \quad \frac{p \vdash q,\ p \vdash r}{p \vdash q \wedge r},$$

$$\frac{p \vee q \vdash r}{p \vdash r}, \quad \frac{p \vee q \vdash r}{q \vdash r}, \quad \frac{p \vdash r,\ q \vdash r}{p \vee q \vdash r},$$

$$\frac{p \wedge q \vdash r}{p \vdash (q \Rightarrow r)}, \quad \frac{p \vdash (q \Rightarrow r)}{p \wedge q \vdash r}.$$

On a alors $p \vdash \neg\neg p$ et $\neg\neg\neg p \vdash \neg p$, mais l'inférence $\neg\neg p \vdash p$ ne se déduit pas des règles précédentes et n'est pas valide en Logique intuitionniste. Cette inférence est l'axiome supplémentaire (tiers exclu) qu'impose la Logique classique.

6.3 — Logique intuitionniste et treillis de Heyting

Si l'inférence $\vdash$ est interprétée comme une relation d'ordre $\leqslant$, le calcul des propositions forme un *treillis de Heyting* [32], c'est-à-dire un treillis avec plus petit élément (noté 0) et plus grand élément (noté 1), ayant la propriété que le foncteur $y \mapsto ? \wedge y$ du treillis dans lui-même admet un adjoint à droite (c'est $y \mapsto ? \Rightarrow y$).

Mieux, une proposition p est valide en Logique intuitionniste si et seulement son interprétation dans tout treillis de Heyting l'est.

Le treillis des ouverts $\mathfrak{O}$ d'un espace topologique X est un treillis de Heyting. L'inférence $\vdash$ s'y interprète comme l'inclusion $\subset$ (des ouverts les uns dans les autres), la conjonction $\wedge$ s'interprète comme l'intersection $\cap$, $\vee$ comme la réunion $\cup$, et la *négation* $\neg$ *comme l'intérieur du complémentaire* :

$$\neg U = (X \setminus U)^{\circ}.$$

(32) On dit aussi *algèbre de Heyting*.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Cette interprétation topologique de la Logique intuitionniste fait ressortir la non-validité du tiers-exclu : par exemple si X est la droite, et U la droite privée d'un point, $\neg U = \varnothing$, et $\neg\neg U = X$ qui n'est pas contenu dans U, de sorte que $\neg\neg U \vdash U$ n'est pas valide.

Plus généralement, dans tout topos $\mathcal{X}$, le treillis des sous-objets d'un objet A de $\mathcal{X}$ (treillis dont l'ensemble sous-jacent est $\mathcal{X}(A, \Omega)$ par définition du classifiant Ω), est un treillis de Heyting.

La Logique intuitionniste s'interprète donc dans tout topos de Grothendieck. Le classifiant apparaît comme *faisceau de valeurs de vérités*. Dans le topos ponctuel, cette logique devient classique : $\Omega = \{0, 1\}$, faux ou vrai.

Ce qu'on vient d'esquisser n'est que le début de la logique toposique (33), qui a précédé la Logique des interactions évoquée au chapitre suivant — tout en lui demeurant complémentaire.

Bien que cela dépasse largement notre cadre, nous ne pouvons omettre, en terminant, de signaler que la logique toposique forme le substrat mathématique de la logique de l'apparaître dans la philosophie d'A. Badiou et irrigue la construction des principaux concepts de son livre *Logiques des Mondes* (34).

Les topos jouent aussi un rôle fondamental dans la théorie mathématique de la musique de G. Mazzola (35), où ils permettent notamment d'effectuer le passage du local au global dans le contexte « discret » des compositions musicales. Signalons aussi l'approche toposique de C. Houzel en linguistique, dans laquelle une théorie interprétative est représentée par un faisceau sur un site convenable.

Du côté purement mathématique, la théorie connaît à l'heure actuelle un nouvel essor : topos supérieurs (J. Lurie), topos classifiants comme ponts (O. Caramello).

(33) Pour les besoin de la Logique, la notion de topos que Lawvere et Tierney et leurs successeurs utilisent est un peu plus générale que celle de Grothendieck.
(34) Seuil, 2006.
(35) *The topos of Music*, Birkhäuser 2002.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

© Spartacus-Idh 2021

Espace II. Algèbres d'opérateurs et Géométrie non commutative

« Je n'ai jamais été assez loin pour bien sentir
l'application de l'algèbre à la géométrie. [...]
il me semblait que résoudre un problème
de géométrie par les équations, c'était
jouer un air en tournant une manivelle. »
J.-J. Rousseau [1]

www.spartacus-idh.com

© Spartacus-Idh 2021

Dans le formalisme de la mécanique quantique, les observables ne sont plus des grandeurs ou fonctions numériques, que l'on peut multiplier entre elles dans un ordre indifférent, mais des opérateurs, que l'on peut composer entre eux suivant un ordre qui n'est plus indifférent. Il en est de même dans la géométrie non commutative initiée par Alain Connes dans les années 1980, qui s'en inspire : au lieu du double mouvement de la géométrie des topos

$$\text{espace des points} \rightsquigarrow \text{site des ouverts} \rightsquigarrow \text{topos des faisceaux},$$

on a le double mouvement

$$\text{espace des points} \rightsquigarrow \text{algèbres de fonctions} \rightsquigarrow \text{algèbres d'opérateurs}\ [2].$$

La théorie des algèbres d'opérateurs (*algèbres de von Neumann*, de leur nom technique plus précis) peut être vue sous deux aspects complémentaires : comme étant obtenue par passage à la dimension infinie en Algèbre linéaire, ou par passage au non commutatif en Théorie de la mesure.

Comme au chapitre précédent, nous allons commencer par exposer puis varier quelques thèmes (opérateurs linéaires, point de vue fonctionnel sur les espaces, spectres...), avant de les tresser ensemble en un contrepoint de plus en plus serré [3].

1 — Associativité et commutativité

Les Mathématiques sont un « monde associatif ». Nous entendons par là que la plupart des lois de composition auxquelles on a affaire en Mathématiques sont associatives [4], ce qui veut dire ceci : supposons qu'on ait des transformations $f, g, h, \ldots$ et un moyen de les composer (gf représentant la transformation composée de f suivie de g), alors on a la relation $(hg)f = h(gf)$.

(1) *Confessions* I, livre VI.
(2) La « morale de l'histoire » se trouve aux paragraphes 3.4 et 3.5 ci-dessous.
(3) Leçon MaMuX du 9 décembre 2006.
(4) Ou bien s'y ramènent aisément, par des constructions naturelles, si elles ne le sont pas elles-mêmes (comme le crochet de Lie par exemple).




Figure III.1. – Leitfaden




Figure III.2.

Par contre les Mathématiques sont loin d'être un « monde commutatif » : si f et g sont composables dans les deux sens, en général gf *n'est pas égal à* fg. On dit que f commute à g lorsque $gf = fg$.




Figure III.3.

Autrement dit, la commutativité est la possibilité de changer l'*ordre des opérations*, tandis que l'associativité est la possibilité de changer le *groupement des opérations*, sans affecter le résultat.

La non-commutativité est du reste un phénomène fort commun : si l'on demande son chemin et que l'on s'avise de permuter l'ordre des déplacements indiqués, il y a peu de chance que l'on parvienne à destination... Gardons-nous donc de voir du « quantique » dans tout ce qui est non commutatif !

Écartons encore un malentendu à propos du terme « non commutatif » : il faut prendre garde qu'en Mathématiques, ce terme est bien plus souvent employé dans le sens de « *non nécessairement commutatif* » (et donc représente une généralisation du cas commutatif) que comme négation de « commutatif ».

Commençons à présent notre exploration en partant du haut du Leitfaden.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

2 — Petite boîte à outils d'algèbre linéaire

L'*Algèbre linéaire* est la partie la plus simple des Mathématiques. Elle est issue de la méthode des coordonnées cartésiennes pour repérer les points d'une droite, d'un plan, ou de l'espace. Cette méthode étant uniforme dans les trois cas, on en est venu, dans les années 1840, à l'étendre en dimension n plus grande, quitte à se passer de l'intuition géométrique immédiate. Fixer une origine O permet d'identifier tout point P au vecteur $\vec{OP}$; l'addition des vecteurs, familière en Statique et en Cinématique, se transporte alors à la droite, au plan, voire à l'espace à n dimensions, et correspond à l'addition des coordonnées lorsqu'un repère d'origine O est fixé.

Un peu plus tard, Grassmann a entrepris de dégager l'algèbre linéaire de l'arbitraire des choix de repères, en calculant directement avec les objets géométriques. Mais l'entreprise n'a abouti qu'avec Peano (1888, après l'introduction du langage ensembliste par Dedekind et Cantor), qui a forgé la petite boîte à outils brièvement présentée ci-dessous.

2.1 — Espaces vectoriels

Ces espaces, dont les points sont appelés *vecteurs*, ont une origine (le vecteur nul noté simplement 0) ; les vecteurs peuvent être additionnés entre eux [5]

$$v_1, v_2 \mapsto v_1 + v_2,$$

et peuvent être multipliés par des nombres [6] (réels ou complexes, suivant la situation [7]) d'autre part

$$v \mapsto \lambda \cdot v.$$

2.2 — Applications linéaires

Les espaces vectoriels forment une catégorie dont les morphismes sont les applications linéaires : étant donnés deux espaces vectoriels V et W, une application linéaire $F : V \to W$ est une règle qui associe à tout vecteur v de V un vecteur $F(v)$ de W vérifiant les compatibilités naturelles relatives à la structure d'espace vectoriel, à savoir :

$$F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2), \quad F(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot F(v).$$

Les applications linéaires de V vers W forment elles-mêmes un espace vectoriel : $F + G$ est l'application linéaire définie par $(F + G)(v) = F(v) + G(v)$, et $\lambda \cdot F$ est l'application linéaire définie par $(\lambda \cdot F)(v) = \lambda \cdot F(v)$.

(5) L'addition des vecteurs est associative et commutative, l'addition de 0 à un vecteur v ne change pas v, et tout vecteur v admet un opposé $-v$, qui, lui étant ajouté, donne $v + (-v) = 0$; on dit que $(V, +)$ est un « groupe abélien » (ou commutatif).

(6) La multiplication d'un vecteur v par le nombre 1 ne change pas v. Par ailleurs, la multiplication de v par un nombre vérifie la relation d'« associativité » $(\lambda_1\lambda_2) \cdot v = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot v)$ et est liée à l'addition des vecteurs par les relations de « distributivité » $\lambda \cdot (v_1 + v_2) = \lambda \cdot v_1 + \lambda \cdot v_2$ et $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot v = \lambda_1 \cdot v + \lambda_2 \cdot v$. On allège souvent l'écriture en se dispensant du point : on écrit λv au lieu de $\lambda \cdot v$.

(7) On parle d'espace vectoriel réel ou complexe, respectivement ; en général, dans ce chapitre, nous considérons des espaces vectoriels complexes.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Un cas qui nous intéresse particulièrement est celui où $V = W$. On parle alors d'*opérateur* (sous-entendu : linéaire) sur V plutôt que d'application linéaire de V vers V, et on note $\mathcal{L}(V)$ l'espace vectoriel des opérateurs (linéaires) de V ($\mathcal{L}$ comme « linéaire »). Du fait que les espaces de départ et d'arrivée coïncident, on peut *composer* les opérateurs entre eux : $GF : V \xrightarrow{F} V \xrightarrow{G} V$.

2.3 — Bases, dimension, matrices

La *dimension* d'une espace vectoriel est le « nombre de ses degrés de liberté ». Un peu plus précisément, l'espace vectoriel V est de dimension finie n si tout vecteur v peut s'écrire de façon unique comme *combinaison linéaire*

$$v = \lambda_1 e_1 + \ldots + \lambda_n e_n$$

de vecteurs particuliers $e_1, e_2, ..., e_n$, formant ce que l'on appelle une *base* de V. Les nombres λ_i sont les *coordonnées* de v dans cette base (retour aux coordonnées cartésiennes !).




Figure III.4.

Une base étant fixée, se donner un vecteur revient donc à se donner n nombres λ_i. De la sorte, tout espace vectoriel réel de dimension n s'identifie à $\mathbb{R}^n$ modulo le choix d'une base ; de même, tout espace vectoriel complexe de dimension n s'identifie à $\mathbb{C}^n$.

Si F est un opérateur, on peut écrire $F(e_1) = \sum_i \lambda_{i1} e_i$, ..., $F(e_n) = \sum_i \lambda_{in} e_i$.

Une base étant fixée, se donner un opérateur revient donc à se donner une *matrice* carrée

$$\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \ldots & \lambda_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{n1} & \ldots & \lambda_{nn} \end{pmatrix}.$$

La composition des opérateurs s'exprime très simplement en termes de leurs matrices :

$$F \leftrightsquigarrow \lambda_{ij},\ G \leftrightsquigarrow \mu_{ij},\ GF \leftrightsquigarrow \sum_k \mu_{ik}\lambda_{kj}.$$

En termes catégoriques, cela se traduit comme suit (*cf.* chap. II, 5.5) : la catégorie dont les objets sont les entiers naturels et les morphismes les matrices est équivalente à la catégorie dont les objets sont les espaces vectoriels de dimension finie et les morphismes sont les applications linéaires.

2.4 — Importance des problèmes linéaires

Le rôle de l'Algèbre linéaire est de traiter les « problèmes linéaires », c'est-à-dire, *grosso modo*, ceux dont l'ensemble des solutions est naturellement muni d'une structure d'espace vectoriel (comme par exemple la propagation des ondes). Ces problèmes sont particulièrement faciles en dimension finie [8].

(8) Du moins du point de vue théorique. En revanche, bien des problèmes concrets de calcul numérique sont des problèmes linéaires en très grande dimension qui font peiner les ordinateurs...

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

En mécanique classique, les problèmes sont souvent non linéaires, mais de dimension finie. Une technique classique consiste à se ramener, par une approximation au premier ordre, au cas linéaire, ce qui permet d'appliquer les techniques de l'Algèbre (ou de l'Analyse) linéaire pour traiter le problème approché.

En mécanique quantique, la situation est en quelque sorte opposée : le principe de superposition nous assure que les équations d'évolution sont linéaires ; mais cette fois la difficulté vient du fait que la dimension est infinie.

C'est une difficulté sérieuse : l'Algèbre linéaire pure « bute » en dimension infinie. Par exemple, l'expression $\sum_k \mu_{ik}\lambda_{kj}$ qui traduit la composition des opérateurs devient une somme infinie et n'a donc pas de sens en général. Pour qu'elle ait un sens, il faut que la série soit convergente, et pour cela il faut introduire un peu de topologie...

Nous y reviendrons après un certain détour. Mais il nous reste à clore ces généralités sur l'Algèbre linéaire en précisant la notion d'« algèbre » — au sens technique que lui donne le domaine des Mathématiques appelé « Algèbre » (tout comme le terme *topologie* vu au chapitre précédent, « algèbre » désigne à la fois un domaine des Mathématiques et une structure mathématique particulière appartenant à ce domaine).

2.5 — Algèbres

Une *algèbre* est un espace vectoriel muni d'une loi de composition

$$(g, f) \to gf$$

qui est associative, bilinéaire et avec un élément unité 1 (vérifiant $1f = f1 = f$ pour tout élément f de l'algèbre).

Elle est dite commutative si l'on a toujours $gf = fg$. Par exemple l'espace vectoriel des *fonctions* [9] $f : X \to \mathbb{C}$ sur un espace X quelconque, muni de la multiplication entre fonctions (définie par $(fg)(x) = f(x).g(x)$) est une algèbre *commutative*.

Un exemple d'algèbre *non commutative* [10] est l'algèbre $\mathcal{L}(V)$ des *opérateurs* $F : V \to V$, munie de la composition (on notera I l'élément unité, c'est-à-dire l'opérateur « qui ne fait rien »). Nous verrons en particulier que les algèbres de von Neumann sont des sous-algèbres (*i.e.* des sous-ensembles stables par addition, multiplication par un nombre, et composition) de $\mathcal{L}(V)$.

Remarquons également que si A est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(V)$, on peut en fabriquer une autre en prenant son *commutant* A', c'est-à-dire l'ensemble de tous les opérateurs qui commutent à tout opérateur dans A. Le commutant de $\mathcal{L}(V)$ est réduit aux opérateurs dits « scalaires » (ceux qui multiplient tout vecteur de V par un nombre fixe).

On vérifie que $A' = A'''$, et après une petite contorsion d'esprit, on en déduit qu'une algèbre A est égale à son bi-commutant A'' si et seulement si A est elle-même un commutant. Ce n'est pas automatiquement le cas, du reste.

(9) Rappelons qu'une fonction f sur un ensemble X est une règle qui associe à tout élément de X (ou parfois seulement à certains d'entre eux) un nombre réel ou complexe. On met en général des conditions supplémentaires adaptées à l'ensemble particulier X que l'on considère. Par exemple, si X est un espace « topologique », il est naturel de considérer des fonctions continues (*cf.* chap. II, 1.5).

(10) Lorsque V est de dimension 0 ou 1, elle est en fait commutative.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

3 — Espaces et fonctions. Vers la Géométrie non commutative

Revenons au Leitfaden de ce chapitre, et quittons temporairement la direction verticale pour la direction horizontale, en partant de la gauche.

Il n'y a pas de notion générale d'« espace en tant qu'espace » en Mathématiques. Jusqu'à présent, même les écoles les plus doctrinaires se sont abstenues de s'approprier symboliquement cette notion commune au moyen d'une définition mathématique préalable générale [11]. En revanche, il existe bien des *points de vue mathématiques* sur la notion commune d'espace, dont dérivent beaucoup de types d'espaces mathématiques particuliers, toujours flanqués d'un prédicat (nous avons déjà rencontré les espaces topologiques et les espaces vectoriels).

Nous allons brièvement décliner trois de ces points de vue qui donnent lieu à des « catégories » d'espaces particuliers : grandeur, localité, topographie. Démêler ces trois points de vue fut d'ailleurs un très long travail conceptuel, achevé peu avant la première guerre mondiale.

3.1 — « Grandeur »

D'une certaine façon, c'est peut-être le point de vue le plus ancien (problèmes d'arpentage de l'antiquité). En termes mathématiques contemporains, nous avons ici en vue tout ce qui se rapporte à la Théorie de la mesure, qui traite des *espaces mesurés* $(X, \mathfrak{B}, \mathrm{d}\mu)$. Une mesure $\mathrm{d}\mu$ est une fonction à valeurs positives ou infinies sur une tribu $\mathfrak{B}$ de parties de X, qui est additive pour la réunion disjointe d'une collection finie ou dénombrable de parties deux à deux disjointes. Une *tribu* est un ensemble de parties stable par passage au complémentaire et par réunion dénombrable.

Les fonctions $f : X \to \mathbb{C}$ qu'il est naturel de considérer dans ce contexte sont les fonctions (mesurables, c'est-à-dire celles pour lesquelles l'image inverse de tout ouvert de $\mathbb{C}$ est dans $\mathfrak{B}$) *bornées presque partout*, c'est-à-dire bornées hors d'une partie de mesure nulle. Elles forment une algèbre commutative notée $\mathrm{L}^\infty(X, \mathfrak{B}, \mathrm{d}\mu)$ (ou $\mathrm{L}^\infty(X)$ pour abréger).

La Théorie de la mesure fait la synthèse entre les idées apparemment éloignées d'arpentage, de moyenne, de probabilité. Techniquement, la Théorie des probabilités s'y rattache en effet : une probabilité n'étant rien d'autre, selon la définition moderne (Kolmogorov), qu'une mesure telle que la mesure de l'espace X, vu comme ensemble de tous les événements possibles, soit égale à 1. S'y rattachent de même les aspects mathématiques de la mécanique statistique, où l'étude mécanique d'un système de très nombreuses particules est remplacé par celui de l'espace des états muni de la mesure de Gibbs au moyen de laquelle on prend les moyennes.

(11) Du point de vue historique, V. de Risi est parvenu à ce constat étonnant que l'idée de géométrie comme étude de l'espace en général (par opposition à des configurations particulières) n'est pas une conception antique, mais date essentiellement de Leibniz (avec quelques précurseurs comme Patrizi).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

C'est un chapitre passionnant de l'histoire des Mathématiques que l'étude des chemins sinueux et ramifiés ayant mené des antiques problèmes d'arpentage à la Théorie de la mesure, sous la forme définitive qu'elle a prise avec Lebesgue, en passant par le calcul intégral à partir de la seconde moitié du XVII^e siècle, par l'intégrale de Riemann au milieu du XIX^e, et par les travaux de Cantor, comme on l'a vu au premier chapitre.

3.2 — « Localité »

Il s'agit ici des notions de voisinage, de frontière, de compacité et de complétude, qui font l'objet de la Topologie générale, qui traite des *espaces topologiques* $(X, \mathfrak{O})$ (*cf.* chap. II, 1) [12].

Les fonctions sur X qu'il est naturel de considérer dans ce contexte sont les *fonctions continues*. Elles forment une algèbre commutative notée $C(X, \mathfrak{O})$ (ou $C(X)$ pour abréger).

3.3 — « Topographie »

Il s'agit ici des notions de cartes, de ligne de niveau, de géodésie en général, de courbure, etc. Nous avons ici en vue tout ce qui se rapporte à la Géométrie différentielle, et plus particulièrement à la Géométrie différentielle riemannienne, qui traite des *variétés riemanniennes* (X, ds^2) : variétés qui sont, *infinitésimalement*, linéaires et munies d'un « élément métrique » ds^2.

Les fonctions sur X qu'il est naturel de considérer dans ce contexte sont les *fonctions lisses*, c'est-à-dire indéfiniment différentiables (par exemple les fonctions coordonnées sur un espace vectoriel). Elles forment une algèbre commutative notée $C^\infty(X)$.

Ce point de vue est encore dû aux réflexions de Riemann sur les fondements de la géométrie « courbe » en toute dimension (après Gauss, qui traita le cas des surfaces dans un ouvrage célèbre, *cf.* chap. IV, 2.2).

3.4 — Le point de vue fonctionnel sur les espaces. Les points et leur ombre

Ce point de vue — qui est apparu à divers moments et dans divers contextes de l'histoire des Mathématiques — consiste *grosso modo* à *inverser le rôle de la fonction et celui de la variable* : au lieu de voir une fonction $f : X \to \mathbb{C}$ comme

(12) Puisque nous aurons à évoquer ci-dessous les espaces topologiques *compacts* ou *complets*, donnons, sans rentrer dans les détails techniques (voir chap. I, 3.2), une idée de ces deux notions voisines, en supposant pour simplifier qu'on dispose d'une métrique permettant de préciser numériquement la proximité de deux points ; on a alors aussi la notion de limite d'une suite de points.

La *complétude* d'un espace X reflète le fait qu'une suite de points converge (*i.e.* a une limite dans X) dès que les points sont tous arbitrairement proches les uns des autres à partir d'un certain rang. La *compacité* de X reflète le fait que de toute suite de points de X, on peut extraire une suite convergente, *i.e.* qui a une limite. Plus formellement, et dans les termes du chapitre II.2.3, ce qui est requis est que toute famille couvrante d'ouverts U_i de X, il existe une sous-famille couvrante finie.

Par exemple, les espaces $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$ sont complets mais non compacts. Les parties compactes de $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$ sont les parties bornées et fermées (*i.e.* qui contiennent leur frontière) ; elles sont aussi complètes.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

fonction (fixe) d'un point variable x de l'espace X, on regarde le point x comme fixe, et on considère son « ombre » constituée des valeurs $f(x)$ prises par toutes les fonctions f sur X (ou plus précisément la règle qui associe à une fonction variable f le nombre complexe $f(x)$).

Cela amène à remplacer l'espace X (mesuré, topologique, ou riemannien) par l'algèbre commutative $L^\infty(X)$, ou $C(X)$, ou $C^\infty(X)$ suivant le cas.

La question qui se pose alors est de savoir si l'on ne perd rien ce faisant. Notamment, peut-on récupérer un point à partir de son « ombre » ?

Il se trouve que sous des hypothèses assez larges, c'est effectivement le cas, comme nous le verrons plus loin : on retrouve *grosso modo* l'espace comme *spectre* de l'algèbre associée, c'est-à-dire essentiellement comme l'ensemble des « ombres » des points.

Mais, si l'on ne perd rien, que gagne-t-on ?

C'est, en premier lieu, de pouvoir *calculer* : *on calcule avec des fonctions* (qui forment une algèbre, à laquelle on peut appliquer les outils de l'Analyse classique), *et non avec les points d'un espace*. Autrement dit, on gagne de passer du visuel (Géométrie) au scriptural (Algèbre).

À cet égard, nous aimerions inviter le lecteur à une grande prudence en ce qui concerne les thèses sur le prétendu antagonisme calcul/raisonnement en Mathématiques. Ni le slogan romantique « les Mathématiques consistent à remplacer les calculs par des idées », ni les slogans opposés d'une certaine tradition logico-informaticienne (plus récente mais se réclamant non sans raison de Leibniz) ne rendent le moins du monde justice à la très délicate dialectique entre *calcul*, *raisonnement*, *problèmes*, *constructions*, et *formation de concepts* en Mathématiques.

Bien que ces leçons privilégient de manière presque exclusive le cinquième terme de cette dialectique, il convient de ne pas négliger le rôle essentiel des autres si l'on veut éviter de se forger une image complètement déformée de la pensée mathématique. (13).

3.5 — Comment le non commutatif s'introduit aussi subrepticement que naturellement dans le point de vue fonctionnel sur les espaces, en reléguant les points dans l'ombre. L'idée de Géométrie non commutative

Beaucoup d'espaces intéressants s'obtiennent par recollement. Par exemple, toute variété de dimension n s'obtient par recollement de « cartes » qui sont des parties ouvertes de $\mathbb{R}^n$.

L'opération de recollement est donc une des opérations les plus fondamentales de la Géométrie, et dans beaucoup de problèmes, il importe de ne pas considérer seulement le résultat du recollement, mais de garder trace de l'opération même de recollement. Comment traduire cela dans le point de vue fonctionnel esquissé ci-dessus ?

(13) Ainsi, pour ne citer qu'un exemple parmi bien d'autres, la Théorie des graphes ne s'est pas constituée par une méditation approfondie sur l'essence de la notion de graphe, immédiatement saisissable, mais par la combinaison féconde de problèmes, constructions et raisonnements.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Considérons le cas le plus simple, passablement trivial, d'un espace X constitué d'un seul point, obtenu en identifiant deux espaces du même type $\{x\}$ et $\{y\}$. L'algèbre des fonctions sur la réunion disjointe $\{x\} \cup \{y\}$ est l'algèbre commutative $\mathbb{C}^2$ des couples de nombres (un pour chaque point). L'opération ensembliste de recollement se traduit alors en considérant tous les opérateurs sur $\mathbb{C}^2$, c'est-à-dire l'algèbre non commutative de toutes les matrices 2×2

$$\begin{pmatrix} \lambda_{xx} & \lambda_{xy} \\ \lambda_{yx} & \lambda_{yy} \end{pmatrix}.$$

Dans le cas beaucoup moins trivial quoique similaire d'une variété compacte X obtenue par recollement de « cartes », l'algèbre qui décrit le recollement est l'algèbre des matrices infinies $(f_{x,x'})$, nulles à l'infini, indexées continûment par les couples de points où le recollement a lieu. C'est une algèbre non commutative de dimension infinie.

Toutefois, dans ces deux exemples, on peut encore retrouver les points (c'est-à-dire l'espace X lui-même) à partir de spectres, comme dans le cas commutatif : du point de vue spectral, les algèbres non commutatives que l'on voit apparaître par recollement sont en fait équivalentes à l'algèbre commutative des fonctions sur X. Cela est dû au fait que les espaces en question obtenus par recollement restent très « conventionnels » du point de vue de l'Analyse classique.

En revanche, pour des recollements plus sauvages (comme ceux qui apparaissent quand on considère les feuilles d'un feuilletage associé à un système dynamique), ce n'est plus du tout le cas. L'espace recollé peut avoir très peu de points « physiques » subsistants — l'opération de recollement ayant relégué en quelque sorte les points dans l'ombre (ou dans la colle!). Le point de vue ensembliste est totalement inadéquat pour décrire des situations de cette sorte (pourtant communes dans la Théorie des systèmes dynamiques par exemple), et il en est de même de l'Analyse classique : l'algèbre commutative des fonctions des points de cet espace recollé est un objet beaucoup trop pauvre pour décrire le recollement en question. Il devient nécessaire de remplacer résolument ensembles de points et algèbres de fonctions par une algèbre non commutative du type de celles considérées ci-dessus.

Parvenu à ce stade, on peut alors retourner complètement le point de vue et tâcher de définir et d'étudier directement, en termes d'algèbres non commutatives, les structures qui correspondaient, dans les situations géométriques classiques, aux notions de grandeur (mesure), de localité (topologie), de topographie (géodésie). Ce sont ces algèbres non commutatives qui remplacent les espaces, ou plutôt, qui jouent le rôle d'« espaces non commutatifs » sans points.

C'est là l'objet de la *Géométrie non commutative*, initiée et développée principalement par A. Connes (ce discours ci-dessus passe sous silence les motivations et sources d'inspiration très importantes provenant de la mécanique quantique et de la physique statistique quantique. Nous y ferons brièvement allusion plus loin).

Dans la suite, nous nous concentrerons sur l'aspect « théorie de la mesure » de la Géométrie non commutative, qui n'est autre que la théorie des algèbres de von Neumann et des poids (théorie qui est en fait antérieure à la Géométrie non commutative).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

4 — Espaces de Hilbert et Analyse fonctionnelle

Revenons derechef au Leitfaden de ce chapitre, en reprenant la direction verticale là où nous l'avions laissée, c'est-à-dire au passage à la dimension infinie en Algèbre linéaire.

4.1 — Espaces euclidiens

Revenons d'abord brièvement à Euclide. Il construisait des triangles, abaissait des perpendiculaires, comparait des angles et des longueurs de côtés. Deux millénaires et demi après, on considère que pour faire ces opérations, le substrat adéquat est celui d'espace euclidien, défini comme suit.

Un *espace euclidien* (14) est un espace vectoriel V de dimension finie muni d'un *produit scalaire* (15), qui associe à tout couple de vecteur (v_1, v_2) un nombre (réel ou complexe) noté $< v_1, v_2 >$. On requiert que

- $< v_1, v_2 >= \overline{< v_2, v_1 >}$
- $< \lambda_1 v_1, \lambda_2 v_2 >= \bar{\lambda}_1 \lambda_2 < v_1, v_2 >$,
- que $< v_1, v_2 >$ soit additif en v_1 et en v_2 et soit un nombre positif non nul lorsque $v_1 = v_2 \neq 0$.

À partir du produit scalaire, on définit la *norme* (ou longueur) d'un vecteur (16) :

$$|v| = \sqrt{< v, v >}.$$

La norme permet de mesurer la distance entre deux vecteurs (c'est la norme de la différence des vecteurs). Outre la norme, le produit scalaire permet aussi de définir la notion d'*orthogonalité* $\perp$ (ou perpendicularité) : deux vecteurs v_1, v_2 sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul ; on a alors la « relation de Pythagore »

$$|v_1 + v_2|^2 = |v_1|^2 + |v_2|^2.$$

Étant donné un sous-espace W de l'espace euclidien V, l'espace orthogonal à W, formé des vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de W, est noté $W^\perp$. On a $W^{\perp\perp} = W$. En outre, V se décompose en $V = W \oplus W^\perp$, autrement dit tout vecteur $v \in V$ s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur $w \in W$ (la projection de v dans W, qu'on écrit aussi $P_W(v)$) et d'un vecteur $w^\perp$ orthogonal à w.

Le produit scalaire permet aussi de définir l'*adjoint* F^* d'un opérateur $F \in \mathcal{L}(V)$. Une façon abstraite et intrinsèque est de dire que l'adjoint satisfait l'équation (17)

$$< F^*(v), w > = < v, F(w) > .$$

Une façon plus concrète (mais équivalente) est d'utiliser les matrices associées (modulo le choix de bases *orthonormées*, c'est-à-dire formées de vecteurs orthogonaux et de norme 1) : l'adjonction est l'opération qui remplace lignes par colonnes et passe au conjugué complexe, c'est-à-dire $(\lambda_{ij}) \rightsquigarrow (\bar{\lambda}_{ji})$. On a :

$$F^{**} = F, \quad (GF)^* = F^* G^*.$$

(14) Réel ou complexe ; on dit aussi espace hermitien plutôt qu'espace euclidien complexe.
(15) Dans le cas du plan euclidien réel proprement dit, le produit scalaire $< v_1, v_2 >$ n'est autre que le produit des normes (= longueurs) de v_1 et de v_2 par le cosinus de l'angle entre v_1 et v_2.
(16) Qui correspond intuitivement, si l'on pense à un vecteur $\vec{OP}$ dans la plan, à sa longueur.
(17) Qui rappelle la notion catégorique d'adjoint, et s'interprète bel et bien dans ce cadre.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com




Figure III.5.

Par exemple, considérons le *projecteur* P_W sur un sous-espace vectoriel W de V. C'est l'opérateur qui à tout vecteur $v \in V$ associe sa composante dans W eu égard à la décomposition $V = W \oplus W^\perp$ (ce point se décrit aussi comme le point de W le plus proche de v).

Alors P_W vérifie les équations $P_W = P_W^* = P_W P_W$, et ces équations caractérisent les opérateurs qui sont des projecteurs.

Autre exemple important : les opérateurs *unitaires*. Ce sont ceux (inversibles) qui préservent le produit scalaire. Ils vérifient les équations $U^*U = UU^* = I$, qui les caractérisent.

4.2 — Espaces de Hilbert

Il s'agit de la généralisation en dimension infinie des espaces euclidiens. Ces espaces ont été introduits par Hilbert en 1909, pour développer l'Analyse fonctionnelle abstraite, dont le point de départ consiste à *considérer des fonctions comme points* d'un espace vectoriel topologique idoine — dans les cas les plus simples, d'un espace de Hilbert [18].

Un espace (vectoriel) *de Hilbert* $\mathcal{H}$ admet un produit scalaire tout comme un espace euclidien, mais il est de dimension infinie (dénombrable, pour simplifier), et complet (pour la distance définie par la norme définie elle-même par le produit scalaire comme ci-dessus). En particulier, $\mathcal{H}$ admet une base orthonormée infinie $(\ldots, e_{-1}, e_0, e_1, e_2, \ldots)$, et tout vecteur $v \in \mathcal{H}$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire infinie convergente

$$v = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} \lambda_n e_n, \quad \text{où} \quad \lambda_n = < e_n, v >,$$

et on a la « relation de Pythagore » en dimension infinie $|v|^2 = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} |\lambda_n|^2$.

Les espaces de Hilbert ressemblent donc beaucoup aux espaces euclidiens, mais la dimension infinie donne une plus grande souplesse (bien qu'il n'existe, à isomorphie près, qu'un seul espace de Hilbert [19] ; par exemple, $\mathcal{H}$ peut être décomposé en somme directe de deux copies de lui-même !).

(18) Voir L. Schwartz, *Analyse hilbertienne*, Hermann, Paris, 1979.
(19) Sous-entendu : de dimension dénombrable.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

L'exemple standard est fourni par les séries de Fourier [20]. Étant donné deux fonctions périodiques $f_1(t)$ et $f_2(t)$ de période 2π, on définit leur produit scalaire par :

$$< f_1, f_2 >= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \bar{f}_1 f_2 \, \mathrm{d}t$$

L'espace $\mathcal{H}$ des fonctions f pour lesquelles $< f, f >$ est bien défini, est un espace de Hilbert. Une base orthonormée est donnée par $e_n = e^{\sqrt{-1}nt}$ (où n est un entier positif ou négatif quelconque) : tout $f \in \mathcal{H}$ s'écrit de manière unique

$$f = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} < e_n, f > e_n.$$

4.3 — Opérateurs sur un espace de Hilbert et algèbres stellaires

Un opérateur sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ est une application linéaire $\mathcal{H} \xrightarrow{F} \mathcal{H}$ continue (ce qui revient à dire qu'elle est bornée sur la *boule unité* formée des vecteurs de norme au plus 1). La norme de F est le maximum des normes des valeurs que prend F sur la boule unité.

Les opérateurs se composent, et forment une algèbre non commutative notée $\mathcal{L}(\mathcal{H})$, munie d'une norme $|\ |$ et d'une involution (l'adjonction $F \mapsto F^*$). On a la relation $|FF^*| = |F|^2$. De manière générale, une algèbre munie d'une involution et d'une norme vérifiant cette propriété répond au beau nom d'*algèbre stellaire*.

5 — Spectres

5.1 — De Newton à Gelfand

L'histoire des spectres en sciences physico-mathématiques est une histoire merveilleuse pour laquelle nous renvoyons aux travaux de J. Mawhin.

Il semble que les spectres apparaissent pour la première fois en physique chez Newton à propos de la dispersion de la lumière solaire par un prisme (1671). D'après Mawhin,

> le développement de ces travaux au cours du XIX^e siècle conduit à la spectroscopie, indispensable outil d'exploration de l'infiniment grand (astrophysique) et de l'infiniment petit (physique atomique). L'introduction du mot « spectre » en Mathématiques est beaucoup plus tardive (fin du XIX^e siècle), mais les notions qu'il recouvre sont plus anciennes et trouvent leur origine dans des disciplines mathématiques multiples (équations différentielles, Mécanique céleste, Géométrie analytique, Physique mathématique, théorie de propagation de la chaleur, Algèbre). Il faut attendre le XX^e siècle pour que les notions physique et mathématique de spectre se réconcilient, au sein de la mécanique quantique.

(20) On y reviendra au chapitre VI.3.2. J. Fourier, préfet de l'Isère, est l'auteur de la théorie de la chaleur — pour laquelle il inventa il y a 200 ans le développement en séries trigonométriques (séries de Fourier) et la transformation de Fourier — et du bel aphorisme selon lequel les Mathématiques « *n'ont pas de signe pour exprimer les notions confuses* ».

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

On a pu dire que le spectre d'un élément chimique est comme son « code-barre ». Dans le cas de l'hydrogène, les raies du spectre d'émission obéissent à la loi arithmétique de fréquence en $\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}$ $(n > m)$ (loi de Ritz-Rydberg 1890), dont l'incompatibilité avec les lois de Newton et de Maxwell a été l'une des sources de l'émergence de la mécanique quantique de Heisenberg et Schrödinger (1925–26).

Du côté mathématique, si $F \in \mathcal{L}(V)$ est un opérateur, *son spectre* est l'ensemble des nombres complexes λ tels que $F - \lambda I$ ne soit pas inversible [21].

Par exemple, si l'on prend comme opérateur un projecteur P d'un espace euclidien ou de Hilbert, le spectre de P est contenu dans l'ensemble à deux éléments $\{0, 1\}$. Plus généralement, si un opérateur (continu) est auto-adjoint, c'est-à-dire si $F = F^*$, son spectre est un sous-ensemble compact de $\mathbb{R}$.

Si l'on considère en revanche des opérateurs auto-adjoints « non continus » [22], alors le spectre est réel mais pas nécessairement compact (c'est le cas notamment des opérateurs hamiltoniens de la mécanique quantique).

Revenant au cas d'un opérateur (continu) auto-adjoint F, on peut aussi définir son spectre comme l'ensemble des caractères (= fonctions linéaires multiplicatives [23]) de l'algèbre stellaire $A = \mathbb{C}[F]$ qu'il engendre. Ceci permet d'étendre la notion de spectre au cas d'une algèbre stellaire commutative quelconque A : Gelfand définit le *spectre* de A comme l'ensemble des caractères de A. C'est de manière naturelle un espace topologique compact (mais plus forcément un ensemble de nombres).

5.2 — Retour au point de vue fonctionnel. Les théorèmes de Gelfand et de Riesz

Revenons maintenant au point de vue fonctionnel (*cf.* chap. III, 3.4), et précisons le fait qu'on « ne perd rien » dans ce passage.

Commençons par le cas d'un espace topologique compact $(X, \mathfrak{O})$. On lui associe l'algèbre stellaire commutative $A = C(X, \mathfrak{O})$ des fonctions continues à valeurs complexes sur X [24].

Réciproquement, partant d'une algèbre stellaire commutative A, Gelfand lui associe son spectre X qui est un espace topologique compact. Le théorème de Gelfand dit que ces deux opérations sont *inverses* l'une de l'autre. En particulier, on récupère X à partir de A : un point $x \in X$ correspond à un caractère χ défini par la formule

$$f(x) = \chi(f) \text{ pour tout } f \in A.$$

Supposons en outre que X soit muni d'une mesure $\mathrm{d}\mu$ (et pour faire « bonne mesure », faisons aussi l'hypothèse technique que la topologie de X provient

(21) Un opérateur F est dit *inversible* s'il existe un opérateur G tel que $FG = GF = I$, où I est, rappelons-le, l'opérateur identité. On reviendra sur les spectres au chapitre VI.1.1.

(22) Contrairement à notre convention précédente selon laquelle les opérateurs d'un espace de Hilbert sont par définition continus.

(23) En particulier, tout caractère χ vérifie $\chi(ff^*) \geqslant 0$ et $\chi(1) = 1$.

(24) L'involution $f \mapsto f^*$ étant induite par la conjugaison complexe, et la norme $|f|$ étant le maximum des modules des valeurs prises par f sur X.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

d'une métrique [25]). La mesure $\mathrm{d}\mu$ permet d'intégrer les fonctions, et définit donc une application linéaire

$$\mu : A = C(X) \to \mathbb{C}, \quad \mu(f) = \int_X f \,\mathrm{d}\mu,$$

telle que $\mu(ff^*) \geqslant 0$. Le théorème de Riesz (1909) affirme que, réciproquement, une telle fonction μ correspond toujours à une mesure $\mathrm{d}\mu$, telle que $\mu(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$ (cas particulier : le caractère associé à un point x n'est autre que la mesure de Dirac en x). On peut alors considérer l'espace de Hilbert

$$\mathcal{H} = \mathrm{L}^2(X, \mathrm{d}\mu) = \left\{ f \,\middle|\, \int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu < \infty \right\}$$

des fonctions complexes sur X de carré intégrable. Toute fonction presque partout bornée agit par multiplication sur $\mathcal{H}$, de sorte que l'algèbre $M = \mathrm{L}^\infty(X, \mathrm{d}\mu)$ des fonctions presque partout bornées est une sous-algèbre stellaire de $\mathcal{L}(\mathcal{H})$. Elle contient $A = C(X)$ et coïncide en fait avec le commutant de A. Elle est donc égale à son propre bicommutant : $M = M''$. En outre, μ s'étend à M, avec la même propriété de positivité.

En combinant les théorèmes de Gelfand et de Riesz, on voit que *les données géométriques* (espace topologique mesuré)

$$(X, \mathfrak{O}, \mathrm{d}\mu)$$

et *les données fonctionnelles*

$$(A, M \xrightarrow{\mu} \mathbb{C})$$

se déterminent mutuellement.

On peut alors préciser ce qui a été dit à la fin de 3.5 ci-dessus.

En Géométrie non commutative, c'est la théorie des algèbres stellaires non commutatives [26], *analogues non commutatifs des algèbres* $C(X, \mathfrak{O})$, *qui jouera le rôle de « topologie générale non commutative ».*

C'est la théorie des algèbres de von Neumann et de leurs poids, analogues non commutatifs des algèbres $M = \mathrm{L}^\infty(X, \mathrm{d}\mu)$ *et des mesures* μ, *qui jouera le rôle de « théorie de la mesure non commutative ».*

6 — Algèbres de von Neumann, facteurs et poids

6.1 — Ce que c'est

La théorie des algèbres de von Neumann a été créée en l'espace de quelques années (de 1936 à 1943) par von Neumann et son élève F. J. Murray. Leur motivation principale venait de la mécanique quantique : tentative de classification des algèbres d'observables qu'on y rencontre.

(25) On prend pour tribu $\mathfrak{B}$ la plus petite contenant les ouverts et les parties de mesure nulle.
(26) De préférence séparables en norme, ce qui reflète, dans le cas commutatif, la condition que le spectre peut être muni d'une métrique.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Une *algèbre de von Neumann* [27] (on dit aussi, plus simplement : *algèbre d'opérateurs*) est une sous-algèbre stellaire M de l'algèbre stellaire $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ des opérateurs sur un espace de Hilbert complexe $\mathcal{H}$, qui est égale à son bi-commutant (voir 2.4), c'est-à-dire telle que

$$M = M''.$$

C'est la généralisation non commutative de l'algèbre $L^\infty(X)$ des fonctions presque partout bornées sur un espace mesuré X.

Un *facteur* M est une algèbre de von Neumann telle que les seuls éléments de M qui commutent avec tous les autres sont les opérateurs scalaires (opérateurs de multiplication par un nombre fixe), ce qui revient à dire que

$$M \bigcap M' = \mathbb{C}.$$

Nous avons déjà rencontré des exemples simples de facteurs (les moins intéressants qui soient, à dire vrai) :

• pour tout $n = 1, 2, \ldots$ l'algèbre stellaire $I_n = \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ des matrices $n \times n$,

• l'algèbre stellaire $I_\infty = \mathcal{L}(\mathcal{H})$ des opérateurs (continus) sur l'espace de Hilbert.

Ce sont les facteurs *de type I*. On verra qu'il existe deux autres types bien plus intéressants.

Un théorème fondamental de von Neumann assure la possibilité de « désintégrer » toute algèbre de von Neumann M en facteurs ; les facteurs sont les briques élémentaires, et il suffit de les comprendre pour comprendre les algèbres d'opérateurs.

Voilà donc le début de la théorie de von Neumann : des motivations solides d'où est issu un concept fondamental bien précis (celui de facteur en l'occurrence). Il s'est alors agi de développer cette théorie :

1. développement d'une technologie aussi riche que celle de la théorie classique de la mesure (dans le cas commutatif). Par exemple la notion de mesure a un analogue dans le cas non commutatif, celle de *poids* ; le théorème de Riesz vu plus haut assure que dans le cas commutatif, il n'y a pas « deux poids, deux mesures », c'est la même chose.
2. Exploration de phénomènes nouveaux.
3. Construction et classification des facteurs.

6.2 — Facteurs de type *II* et géométrie en dimension continue

Soit $M \subset \mathcal{L}(\mathcal{H})$ un facteur. Murray et von Neumann ont eu l'idée de chercher à classifier les projecteurs P de M (voir 4.1), en s'inspirant de ce qui se passe en dimension finie n, c'est-à-dire pour le type I_n.

(27) Si par hasard un connaisseur tombait sur ces lignes, prévenons que, techniquement, nous nous limiterons souvent tacitement aux algèbres de von Neumann à prédual séparable. Sur les algèbres de von Neumann et leur usage en Géométrie non commutative, on peut consulter A. Connes, *Géométrie non commutative*, Interéditions, Paris, 1990 (deuxième éd. refondue chez Dunod, 2005).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Deux projecteurs P_1 et P_2 sont dits *équivalents* (on écrit $P_1 \sim P_2$) s'il existe un opérateur $V \in M$ tel que $P_1 = V^*V$ et $P_2 = VV^*$ (on a alors $P_2V = VP_1$). En dimension finie, cela signifie simplement que les dimensions des espaces vectoriels images des projecteurs sont les mêmes ; modulo équivalence, les projecteurs P sont donc entièrement classifiés par la dimension $D(P)$ de leur image.

Murray et von Neumann ont découvert quelque chose d'analogue pour tout facteur M. On peut associer de façon canonique à chaque projecteur P une *dimension* $D(P) \in [0, \infty]$ qui est un nombre réel positif ou l'infini, vérifiant :

1. $P_1 \sim P_2 \Leftrightarrow D(P_1) = D(P_2)$,
2. $P_1P_2 = 0 \Rightarrow D(P_1 + P_2) = D(P_1) + D(P_2)$.

On peut alors effectuer une première classification grossière des facteurs suivant les valeurs que peuvent prendre les dimensions des projecteurs. On obtient les cinq familles suivantes (y compris les deux vues précédemment), réparties en trois types :

$I_n : \{0, 1, 2, ..., n\}$
$I_\infty : \{0, 1, 2, 3, ...\}$
$II_1 : [0, 1]$
$II_\infty : [0, \infty]$
$III : \{0, \infty\}$

L'apparition de « dimensions continues » constitue la première grande découverte de la théorie. Ces dimensions apparaissent en fait comme des « densités de dimension », au sens où on pourrait dire que les entiers pairs sont de densité $1/2$ parmi tous les entiers.

Pour construire un exemple de facteur de type II_1, on peut s'y prendre de la manière suivante. Prenons un groupe (discret) dénombrable Γ d'opérateurs unitaires qui est « assez non commutatif » ; alors le commutant $M = \Gamma'$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ est un facteur de type II_1.

6.3 — Facteurs de type *III* et dynamique

Les facteurs de type III sont précisément ceux sur lesquels la théorie de la dimension de von Neumann et Murray ne dit rien. Pendant un quart de siècle, et bien que la provision d'exemples s'enrichît, cette classe resta complètement mystérieuse.

La deuxième grande découverte de la théorie les concerne, et vient des travaux de Tomita, Takesaki et Connes. Pour tout facteur M muni d'un poids μ, il existe un groupe à un paramètre d'évolution (analogue aux flots d'évolution dans le temps que l'on rencontre en mécanique statistique quantique)

$$t \mapsto \left(F \in M \mapsto e^{\sqrt{-1}tH_\mu} \cdot F \cdot e^{-\sqrt{-1}tH_\mu} \right),$$

qui ne dépend du poids μ qu'à conjugaison unitaire près. Il définit donc un morphisme canonique de groupes

$$\delta : \mathbb{R} \to Out\, M,$$

où $Out\, M$ est le groupe des « automorphismes extérieurs » (c'est-à-dire les automorphismes à conjugaison unitaire près) du facteur M.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Il se trouve que les facteurs de type *III* sont justement ceux pour lesquels ce groupe à un paramètre d'évolution est non trivial : *les facteurs de type III sont des objets dynamiques.*

6.4 — Classification des facteurs moyennables

Comme dans beaucoup de théories, où des motivations solides et quelques exemples non triviaux ont mené, dans un premier mouvement, à la définition d'un objet mathématique fondamental, se pose le problème de la classification des objets répondant à cette définition. C'est là un second mouvement, en général très difficile et dont l'achèvement signe souvent la maturité de la théorie.

La classification des objets, loin de « sortir » de la définition même, requiert d'abord une période de « gestation » où s'accumulent des exemples provenant de constructions variées et parfois surprenantes, puis une période « taxinomique » où les objets construits sont analysés en détail et comparés entre eux ; vient un moment où l'on a l'impression d'avoir une liste complète. Reste à le démontrer.

Il arrive parfois qu'une classification complète soit impossible, et que cette impossibilité — en un sens précisé — soit démontrée. C'est en fait ce qui se passe pour les facteurs. La tâche de classification se complique alors : il s'agit de déterminer d'abord une « bonne » classe qui, tout en étant suffisamment ubiquitaire, soit susceptible de classification (nous y reviendrons au chapitre VI.4.1).

Dans le cas des facteurs, de nombreux travaux convergents ont permis de dégager cette « bonne » classe : c'est celle des *facteurs moyennables* caractérisés par la propriété d'être approximés par des sous-algèbres stellaires de dimension finie. Ce sont des algèbres de dimension infinie (sauf pour le type I_n), mais « pas trop » !

La classification des facteurs moyennables, due à A. Connes, est la suivante :

I_n

I_∞

II_1 : il n'y a qu'un seul facteur moyennable de ce type.

II_∞ : idem.

III_λ avec $\lambda \in]0,1[$: idem. En fait λ est directement relié à la dynamique δ (*cf.* 6.3) : l'ensemble $\{t : \delta(t) = 0\}$ est l'ensemble des $\frac{2\pi n}{\log \lambda}$ pour n entier quelconque.

III_1 : encore un seul facteur moyennable de ce type.

III_0 : dans cette rubrique, il y a une infinité de facteurs moyennables, tous décrits « géométriquement » à l'aide de la Théorie des systèmes dynamiques.

6.5 — Prolongements

Le facteur moyennable de type II_1 est l'un des plus remarquables de la liste, tant à cause de ses multiples propriétés que de ses applications. On peut le construire comme indiqué en 5.2 en prenant pour Γ un groupe localement fini (par exemple un groupe de substitutions sur un alphabet infini ou chaque élément du groupe ne permute qu'un nombre fini de lettres).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

C'est un facteur de dimension infinie, certes, mais il possède une double propriété de finitude : la moyennabilité — approximation par des sous-algèbres stellaires de dimension finie —, et l'existence d'une *trace*, c'est-à-dire un poids particulier qui joue le rôle d'une probabilité. C'est l'analogue non commutatif d'un espace de probabilités.

La classification des sous-facteurs du facteur II_1 moyennable par V. Jones a donné lieu à des nouveaux invariants pour la Théorie des nœuds, et a ouvert un nouveau chapitre des Mathématiques, la « topologie quantique ».

7 — Coda : Logique des interactions

En guise de conclusion, nous dirons quelques mots sur l'intervention surprenante du facteur moyennable de type II_1 en Logique, dans le cadre de la Théorie de la démonstration, plus précisément dans la récente « logique des interactions » de J.-Y. Girard [(28)].

Il est intéressant de remarquer que l'histoire en Logique mime un peu l'histoire que nous avons racontée à propos du changement de point de vue :

$$\text{espace des points} \rightsquigarrow \text{algèbres de fonctions} \rightsquigarrow \text{algèbres d'opérateurs.}$$

Le point de vue naïf d'espace de points correspond au point de vue des débuts de la Logique formelle : dans cette analogie les points correspondent aux *formules* logiques. Les fonctions, quant à elles, correspondent aux *programmes*, et l'équivalence de Gelfand entre espaces compacts de points et algèbres stellaires commutatives de fonctions correspond à l'équivalence de de Bruijn-Curry-Howard entre preuves et programmes. L'analyse poussée de la notion de preuve a souligné l'importance théorique de l'*élimination des coupures* (il s'agit, *grosso modo*, de transformer une preuve en une autre plus directe, en supprimant les lemmes intermédiaires), qui est associative d'après des résultats de Church-Rosser-Girard. Une description en termes topologiques classiques a été tentée (domaines de Scott), mais le résultat s'est avéré peu satisfaisant, les espaces obtenus étant non séparés ; cela correspond à la situation décrite en 3.5 des points « englués ».

Grâce à sa notion opératorielle de *rétroaction* dans le processus d'élimination des coupures, Girard est parvenu à donner une description géométrique (au sens non commutatif) de la situation, en termes de géométrie de dimension continue associée au facteur moyennable de type II_1, en jouant de la double propriété de finitude de ce facteur remarquable. l est impossible de rentrer ici dans les détails, mais disons simplement ce que devient la tautologie « de A, on infère A » dans ce nouveau contexte : on utilise la décomposition de l'espace de Hilbert en deux copies de lui-même, et l'avatar opératoriel de ladite tautologie est la matrice $\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}$ associée à cette décomposition.

(28) Voir *Le Point Aveugle. Cours de théorie de la démonstration*, Roma Tre, Octobre-Décembre 2004, *Hermann*, collection « Visions des Sciences ». Tomes I, II.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Temps. Géométrisation du temps et temporalité d'objets géométriques

« Ainsi du temps : il n'a pas d'existence propre.
C'est à partir des choses que naît le sentiment
de ce qui est achevé pour toujours,
réellement présent ou encore à venir.
Personne, il faut l'admettre, n'a le sentiment du temps en soi,
abstrait du mouvement ou du paisible repos des choses. »
Lucrèce. *De Rerum Natura* (1)

Si la géométrisation du mouvement, entreprise fondatrice de la science classique, a donné naissance au temps abstrait physico-mathématique, elle n'a cessé parallèlement d'effacer son rôle de variable indépendante, refoulant la description du devenir derrière l'étude de la géométrie des trajectoires accomplies. Aussi est-il surprenant d'observer, en mathématique, l'irruption d'idées qui vont dans le sens opposé. Nous en avons déjà vu une au chapitre III.6.3. En voici une plus radicale : toute forme géométrique a un « devenir » intrinsèque, une évolution canonique qui l'« arrondit » et aboutit à sa « mort » homogène. C'est cette idée de « devenir » des formes qui a permis de résoudre l'un des grands mystères des mathématiques, la conjecture de Poincaré.

Ce chapitre porte sur les rapports entre temps et géométrie, et analyse l'éclatement récent de la vision traditionnelle *statique* des figures géométriques.

Le premier volet évoquera donc la géométrisation du temps, ancrée dans la tendance séculaire des sciences physico-mathématiques à idéaliser le temps sensible et le refouler dans le spatial (supposé statique), pour conjurer le variable, l'éphémère, et tout ce qui paraît échapper aux invariants et à l'immuable visés par les lois physiques.

Le second volet évoquera le renversement de perspective que constitue la découverte révolutionnaire, il y a une trentaine d'années, d'une temporalité propre aux objets géométriques, et les enjeux de la vision *dynamique* qui s'en dégage (2).

1 — Géométrisation du temps

1.1 — Géométrisation galiléenne du mouvement

Il s'agit de l'entreprise fondatrice de la science moderne, au début du XVII^{e} siècle. On a quelque peine à saisir, aujourd'hui, l'objet de toutes ces controverses autour de la définition du mouvement, désormais si claire : le déplacement d'un objet sous l'effet de forces.

(1) L. I., v. 458–463, traduction J. Kany-Turpin.
(2) Exposé au colloque de l'IRCAM sur « produire le temps », 14 juin 2012. Une version de ce texte est parue chez Hermann (2014).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Selon le point de vue de la tradition aristotélicienne et scholastique, adossé à une ontocosmologie, le mouvement était indissoluble de la nature de l'objet, c'était une modification de qualités affectant son être, « l'acte de ce qui est en puissance » (3). Pour fonder une science du mouvement, Galilée doit donc substituer aux qualités des corps des quantités mesurables, renoncer aux explications causales (lieux naturels, impetus...), établir des invariants. La géométrisation du mouvement répond à cet impératif — même si le corpus géométrique dont disposait Galilée, essentiellement celui d'Euclide, était bien en-deçà de l'ambition du projet.

1.2 — Temps-repère vs. trajectoires

Chez Galilée déjà, il y a oscillation entre deux façons de considérer le temps, oscillation qui demeurera et s'amplifiera dans la suite de l'histoire de la dynamique.

Il y a d'une part une tendance à *l'oblitération du temps, à sa dissolution dans le spatial*. L'historien des sciences Koyré assigne deux sources à cette tendance chez Galilée :

> Il est plus « naturel », plus « facile », d'imaginer dans l'espace que de penser dans le temps. (4)

> La renonciation à l'explication causale renforce la tendance à la géométrisation, donc à la spatialisation. Au lieu de penser le mouvement, Galilée se le représente. (5)

Cette tendance le pousse même, au début de sa carrière, à prendre pour paramètre fondamental l'espace parcouru plutôt que le temps écoulé. Choix risqué : alors même qu'il possède une intuition correcte de la loi de la chute des graves, il croit un moment pouvoir déduire que la vitesse est proportionnelle à l'espace parcouru, ce qui est incorrect (lettre à Sarpi de 1604. Au niveau des trajectoires, cela revient à confondre deux courbes qui se ressemblent : la parabole et la chaînette). Il était du reste en bonne compagnie : Descartes fera une erreur analogue, et Léonard de Vinci l'avait faite avant lui bien qu'il sût déjà que « la gravité qui descend libre acquiert à chaque degré de temps un degré de mouvement et, à chaque degré de mouvement, un degré de vitesse » (6). Koyré conclut un peu abruptement :

> l'effort de géométrisation, soutenu et corroboré par l'imagination, non entravé par la pensée causale, dépasse le but qu'il s'était assigné : le but de la dynamique était de mathématiser le temps ; or, Galilée l'élimine. L'effort fourni aboutit à un échec. (7)

En fait, cette tendance à oblitérer le temps en faveur du spatial s'incarne plus tard chez Galilée, de manière plus nuancée, dans l'attention portée aux *trajectoires*. Se représenter correctement les trajectoires n'est du reste possible qu'en

(3) Aristote, Physique, III.
(4) A. Koyré, Études galiléennes, Hermann 2001, p. 97.
(5) Loc. cit. p. 103.
(6) Manuscrits de Léonard de Vinci, cité dans loc. cit. p. 95.
(7) Loc. cit. p. 103.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

rompant avec une philosophie naturelle fondée sur l'expérience commune, sur l'action immédiate, comme le souligne Bachelard :

> L'expérience *commune*, l'expérience vécue du jet d'une pierre coefficiente tellement l'importance de l'impulsion première qu'un esprit interrogé dans sa naïveté est toujours surpris d'*apprendre* que la trajectoire est symétrique par rapport à la verticale passant par son sommet. On ne *comprend* cette symétrie que lorsqu'on a accédé à la connaissance mathématique de la trajectoire. (8)

Il y a d'autre part la tendance à *faire du temps le paramètre d'évolution privilégié*, la variable indépendante t. C'est le point de vue adopté par Galilée dans son texte de maturité, les *Discorsi*. Invoquant la raison de simplicité, Galilée pose que c'est au temps et non à l'espace parcouru qu'il convient de rapporter la variation de la vitesse, avant d'affirmer que le mouvement de la chute des graves est uniformément accéléré, au sens où l'accroissement de vitesse est proportionnel au temps écoulé — et donc indépendante de la masse et de la nature du corps, contrairement à l'enseignement aristotélicien.

Incidemment, Galilée semble avoir hésité, et les historiens ont débattu de la date de cette loi de la chute des graves (et du statut du temps qu'elle suppose). Comme le raconte le physicien E. Klein au début de son livre *Les tactiques de Kronos*, ce sont des physiciens de Florence qui ont finalement tranché le débat en 2002, en envoyant un faisceau de protons sur les notes non datées de Galilée, pour en déterminer les teneurs en fer, cuivre, zinc et plomb, et établir la date par comparaison avec d'autres écrits datés. Verdict : 1604, année de la lettre à Sarpi ! L'oscillation était donc présente dès les débuts...

Ce rôle de paramètre fondamental t des équations de la physique sera encore plus saillant dans la physique newtonienne, adossé au postulat de l'existence d'un temps absolu s'écoulant uniformément.

L'oscillation entre les deux points de vue, *temps-repère vs. trajectoires*, se poursuivra longtemps. L'étude de l'évolution décrite par les équations différentielles en la variable t passe de plus en plus par celle de la *géométrie des trajectoires accomplies*. Le devenir est ainsi mis entre parenthèses, le temps n'étant plus qu'une paramétrisation implicite de ces trajectoires.

C'est encore plus apparent dans ces « portraits de phase » familiers en mécanique statistique où interagissent un grand nombre N de particules, où les coordonnées qui décrivent l'état du système ne sont plus le temps t et les positions x_i, mais les positions x_i et les vitesses $\dot{x}_i$ (comme chez le jeune Galilée) ; description redondante ($2N$ variables au lieu de $N+1$) mais parfois plus commode : par exemple une trajectoire sinusoïdale, comme celle d'une corde vibrante, est figurée par un simple cercle dans le portrait de phase.

Lautmann a consacré un article au temps, où il analyse cette dualité entre temps-paramètre et temps géométrisé (et cherché à penser leur complémentarité) :

> Le temps qui intervient dans l'énoncé des lois de la nature, en cinématique, en dynamique, en thermodynamique, etc... n'est donc pas le temps

(8) G. Bachelard, *Le rationalisme appliqué*, PUF, p. 176.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

> irréversible de la durée des choses ; le rôle qu'il y joue est simplement celui d'un facteur d'évolution et il serait parfaitement possible d'étudier l'évolution des phénomènes physiques en fonction d'une autre grandeur prise comme variable indépendante. Il résulte de ces considérations que nous pouvons distinguer nettement deux sortes de propriétés sensibles du temps, celles qui se rattachant aux notions de dimensions et d'orientation, sont des propriétés géométriques du temps, et celles qui se rattachant à la notion d'évolution, déterminent en particulier les propriétés dynamiques des corps. (9)

Quoi qu'il en soit, le souci du temps allait modifier profondément la géométrie, comme l'a souligné E. Borel :

> En quoi consiste la première des grandes transformations de la géométrie dans les temps modernes ? A introduire, sous une forme voilée, il est vrai, le temps et le mouvement jusque dans la considération des figures. Pour les anciens la géométrie était une science statique. Les figures en étaient données tout d'un coup à l'état achevé, semblables aux idées platoniciennes. Mais l'essence d la géométrie cartésienne (bien que Descartes ne lui ait pas donné cette forme) fut de considérer toute courbe plane comme décrite par le mouvement d'un point... Substituer une équation à une figure consiste, en somme, à voir où l'on en est du tracé de la courbe à n'importe quel moment, au lieu d'envisager ce tracé tout d'un coup. (10)

1.3 — Temps irréversible

La dynamique newtonienne est effectivement réversible : rien n'empêche la nature de défaire ce qu'elle fait, puisque les équations sont invariantes par changement de sens du temps : $t \mapsto -t$.

Il en est de même de l'équation des cordes vibrantes de D'Alembert

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = \Delta x.$$

Mais ce n'est plus le cas de l'équation de la chaleur de Fourier

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \Delta x.$$

La dynamique décrite par cette dernière équation (par exemple la diffusion de la température x dans un milieu) est irréversible : le flot de la chaleur s'accompagne d'une perte de mémoire des conditions initiales. Tout au long de l'évolution, l'entropie augmente et n'atteint son maximum qu'à l'état d'équilibre (second principe de la thermodynamique de Clausius, préfiguré par S. Carnot dans ses *Réflexions sur la puissance motrice du feu* de 1824). C'est la fameuse *flèche* qu'Eddington attribuait au temps un siècle après Carnot — flèche du temps à ne pas confondre avec le cours du temps : il s'agit plutôt de cette orientation temporelle de certains événements dont les effets sont ineffaçables une fois accomplis.

L'irréversibilité du temps a fait couler beaucoup d'encre, et ce n'est pas ici le lieu d'en rapporter les enjeux (jusque dans la philosophie de Bergson : la citation de Borel ci-dessus est d'ailleurs extraite d'une polémique avec Bergson).

(9) A. Lautmann, *Le problème du temps*, réédité dans *Les mathématiques, les idées et la physique*, Vrin 2006, p. 279.
(10) « L'évolution de l'intelligence géométrique », *Revue de métaphysique et de morale*, XV 1907.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

1.4 — Continuum espace-temps de la relativité

L'aboutissement de la tendance séculaire à la géométrisation du temps, c'est la relativité d'Einstein. Elle signe et théorise la perte d'autonomie du temps (abandon du temps absolu et de la simultanéité).

On sait qu'elle est née du constat de l'incompatibilité entre le principe mécanique de relativité de Galilée et le principe de l'immobilité absolue de l'éther dans la théorie électromagnétique prérelativiste.

La relativité restreinte s'inscrit dans la géométrie d'un continuum espace-temps plat [11] où le temps ne se conçoit plus comme séparé. En relativité générale, la gravitation courbe ce continuum, et cette déformation de l'espace-temps (qui s'exprime précisément par le tenseur de courbure de Ricci), remplace la notion de force de la dynamique newtonienne, tandis que les trajectoires de cette dynamique sont remplacées par les plus courts chemins dans l'espace-temps courbe.

2 — Temps propre d'objets géométriques

2.1 — La goutte d'huile et le flot de courbure

Faisons tomber une goutte d'huile dans un verre d'eau et observons l'évolution de sa forme : il apparaît que le contour initial, une courbe irrégulière, devient, à l'équilibre, un cercle. La transformation qu'elle subit est telle que la courbe-contour homogénéise progressivement sa courbure : elle s'aplatit là où elle est très courbée et s'arrondit là où elle est plus plate. Ainsi, par exemple, une ellipse s'arrondit jusqu'à se figer en cercle.

C'est un cas particulier d'une dynamique dont le modèle mathématique s'appelle flot de courbure.

En mathématiques, la courbure d'une courbe (en l'un de ses points P) n'est pas seulement une qualité : c'est une quantité définie comme l'inverse du rayon du cercle qui épouse le mieux la courbe en P. Plus précisément, de même qu'on définit la tangente en P comme la droite limite passant par P et un autre point P' infiniment voisin, on définit le cercle osculateur en P comme le cercle limite passant par P et deux autres points P', P'' infiniment voisins, et la courbure $\kappa(P)$ en P est l'inverse du rayon de ce cercle.

Le flot de courbure s'exprime par une équation de la forme

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -\kappa(x),$$

où t est le paramètre temporel. Reformulée en terme de la longueur d'arc, cette équation n'est autre qu'une l'équation de la chaleur déguisée.

Si l'on recalibre de manière à ce que l'aire soit constante, alors partant d'une courbe plane arbitraire (mais sans croisement), ce processus d'arrondissement de la courbure va toujours converger vers un cercle (comme dans le cas de la goutte d'huile). C'est intuitivement clair, mais la démonstration qu'il ne se produit aucun accident de parcours ni d'embrouillamini est difficile [12].

(11) Dont la métrique pseudo-riemannienne est $\mathrm{d}x_1 + \mathrm{d}x_2 + \mathrm{d}x_3 - c^2\,\mathrm{d}t^2$. Elle est invariante par $t \mapsto -t$; il n'y a donc aucune orientation canonique du temps cachée dans ce signe $-$.

(12) Gage, Grayson et Hamilton (1986/89). Le lecteur peut visionner ce phénomène sur le site de vulgarisation « Images des Mathématiques » http://images.math.cnrs.fr/Espaces-courbes.html

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

La leçon est que toute telle *courbe a une évolution canonique, un devenir intrinsèque qui s'éteint lorsqu'elle devient parfaitement symétrique*. Cela se produit d'ailleurs en temps fini.

Signalons d'ailleurs que ces idées (variantes discrètes de flot de courbure) ont des applications concrètes en traitement d'image et en robotique. En traitement d'image, elles permettent d'adoucir le sourire d'une image de la Joconde mieux que ne le font les méthodes standard de filtrage [13]. En robotique, elles permettent de traiter l'épineux problème des rendez-vous de robots non synchronisés.

2.2 — Courbure en dimension supérieure

La théorie des espaces courbes commence avec l'ouvrage fondateur de Gauss sur les surfaces [14], basé sur des idées qu'il avait développées lors de sa mission de topographie du royaume de Hanovre — un retour au sens propre de la géo-métrie.

Gauss dégage une notion remarquable de courbure (le produit des courbures minimale et maximale de courbes passant par un point de la surface). Ce qu'il appelle son theorema egregium, c'est que cette courbure est *intrinsèque*, c'est-à-dire ne dépend que de la manière dont on mesure les distances sur la surface, et non pas de la manière dont la surface est plongée dans l'espace tridimensionel. Ainsi deux surfaces repliables l'une sur l'autre ont même courbure de Gauss ; a contrario, la sphère, qui est de courbure constante positive, ne peut se déplier/dérouler localement en un plan, qui est de courbure nulle.

Ceci est en contraste avec le cas des courbes, dont la courbure dépendait, elle, du plongement de la courbe dans le plan : on peut bel et bien dérouler un cercle sur une droite.

Le fondateur de la théorie des espaces courbes *en toute dimension* est Riemann, disciple de Gauss, mais c'est son continuateur italien, Ricci-Curbastro, qui a réussi à introduire la meilleure généralisation de la courbure intrinsèque de Gauss. Cette courbure de Ricci est, au signe près, un avatar non-linéaire du laplacien Δ — plus correctement, de l'opérateur de Laplace-Beltrami — pour les espaces courbes de dimension quelconque.

La courbure de Ricci a eu une fortune considérable, depuis qu'Einstein s'en est emparé pour les fondements géométriques de la relativité générale : c'est en effet la courbure de Ricci [15] qui représente le terme géométrique de l'équation d'Einstein en relativité générale.

Les espaces-temps possibles de la cosmologie relativiste (dans le vide) sont ceux dont la courbure de Ricci est proportionnelle à la métrique (variétés d'Einstein). Outre l'espace-temps plat de la relativité restreinte, il y en a bien d'autres, ayant éventuellement des singularités (trous noirs).

(13) Travaux de l'école de Cachan.
(14) *Cf.* http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62415t
(15) Plus exactement son avatar « sans trace » dans le contexte un peu plus général d'espaces courbes à métrique pseudo-riemannienne de signature $+,+,+,-$.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2.3 — Flot de Ricci et temporalité d'objets géométriques

On peut mettre à profit la structure fibreuse de l'espace-temps, comme disait De Broglie, pour interpréter l'équation d'Einstein dans le vide comme équation gouvernant l'évolution d'une tranche spatiale M (de dimension 3) vue comme donnée initiale. C'est essentiellement l'approche évolutive (ou plutôt hamiltonienne) de la relativité générale, dite approche ADM [16]. Cette évolution est, après simplification, le *flot de Ricci* de M, qui s'exprime par une équation de la forme

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -2R(x)$$

où x désigne maintenant la métrique, $R(x)$ la courbure de Ricci. C'est un avatar de l'équation de la chaleur *en dimension infinie*, la variable parcourant non plus l'espace M (de dimension 3) mais l'espace des métriques sur M (de dimension infinie). Le passage à la dimension infinie est responsable des énormes difficultés techniques d'analyse de l'équation.

À ce point, on peut oublier la relativité générale et revenir à la pure géométrie riemannienne, à l'étude des espaces courbes pour eux-mêmes. Le flot de Ricci garde un sens pour tout objet de la géométrie riemannienne, *i.e.* toute « variété » M munie d'une métrique (une manière de mesurer les distances sur M) initiale quelconque. Soumettre cette métrique au flot de Ricci est un peu comme la « chauffer » ; cela arrondit la variété et à l'équilibre, on peut espérer trouver une métrique parfaitement symétrique.

Cette idée, et cet espoir, sont dus à R. Hamilton [17], qui les a beaucoup popularisés et développés. Par le flot de Ricci, *les objets géométriques se voient dotés d'une temporalité propre, d'une évolution intrinsèque avec perte de mémoire des conditions initiales*.

Mais vers quelle fin tend-elle ?

2.4 — « Télicité » et uniformisation d'objets géométriques

Revenons au cas des surfaces, disons « compactes » (*i.e.* fermées sur elles-mêmes, sans fuite à l'infini), et « orientées » (on ne se laisse pas désorienter par Möbius).

Quelles sont celles qui admettent une métrique parfaitement symétrique ? Eh bien, toutes, comme l'ont démontré Poincaré et Koebe. Il y a trois géométries homogènes en dimension 2, celle de la sphère, celle du plan et celle du disque (avec leur métrique canonique), et toute surface est quotient de l'un de ces trois modèles par des groupes de symétries [18].

Voici comment, un siècle après Poincaré, on peut comprendre ce théorème d'uniformisation : partons d'une surface de Riemann (c'est-à-dire d'une surface munie d'une métrique) compacte quelconque, et laissons-là évoluer canoniquement selon le flot de Ricci ; alors à l'équilibre, on obtiendra (après

(16) Arnowitt, Deser, Misner, 1959.

(17) Vers 1982. À ne pas confondre avec l'inventeur de la mécanique hamiltonienne et des quaternions, qu'évoque l'adjectif « hamiltonienne » quelques lignes plus haut.

(18) Par exemple la surface d'une bouée (standard à un trou) est quotient du plan par les translations entières dans deux directions indépendantes. Une bouée à plus d'un trou est uniformisée par le disque.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

recalibrage éventuel) la métrique parfaitement symétrique de l'un des trois modèles [19]. En outre, dans le cas où le modèle est la sphère, l'équilibre — la mort homogène — est atteint en temps fini. Ainsi, par exemple, un ellipsoïde soumis au flot de Ricci normalisé s'arrondit et se fige en sphère parfaite au bout d'un temps fini.

Du point de vue du géomètre, *fin et finalité se confondent dans la révélation de la structure profonde de l'objet géométrique* [20].

L'une des motivations majeures de Hamilton était d'appliquer ce programme en dimension 3 plutôt que 2. L'étude des variétés de dimension 3, initiée par Poincaré, est d'une tout autre difficulté que celle des surfaces — tant du fait du débordement de l'intuition géométrique que pour des raisons techniques (par exemple, ce ne sont plus trois géométries homogènes, mais huit qui apparaissent — cette classification de Thurston est essentiellement superposable à celle bien plus ancienne de Bianchi qui avait joué un grand rôle dans les débuts de la cosmologie relativiste ; en fait, il s'agit essentiellement dans les deux cas de classification d'espaces homogènes de dimension 3). Pourtant, dans les années 70, Thurston a audacieusement conjecturé un analogue du théorème d'uniformisation des surfaces : après chirurgie (découpage canonique en plusieurs morceaux), toute variété (compacte orientable) de dimension 3 serait quotient de l'un des huit modèles par des groupes de symétries [21].

La fameuse conjecture de Poincaré (1904) en est un cas particulier : la seule telle variété sur laquelle tout lacet peut être contracté en un point est la sphère de dimension 3.

L'idée que l'uniformisation prédite par Thurston pourrait s'obtenir à l'équilibre du flot de Ricci, partant d'une condition initiale (métrique) arbitraire, est due à Hamilton. Mais c'est à Perelman qu'il revint de réaliser complètement ce programme, et de résoudre ainsi, un siècle après, le problème de Poincaré [22]. Dans ce cas où le modèle est la sphère de dimension 3, la mort homogène est atteinte en temps fini.

2.5 — Entropie, catastrophes, finitude

Le processus est toutefois beaucoup plus subtil qu'en dimension 2. Au reste, la conjecture de Thurston ne prédit l'uniformisation qu'après chirurgie. Des catastrophes se produisent effectivement : le flot de Ricci peut faire imploser l'objet géométrique en temps fini. Toutefois Perelman montre comment faire redémarrer ce flot après chirurgie ; en outre, il ne se produit qu'un nombre fini de telles catastrophes. La démonstration de Perelman repose sur une notion d'entropie pour le flot de Ricci, qui vérifie l'analogue d'un « second principe de la thermodynamique ».

(19) Hamilton, Chow (1988/91).

(20) Comme me l'ont fait observer Z. Djadli et J.-P. Bourguignon, la temporalité ainsi dévoilée des objets géométriques ne se réduit pas à un devenir — il y a sens à considérer leur passé (limité), en dépit du caractère irréversible du processus, et ce passé éclaire le devenir. Leur temporalité intrinsèque n'en est que plus riche.

(21) Pour plus de détails, dans un style informel et très accessible, on peut consulter le texte de la conférence de S. Lang : « Faire des maths : grands problèmes de géométrie et de l'espace », *revue du Palais de la Découverte,* vol. 12, nº 114 (1984).

(22) Voir par exemple G. Szpiro, *La conjecture de Poincaré : Comment Grigori Perelman a résolu l'une des plus grandes énigmes mathématiques*, Lattès.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2.6 — Conclusion

L'idéal galiléen de géométrisation du temps et du mouvement est complètement réalisé dans la relativité générale, géométrie dynamique de l'interaction temps-espace-matière où aucun des trois termes n'a d'existence séparée. Ce sont les plus courts chemins de cette géométrie courbe qui décrivent la dynamique, remplaçant les équations d'évolution de la mécanique classique. Première fortune du concept de courbure de Ricci !

Pour autant, l'étude des modèles de ce continuum courbe en cosmologie relativiste met en jeu des équations d'évolution, liées au flot de Ricci introduit (ultérieurement) en géométrie.

Ce flot *produit un temps*, le temps des objets géométriques, et dote ceux-ci d'une dynamique intrinsèque. Le devenir de ces objets peut être accidenté mais (au moins jusqu'en dimension 3) après quelques opérations chirurgicales canoniques, l'objet finit par atteindre un état d'équilibre, parfois en temps fini. Il est alors parfaitement symétrique, et n'a rien conservé de sa forme précise initiale, si ce n'est sa topologie. C'est cette idée de « devenir » des formes qui a permis de résoudre l'un des grands mystères des mathématiques. Seconde fortune du concept de courbure de Ricci !

Juste retour, ces idées commencent d'ailleurs (23) à avoir des retombées en cosmologie : des recherches toutes récentes relient le flot de Ricci et les idées d'entropie de Perelman aux idées thermodynamico-relativistes de Hawkins et Penrose sur les trous noirs. Vers une troisième fortune du concept de courbure de Ricci ?

Il sera intéressant alors de réévaluer le lien entre temporalité des tranches spatiales d'espace-temps et dynamique des modèles cosmologiques relativistes, dans l'esprit des dernières méditations de Lautmann sur le « temps géométrique ».

(23) Travaux d'Anderson et al.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

© Spartacus-Idh 2021

Chapitre V

Symétries I. Idées galoisiennes

« Il existe pour ces sortes d'équations
un certain ordre de considérations métaphysiques
qui planent sur les calculs
et qui souvent les rendent inutiles. »

É. Galois.

« Sans un petit grain de métaphysique,
il n'est pas possible, à mon avis,
de fonder une science exacte. »

G. Cantor.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Évariste Galois : révolutionnaire — en politique et en mathématique —, mort en 1832 dans sa vingtième année.

Éduqué par sa mère à Bourg-la-Reine, dont son père est maire, il se passionne pour les Mathématiques suite à la lecture, à quinze ans, des Éléments de Géométrie de Legendre. Il obtient le premier prix du concours général dans cette discipline mais échoue au concours d'entrée à l'École Polytechnique, quelques jours après le suicide de son père suite à une cabale du curé du village. Au lycée, Galois commence à lire les mémoires des grands mathématiciens de l'époque (Lagrange, Gauss, Jacobi). Il obtient, dès ses dix-huit ans, des résultats mathématiques d'une portée incomparable (« théorie de l'ambiguïté », théorie des intégrales abéliennes) qu'on a pu qualifier d'acte de naissance des mathématiques « modernes ».

Pendant la révolution de juillet 1830, Galois est élève à l'École Normale Supérieure [1] et consigné comme ses condisciples. Suite à la publication de deux lettres de lui brocardant le directeur et la misère de l'enseignement scientifique, il est renvoyé, et, sans ressource, il ouvre un cours privé d'Algèbre supérieure chez un libraire du quartier latin. Il s'engage alors très activement dans la lutte politique, au sein de la Société des Amis du Peuple présidée par Raspail. Toast régicide puis manifestation en tenue illégale de garde républicain lui valent de passer l'essentiel de la dernière année de sa vie en prison. C'est en partie là qu'il rédige ses mémoires les plus importants, dont la plupart ont été perdus (par Cauchy et Fourier) ou rejetés (par Poisson et Lacroix). La nuit précédant le duel fatal, il écrit une splendide lettre-testament (qui sera évoquée ci-dessous).

(1) Transitoirement rebaptisée École Préparatoire, après avoir été supprimée quelque temps. C'est, rappelons-le, le temps des *Misérables* de V. Hugo.

Épilogue : en 1843, Liouville exhume un mémoire de Galois et expose la « théorie de l'ambiguïté » à l'Académie des Sciences. Depuis, l'influence de ces idées n'a cessé de croître. Que cette influence se soit accompagnée d'un phénomène de fabrication d'icône (mis en évidence et analysé par plusieurs historiens contemporains), que ces idées aient surgi (bien évidemment) au sein d'une certaine tradition qui en a fourni le terreau, cela n'ôte rien au caractère fondamentalement novateur des idées de Galois en mathématiques.

En suivre certaines lignes de force jusque dans les Mathématiques les plus contemporaines, tel est l'objet de ce chapitre dont le thème central est celui de *groupe de symétries* et d'*invariant* [2].

1 — Théorie de Galois des équations algébriques

1.1 — Résolubilité par radicaux

Ainsi débute la lettre-testament de Galois :

> Mon cher Ami, j'ai fait en Analyse plusieurs choses nouvelles. Les unes concernent la théorie des équations, les autres les fonctions intégrales. Dans la théorie des équations, j'ai recherché lesquelles étaient résolubles par radicaux...

Une équation *algébrique* (ou *polynomiale*) de degré n est une équation de la forme

$$(*) \quad x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

où les coefficients a_i sont des constantes (par exemple des nombres rationnels), et x est l'inconnue (appelée racine de l'équation).

La recherche de « formules » pour les racines x d'une telle équation est un problème très ancien, qui, au XVI^{e} siècle avait été résolu jusqu'au degré $n = 4$ au moyen de techniques de changement de variables et substitutions [3]. Ces formules se présentent sous la forme d'expressions faisant intervenir des radicaux $\sqrt[m]{\ }$, pour $m \leqslant n$. Par exemple, la formule donnant une solution de l'équation du troisième degré

$$x^3 + a_1 x + a_0 = 0$$

est

$$x = \sqrt[3]{-\frac{a_0}{2} + \sqrt{\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \left(\frac{a_1}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{a_0}{2} - \sqrt{\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \left(\frac{a_1}{3}\right)^3}}.$$

On notera toutefois que de telles formules présentent des ambiguïtés techniques (dans la prise des radicaux), liées à une ambiguïté de fond : comment briser l'indiscernabilité *a priori* des racines de l'équation ? Autre souci : ces formules peuvent faire intervenir des racines carrées de nombres négatifs (exclus jusqu'au XVI^{e} siècle), même lorsque la solution x est rationnelle : par exemple

(2) Leçon MaMuX du 12 mai 2007.
(3) Del Ferro, Tartaglia, Cardano (*Ars Magna*, 1545), Ferrari.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

la formule précédente exprime la racine $x = 4$ de l'équation $x^3 - 15x - 4 = 0$ sous la forme alambiquée [4]

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}.$$

À la fin du XVI^e, Viète systématisa l'usage des lettres pour noter coefficients et inconnues, et découvrit la relation entre coefficients de $(*)$ et fonctions symétriques des racines. Malgré tout l'intérêt du bouleversement conceptuel qui accompagna l'assimilation progressive des racines imaginaires et la clarification de la notion même de racine [5], nous n'en dirons pas plus, considérant que cela appartient à la préhistoire de notre sujet.

Il fallut plus de deux siècles avant de pouvoir aller au-delà du degré $n = 4$ dans la question de la résolution par radicaux des équations algébriques. Les travaux de Lagrange sur la technique des résolvantes à la fin du XVIII^e siècle mirent en lumière le rôle crucial joué par les permutations des racines, sans toutefois résoudre le problème.

Mais c'est N. Abel, précurseur de Galois mort à 26 ans en 1829, qui le premier démontra rigoureusement l'impossibilité de résoudre l'équation générale du 5^e degré par radicaux [6]. Peu après, Galois s'empara du problème de la résolubilité par radicaux et le résolut complètement en donnant une condition nécessaire et suffisante portant sur un certain groupe de symétries des racines de l'équation.

1.2 — Le groupe de Galois

Voici comment Galois l'introduit lui-même [7], sous forme d'un

> *Théorème*. Soit une équation donnée, dont $a, b, c, \ldots$ sont les racines. Il y aura toujours un groupe de permutations des lettres $a, b, c, \ldots$ qui jouira de la propriété suivante :
>
> **1.** que toute fonction des racines, invariable par les substitutions de ce groupe, soit rationnellement connue, [8]
>
> **2.** réciproquement, que toute fonction des racines, déterminable rationnellement, soit invariable par ces substitutions.

C'est sans doute là l'une des toutes premières apparitions de la notion mathématique de groupe. En fait, Galois ne considère pas de « groupes abstraits », mais seulement des groupes de substitutions, c'est-à-dire des ensembles de permutations de $a, b, c, \ldots$ qui sont stables par composition et par passage à l'inverse. Mais, comme on va voir, c'est bien la structure de ces

(4) Comme le remarque Bombelli vers 1550, la clé de l'énigme, qui passe par le calcul des imaginaires, est que $2 + \sqrt{-121}$ est le cube de $2 + \sqrt{-1}$.

(5) Dans le cas des équations dont les coefficients sont des nombres, on peut considérer que la question a été complètement élucidée par le classique « théorème fondamental de l'Algèbre » (énoncé par Girard, « justifié » par D'Alembert, mieux par Lagrange, enfin démontré rigoureusement par Gauss) : toute équation $(*)$ de degré non nul, dont les coefficients a_i sont des nombres complexes, admet au moins une racine parmi les nombres complexes.

(6) N. Abel, Sur la résolution algébrique des équations, *Œuvres* t. II.

(7) *Œuvres mathématiques*, suivies d'une notice de G. Verriest, Gauthiers-Villars, 1951.

(8) Ce qui signifie : exprimable à partir des coefficients de l'équation *rationnellement*, c'est-à-dire en ne faisant intervenir que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

groupes qui l'intéresse, et non le calcul des permutations des $a, b, c, \ldots$ elles-mêmes (comme chez Lagrange). C'est semble-t-il Cayley qui donna en 1854 une première définition générale de groupe abstrait, en indiquant d'ailleurs que tout groupe abstrait peut être vu comme groupe de permutations de ses éléments, de sorte que la considération des seuls groupes de substitutions n'est pas limitative ; mais la condition d'associativité n'est clairement mise en avant que plus tard (Huntington, Moore, 1902).

Un groupe G est dit *commutatif* ou *abélien* si on a toujours $x \cdot y = y \cdot x$. Exemples : l'addition des vecteurs dans un espace vectoriel, le groupe des transpositions d'un mode musical.

Notre but n'étant pas de nature historique, ce n'est pas avec les mots mêmes de Galois, mais sous la forme moderne et compacte qu'elle a prise au tournant du XX^{e} siècle [(9)] que nous allons exposer, brièvement, les notions et résultats de base de la théorie [(10)].

On part d'un corps de base k qui contient les coefficients a_i de l'équation (par exemple le corps $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels [(11)]. Sans perte de généralité, on peut supposer, et nous supposerons toujours, que l'équation $(*)$ est *irréductible* sur k, c'est-à-dire que le polynôme $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ n'est pas produit de polynômes à coefficients dans k de degrés moindres.

Alors l'équation algébrique $(*)$ (que Galois appelait joliment « la proposée ») a exactement n racines complexes. On aimerait bien les appeler $x_1, \ldots, x_n$, mais comment les distinguer *a priori* les unes des autres de façon à les numéroter ?

C'est précisément sur cette ambiguïté, sur les substitutions indétectables de racines, que va jouer Galois pour fonder sa théorie, qu'il baptise « théorie de l'ambiguïté » (et que l'on a appelée après lui, après un long processus de maturation et de réélaborations, la « théorie de Galois »).

Notons K le corps engendré sur k par ces racines, c'est-à-dire le corps qu'on obtient en formant toutes les expressions bâties à partir des éléments de k et des racines par addition, soustraction, multiplication, division. Une extension ($=$ sur-corps) du type K/k est dite *normale*.

Le *groupe de Galois* de l'équation algébrique $(*)$ est défini comme le groupe des automorphismes du corps K qui fixent k : c'est le groupe des « symétries » de l'extension K/k (dans le langage du chapitre précédent, ce sont exactement les opérateurs du k-espace vectoriel K qui respectent la multiplication).

Il est noté $Gal(K/k)$ en l'honneur de son inventeur. Il vérifie les deux propriétés énoncées par Galois :

1. toute expression rationnelle en les racines (c'est-à-dire tout élément de K) qui est invariant par $Gal(K/k)$ est en fait dans k,

2. réciproquement, tout élément de k est invariant par $Gal(K/k)$.

(9) Grâce notamment à Kronecker, Weber, et Artin. La thèse de C. Ehrhardt (*Évariste Galois et la théorie des groupes. Fortune et réélaborations* (*1811–1910*), Paris) contient un exposé critique de la construction progressive du canon de cette théorie, de Galois à Artin.

(10) Pour les détails, voir par exemple I. Stewart, *Galois theory*, Chapman and Hall, 2. ed., 1989, et R. et A. Douady, *Algèbre et théories galoisiennes* II, Cedic, 1979.

(11) De manière informelle, un corps est un ensemble dans lequel il est possible d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (sauf par 0).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Les éléments de $Gal(K/k)$ sont entièrement déterminés par les valeurs qu'ils prennent sur les racines de $(*)$, valeurs qui sont encore des racines de $(*)$. Ainsi $Gal(K/k)$ s'identifie à un sous-groupe du groupe $\mathfrak{S}_n$ des permutations des n racines. C'est un groupe d'ordre égal à la dimension du k-espace vectoriel K.

1.3 — La correspondance de Galois

Le cœur de la Théorie de Galois est une correspondance bijective entre extensions ℓ de k contenues dans l'extension normale K, et sous-groupes H du groupe de Galois $Gal(K/k)$. Elle est définie ainsi :

1. à l'extension ℓ, on associe le sous-groupe H formé des éléments qui fixent ℓ (autrement dit, le groupe de symétries de l'extension K/ℓ),

2. réciproquement, au sous-groupe H, on associe l'extension ℓ formés des éléments de K invariants par H.

Cette *correspondance entre extensions* (*de corps*) *et groupes* (*de symétries*) renverse le sens des inclusions.

Par ailleurs, Galois dégage la notion de sous-groupe *normal* H d'un groupe G. C'est un sous-groupe tel que pour tout $g \in G$, la conjugaison par g :

$$h \mapsto g \cdot h \cdot g^{-1}$$

envoie H dans lui-même ; on peut alors former le groupe quotient G/H. Dans la correspondance de Galois, les sous-groupe normaux de $Gal(K/k)$ correspondent aux extensions normales ℓ/k.

Galois introduit aussi la notion de groupe *résoluble*. C'est un groupe qui se « dévisse en groupes abéliens ». Plus précisément, un groupe G est dit résoluble s'il existe une chaîne finie de sous-groupes inclus les uns dans les autres, commençant à $\{1\}$ et finissant à G, chacun étant normal dans le suivant avec un quotient abélien. Galois démontre que l'équation $(*)$ est résoluble si et seulement si son groupe de Galois est résoluble. Il démontre en outre que le groupe $\mathfrak{S}_n$ n'est pas résoluble dès que $n \geqslant 5$, et en déduit qu'il y a des équations de tout degré $n \geqslant 5$ qui ne sont pas résolubles par radicaux.

Il a par ailleurs introduit les corps finis [12] et utilisé sa correspondance pour les classifier.

2 — Portée et enjeux de la « théorie de l'ambiguïté »

Galois était conscient du caractère révolutionnaire, à divers titres, de ses conceptions, et du fait qu'elles dépassaient largement le cadre spécifique des équations algébriques.

(12) On ne connaissait guère avant lui que l'exemple des corps finis obtenus par réduction des entiers modulo un nombre premier p.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2.1 — Émergence d'un corps de concepts d'un type nouveau

L'usage d'une structure algébrique — celle de groupe en l'occurrence, suivie par celle d'extension de corps que la théorie « appelle » — comme outil fondamental, et de notions abstraites comme celles de sous-groupes normaux, de groupes résolubles, a modifié l'idée qu'on se faisait de la nature des objets mathématiques.

En mettant l'accent sur les concepts d'opération (« abstraite de son résultat ») et d'invariant, la démarche galoisienne ouvre un champ conceptuel nouveau aux Mathématiques qui marque la naissance de l'Algèbre moderne [13].

2.2 — Fécondité du principe de correspondance galoisienne

Pour S. Lie, premier grand continuateur avec F. Klein de l'œuvre de Galois,

> la grande portée de l'œuvre de Galois tient au fait que sa théorie originale des équations algébriques est une application systématique des deux notions fondamentales de *groupe* et d'*invariant*, notions qui tendent à dominer la science mathématique.

L'idée galoisienne de correspondance entre symétries d'une structure mathématique et treillis de ses sous-structures a essaimé dans d'autres domaines des Mathématiques. L'un des premiers et plus célèbres avatars est le « programme d'Erlangen » de Klein, qui jette un pont entre Géométrie et Théorie des groupes : il s'agit de classifier les géométries de l'espace à n dimensions où le « mouvement d'une figure invariable est possible » — et, en toile de fond, de comprendre de manière unifiée les géométries classiques de l'époque (géométries euclidienne, affine, projective, sphérique, elliptique, hyperbolique, conforme). Klein montre qu'elles correspondent à certains groupes G de « déplacements » : la géométrie correspondant à G est définie par les propriétés des figures (parties de l'espace) telles que G soit exactement le groupe de déplacements qui conservent ces propriétés, ou par les classes invariantes par G de figures (on peut alors chercher à classifier ces figures pour l'action de G, c'est-à-dire déterminer les orbites). Par exemple, pour le groupe affine G, les coniques forment une classe invariante, et se répartissent en trois orbites : ellipses, paraboles, hyperboles.

Comme l'écrit G. Bachelard dans sa polémique contre E. Meyerson sur le principe d'identité [14],

> des êtres géométriques qui sont *invariants* dans les opérations d'un sous-groupe G' du groupe général G de la géométrie euclidienne peuvent cesser d'être invariants pour des opérations qui, comprises dans G, ne figurent pas dans G'. Leur « identité » est donc simplement relative au groupe qui définit le système rationnel qui sert de base à l'examen de leurs propriétés. [...] Qu'une sphère et un ellipsoïde soient des surfaces identiques du point de vue de l'Analysis Situs, voilà un fait qui nous libère d'une *identité en soi*. [...]

(13) Voir J. Vuillemin, *Philosophie de l'algèbre*.
(14) *Le rationalisme appliqué*, P. U. F. 1949, p. 83.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

> Dès qu'on aborde les géométries très spécialisées, le principe d'identité pose un discernement très travaillé. [...] Les géométries ont besoin chacune d'un protocole d'identification. [...] Si l'on suivait en détail ces *applications* de la pensée algébrique à la géométrie, on s'apercevrait que fonctionne toujours — plus ou moins tacitement — une fonction d'adverbe à côté de l'adjectif *identique*. [...] On devrait donc, si l'on veut se cantonner dans la géométrie usuelle, parler de figures *euclidiennement* identiques.

Le point de vue que promeut Klein est que c'est le groupe sous-jacent qui fonde une géométrie, car c'est lui qui permet la définition même de l'identité des figures. Qu'il apparaisse encore, en second lieu, comme groupe de symétries des figures est le reflet du principe de correspondance galoisienne.

Nous verrons d'autres avatars plus récents de correspondances galoisiennes dans la suite.

2.3 — Thématisation des obstructions

Avec Galois, la notion vague, à connotation esthétique, de symétrie devient un concept mathématique précis et opératoire.

Les ambiguïtés constituent-elles une « nuisance » ?
— Non, répond Galois en substance, elles constituent un *groupe* !

Loin d'être une simple figure de rhétorique, c'est un geste de pensée étonnant : geste inaugural de la Théorie de l'obstruction (évoquée au chapitre II.3.3), dont l'objet est de réaliser les obstructions à effectuer telle ou telle opération mathématique comme éléments d'un nouvel objet mathématique, souvent un groupe ; l'étude de ce nouvel objet *per se* livre la clé du problème.

Sur un plan philosophique beaucoup plus général, ce geste inaugure un

2.4 — Changement de paradigme dans la conception des problèmes mathématiques

Ce point a été bien cerné par G. Deleuze [15] :

> Au lieu de chercher comme au hasard si une équation est résoluble en général, il faut déterminer des conditions de problèmes qui spécifient progressivement des champs de résolubilité, de telle manière que « l'énoncé contienne le germe de la solution ». Il y a là un renversement radical dans le rapport solution-problème [...]
> Le même jugement se confirme, appliqué aux travaux de Galois : à partir d'un « corps » de base, les adjonctions successives à ce corps permettent une distinction de plus en plus précise des racines d'une équation, par limitation progressive des substitutions possibles. Il y a donc une cascade de « résolvantes partielles » ou un emboîtement de « groupes », qui font découler la solution des conditions mêmes du problème : qu'une équation ne soit pas résoluble algébriquement, par exemple, cela n'est plus découvert à l'issue d'une recherche empirique ou d'un tâtonnement, mais d'après les caractères des groupes et des résolvantes qui constituent la synthèse du problème et de ses conditions. [...]

(15) *La différence et la répétition*, p. 233.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Le groupe de l'équation caractérise à un moment, non pas ce que nous savons des racines, mais l'objectivité de ce que nous n'en savons pas. Inversement, ce non-savoir n'est plus un négatif, une insuffisance, mais une règle, un *apprendre* auquel correspond une dimension fondamentale de l'objet.

3 — Revêtements, groupes fondamentaux, dessins d'enfants

3.1 — La « montée vers l'absolu ». Le groupe $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$

La correspondance galoisienne concerne les extensions intermédiaires $k \subset \ell \subset K$, l'extension normale K/k étant fixée. On peut aussi ne fixer que le corps de base k, disons $k = \mathbb{Q}$, et faire varier l'extension normale $K/\mathbb{Q}$: lorsque K grossit (c'est-à-dire lorsqu'on adjoint de plus en plus de nombres algébriques), on obtient ainsi un système « projectif » de groupes finis s'envoyant les uns sur les autres :

$$\cdots \to Gal(K/\mathbb{Q}) \to \cdots \to Gal(\mathbb{Q}/\mathbb{Q}) = \{1\}.$$

La limite $\varprojlim_K Gal(K/\mathbb{Q})$ de ce système est le groupe infini [16] $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ des automorphismes du corps $\bar{\mathbb{Q}}$ des nombres algébriques [17].

C'est cette démarche qu'A. Lautman appelle la « montée vers l'absolu » [18] : un seul objet mathématique, le groupe de Galois absolu, code les propriétés de toutes les équations algébriques à coefficients rationnels à la fois.

Ce *groupe de Galois absolu* $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, objet central de la Théorie des nombres, reste largement un mystère après un siècle et demi d'efforts intenses pour en comprendre la structure. Au demeurant, cette idée de « montée vers l'absolu » se manifeste dans bien d'autres contextes mathématiques, où telle ou telle régularité ("pattern"), invisible ou indéchiffrable à distance finie, apparaît seulement à l'horizon.

3.2 — Théorie de Galois des revêtements

Il s'agit d'une « jumelle » géométrique de la Théorie de Galois des nombres algébriques. En voici un aperçu dans le cadre des revêtements de surfaces de Riemann évoqués au premier chapitre.

L'histoire commence en 1877 lorsque Klein remarque que le groupe des isométries laissant invariant l'icosaèdre est isomorphe au groupe de Galois d'une équation quintique à coefficients dans le corps de fonctions rationnelles d'une variable auxiliaire. On a maintenant deux variables, et les solutions complexes de l'équation quintique forment une surface de Riemann, qui est un revêtement du plan complexe.

(16) Il est naturellement muni d'une structure de groupe topologique compact. On renvoie au chapitre II.5.3 pour la notion catégorique de limite projective $\varprojlim$.
(17) Nombres vérifiant une équation algébrique à coefficients rationnels.
(18) *Essai sur les notions de structure et d'existence en mathématiques*. Réédition Vrin, 2006.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Plus généralement, on a la notion de revêtement [19] fini normal $Y \to X$ de surfaces de Riemann. C'est l'avatar géométrique d'une équation $(*)$: ce qui joue le rôle de racines de l'équation est l'ensemble $\{y_1, \ldots, y_n\}$ des points de Y qui s'envoient sur un point x arbitraire fixé de X. Le groupe de Galois $Gal(Y/X)$ est un sous-groupe du groupe $\mathfrak{S}_n$ des permutations de $\{y_1, \ldots, y_n\}$ [20]. Il peut se calculer comme suit : traçons sur X un lacet γ pointé en x, et choisissons un point y_i de Y au-dessus de x. Un tel γ se « relève » alors en un chemin sur Y partant de y_i, qui en général aboutira à un autre point y_j, d'où une permutation $y_i \mapsto y_j$ de l'ensemble des points au-dessus de x, qui ne dépend en fait du lacet γ qu'à homotopie (= déformation) près. C'est ainsi que s'obtiennent les éléments de $Gal(Y/X)$.

Dans ce contexte, on peut encore effectuer une « montée vers l'absolu ». Ce qui correspond au corps $\bar{\mathbb{Q}}$ est maintenant le *revêtement universel* de X, et son groupe d'automorphismes n'est autre que le *groupe fondamental* de Poincaré $\pi_1(X)$: c'est le groupe des lacets tracés sur X à homotopie près, partant et aboutissant à un point x fixé.

On peut algébriser la construction en remplaçant $\pi_1(X)$ par la limite projective $\hat{\pi}_1(X)$ des groupes $Gal(Y/X)$, lorsque le revêtement fini normal Y/X grossit (voir aussi chap. I, 3.2). D'après Grothendieck, $\hat{\pi}_1(X)$ s'interprète comme le groupe des automorphismes du foncteur « fibre au-dessus de x »

$$Y \mapsto Y_x = \{y_1, \ldots, y_n\}$$

sur la catégorie des revêtements finis de (X, x) (à valeurs dans la catégorie des ensembles), ce qui permet d'unifier les Théories de Galois arithmétique et géométrique dans un même moule.

3.3 — Une vision géométrique, voire graphique, de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$

Une approche indirecte fascinante de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ consiste à le relier à la géométrie des surfaces de Riemann.

Pour fixer les idées, prenons pour X le plan complexe privé des points 0 et 1. Son groupe fondamental $\pi_1(X)$ est le groupe libre à deux générateurs, les lacets γ_0 et γ_1 autour de 0 et de 1 (qu'on ne peut « défaire » par déformation).

Suivant Grothendieck et Belyi, le groupe de Galois absolu $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ opère sur les revêtements finis de X, donc sur $\hat{\pi}_1(X)$, et cette opération est *fidèle : le groupe de Galois absolu arithmétique $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ se plonge dans le groupe des automorphismes du groupe de Galois absolu géométrique $\hat{\pi}_1(X)$*.

De là, Grothendieck a alors proposé de décrire $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ au moyen de notions graphiques « si simples qu'un enfant peut les connaître en jouant ». Considérons un revêtement $Y \to X$, en supposant pour simplifier que Y est le plan complexe privé de quelques points. L'image inverse dans Y du segment $]0, 1[$ de X est un objet combinatoire très simple que Grothendieck appelle « dessin d'enfant ». Le défi est de comprendre en termes combinatoires l'opération fidèle de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur ces dessins.

(19) Qu'on suppose non ramifié pour simplifier.
(20) Dans le cas de la quintique de Klein, le groupe de Galois est le groupe de l'icosaèdre, auquel Klein a consacré un ouvrage classique.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Pour ce faire, il faut disposer au préalable d'un codage combinatoire des éléments de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ lui-même. C'est ce qui a été obtenu par Drinfeld autour de 1990 (en découvrant un lien insoupçonné entre $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ et groupes quantiques) : il plonge $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ dans un groupe de nature combinatoire (le groupe de (Galois-)Grothendieck-Teichmüller, défini par générateurs et trois relations très simples), qui s'avère agir fidèlement sur les dessins d'enfants. On ignore à l'heure actuelle si GT est réellement « plus gros » que $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

4 — Ambiguïtés galoisiennes en Analyse

Voici la fin de la lettre-testament de Galois :

> Tu sais, mon cher Auguste, que ces sujets ne sont pas les seuls que j'ai explorés. Mes principales méditations depuis quelque temps étaient dirigées sur l'application à l'Analyse transcendante de la théorie de l'ambiguïté. Il s'agissait de voir *a priori* dans une relation entre quantités ou fonctions transcendantes quels échanges on pouvait faire, quelles quantités on pouvait substituer aux quantités données sans que la relation pût cesser d'avoir lieu. Cela fait reconnaître tout de suite l'impossibilité de beaucoup d'expressions que l'on pouvait chercher. Mais je n'ai pas le temps et mes idées ne sont pas encore bien développées sur ce terrain qui est immense...

Liouville est le premier à avoir poursuivi dans cette direction, dans le contexte des équations différentielles. Une équation différentielle relie une fonction y d'une variable x à sa *dérivée* $\frac{dy}{dx}$ et aux dérivées supérieures $\frac{d^i y}{dx^i}$. Ces équations sont apparues au XVII^e dans le contexte de la cinématique, où typiquement x figure la variable temporelle, y la fonction de position, $\frac{dy}{dx}$ la vitesse, $\frac{d^2y}{dx^2}$ l'accélération, etc. (rappelons que la dérivée de y en x est la pente de la tangente du graphe de la fonction y au point x).

Au lieu de se demander quand une équation algébrique est résoluble par radicaux, Liouville se demande quand une équation différentielle [21] linéaire

$$p_n(x)\,\frac{d^n y}{dx^n} + \cdots + p_1(x)\frac{dy}{dx} + p_0(x) = 0,$$

(les coefficients $p_i(x)$ étant typiquement des polynômes) est résoluble à l'aide de fonctions élémentaires (des radicaux, des logarithmes, des exponentielles), et obtient un critère galoisien. À la fin du XIX^e siècle, on a introduit [22] dans ce contexte le *groupe de Galois différentiel* : c'est le groupe formé des automorphismes de l'extension du corps des fonctions de base, obtenu en adjoignant les solutions et leurs dérivées, qui commutent à la dérivation. Du fait que les solutions d'une équation différentielle linéaire forment non plus un ensemble fini, mais un espace vectoriel de dimension finie, le groupe de Galois différentiel n'est plus un groupe fini en général, mais un groupe « continu » de matrices.

(21) Une équation différentielle relie une fonction y d'une variable x à sa *dérivée* $\frac{dy}{dx}$ et aux dérivées supérieures $\frac{d^i y}{dx^i}$. Elles sont apparues au XVII^e dans le contexte de la cinématique, où typiquement x figure la variable temporelle, y la fonction de position, $\frac{dy}{dx}$ la vitesse, $\frac{d^2y}{dx^2}$ l'accélération, etc. Rappelons que la dérivée de y en x est la pente de la tangente du graphe de la fonction y au point x.

(22) Picard (1883), Vessiot, Kolchin *et al*...

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

La théorie a mûri lentement, et la classification des ambiguïtés galoisiennes dans le cadre des équations différentielles linéaires analytiques au voisinage d'une singularité (c'est-à-dire d'un point où p_n s'annule) date seulement de la fin du XX^{e} siècle (J. P. Ramis, *et al*...). Le résultat est qu'il y a trois types, et trois seulement, de telles ambiguïtés galoisiennes, qui prennent en fait la forme de matrices :

• la *monodromie* : c'est l'ambiguïté qui résulte de ce que l'on ne retombe pas la valeur initiale lorsque l'on fait subir à une solution un tour autour de la singularité. On a déjà vu ce phénomène au chapitre II.2.1. Considérons l'équation différentielle

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2x}y$$

au voisinage de la singularité 0 ; une solution est $y = \sqrt{x}$, et un tour autour de l'origine la transforme en $-y$. Le groupe de Galois différentiel de cette équation est le groupe à deux éléments engendré par la monodromie.

• le *recalibrage des exponentielles* : considérons l'équation différentielle

$$x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = 0$$

au voisinage de la singularité 0 ; une solution est $y = e^{1/x} = \sum x^{-n}/n!$, et toute autre solution non nulle s'obtient en multipliant y par une constante non nulle. Le groupe de Galois différentiel de cette équation est le groupe multiplicatif $\mathbb{C}^\times$ (des nombres complexes non nuls) engendré par ces recalibrages.

• les *ambiguïtés de Stokes* : considérons l'équation différentielle

$$x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y = x$$

au voisinage de la singularité 0 ; une solution formelle est $\hat{y} = \sum(-1)^n n! x^{n+1}$, qui diverge en tout point $x \neq 0$. Toutefois, il y a moyen de « re-sommer » cette série divergente de manière canonique pour obtenir une vraie solution dans certains secteurs de sommet 0. Par exemple, dans un secteur bissecté par le demi-axe réel positif, une vraie solution, asymptotique à $\hat{y}$, est $y = \int_0^\infty \frac{e^{-t/x}}{1+t}\,\mathrm{d}t$ (comme le savait déjà Euler), mais les changements de secteurs introduisent des ambiguïtés dans ces vraies solutions resommées, les ambiguïtés de Stokes.

De manière générale, le groupe de Galois différentiel est engendré (au sens des groupes « continus ») par ces trois types de matrices.

Ainsi la Théorie de Galois s'étend, comme Galois l'avait lui-même pressenti, aux fonctions transcendantes solutions d'équations différentielles [23].

5 — Groupes de Galois motiviques et nombres transcendants

Mais laissons là les équations différentielles et même les fonctions, pour revenir aux nombres. *La Théorie de Galois, initialement conçue dans le cadre des nombres algébriques, s'étend-elle aux nombres transcendants (c'est-à-dire non algébriques) ?*

(23) Voir M. van der Put, M. Singer, *Galois theory of linear differential equations*, Springer Grundlehren der Math. Wiss. 328, 2003.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Il s'avère que la réponse est oui, du moins conjecturalement, pour des nombres qui s'écrivent comme intégrales (multiples) $\int_\Delta \omega$ où le domaine d'intégration Δ est limité par des équations polynômiales définies sur $\mathbb{Q}$ et l'intégrant ω est algébrique et défini sur $\mathbb{Q}$. Par exemple, le nombre $\pi = \int_0^1 4\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$ est de ce type.

La question de la nature de ces nombres a une très longue histoire : les premières spéculations sont dues à Leibniz (l'inventeur du concept de transcendance et du signe $\int$), dans un échange épistolaire avec Huygens (1691).

Pour ces nombres, une première réponse conjecturale moderne est donnée par la Théorie des motifs, imaginée par Grothendieck, plus précisément par la Théorie de Galois motivique qui est une vaste généralisation, partiellement conjecturale, de la Théorie de Galois s'appliquant aux systèmes de plusieurs équations algébriques à plusieurs variables [24]. Elle conduit à une théorie de Galois des périodes où les groupes de symétrie sont ces groupes de Galois motiviques.

Dans le cas de π, cette réponse est que le groupe de Galois associé est le groupe multiplicatif $\mathbb{Q}^\times$ des nombres rationnels non nuls — ce qui consonne avec l'idée d'Euler de voir π comme solution d'une équation de degré infini à coefficients rationnels (donnée par le développement en série de $(\sin x)/x$), dont les racines sont les multiples de π.

Une seconde réponse conjecturale, due à M. Kontsevich, est que les relations algébriques entre périodes devraient provenir des lois formelles qui gouvernent l'intégration : essentiellement, la formule de changement de variable algébrique et la formule de Stokes :

$$\int_\Delta f^*\omega = \int_{f_*\Delta} \omega, \quad \int_\Delta d\omega = \int_{\partial\Delta} \omega.$$

Notons que ces réponses semblent s'opposer : la première fait dériver les relations algébriques entre nombres du type $\int_\Delta \omega$ des relations (motiviques) entre couples (Δ, ω), la seconde des propriétés formelles de $\int$. Paradoxalement, et bien que chacune des deux demeure conjecturale, et même inaccessible actuellement, on sait démontrer qu'elles sont équivalentes.

6 — Coda : un groupe de Galois « cosmique » ?

Depuis quelque temps, les idées galoisiennes ont fait irruption en physique quantique, plus précisément en Théorie perturbative des champs quantiques.

À partir des travaux de Feynman et Schwinger, les physiciens ont mis au point des techniques sophistiquées pour éliminer les quantités infinies qui se présentent systématiquement, sous forme d'intégrales divergentes, dans la théorie. La plus simple et la plus utilisée de ces techniques est la renormalisation par régularisation dimensionnelle : on fait fluctuer la dimension de l'espace-temps en lui faisant prendre des valeurs complexes voisines de 4, et on développe les intégrales obtenues en séries indexées par des diagrammes de Feynman de complexité croissante. L'élimination des termes « divergents » de la série se fait suivant de subtiles règles combinatoires qui garantissent la cohérence du procédé.

(24) Voir Y. André, *Une introduction aux motifs*, Panoramas et Synthèses 17, SMF, 2004, et *Ambiguité, infini, transcendance. Réflexions sur l'évolution de la notion de nombre, après une lecture de G. Châtelet*, in Revue de Synthèse, Brill 2017.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

La « mœlle » mathématique de cette technique a récemment été extraite par Connes et Kreimer, qui ont associé à toute théorie quantique des champs un certain groupe de symétries infini (mais résoluble) directement construit en termes de diagrammes de Feynman. En effectuant une « montée vers l'absolu », ils obtiennent, dans la situation universelle, un groupe de Galois absolu — le groupe de Galois « cosmique » (P. Cartier [25]) — qui agit sur les constantes de toutes les théories quantiques des champs à la fois.

Ce groupe, d'une ubiquité stupéfiante, incarne à lui seul les divers avatars galoisiens évoqués ci-dessus :

- il s'interprète comme groupe de Galois différentiel,
- il apparaît comme groupe de Galois motivique,
- il est censé être le groupe de Galois de certaines intégrales de Feynman [26],
- c'est une variante algébro-géométrique du groupe de Galois-Grothendieck-Teichmüller.

En conclusion, on peut dire qu'en Théorie quantique des champs, les divergences, loin d'être des nuisances, donnent naissance à des « ambiguïtés galoisiennes » formant le groupe de symétries d'une riche structure qui apparaît dans des domaines mathématiques très éloignés les uns des autres.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

(25) *La folle journée, de Grothendieck à Connes et Kontsevich*, in *Festschrift* des 40 ans de l'IHES, 1998.
(26) Nombres présumés transcendants qui généralisent les valeurs aux entiers de la fonction zêta de Riemann (voir note 24).

© Spartacus-Idh 2021

Chapitre VI

Symétries II. Représentations linéaires

« Tout ce qui peut se ranger lui plaisait. »
G. Cuvier, *Éloge de Werner* (1)

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Hegel parlait de « l'apparence bariolée du sensible ». Ici, c'est plutôt « l'apparence bariolée » de l'intelligible mathématique que nous voudrions rendre sensible. En espérant faire entrevoir que le développement des Mathématiques ne repose pas sur le seul mouvement d'élévation conceptuelle, mais qu'au contraire la conquête de l'intelligible mathématique s'appuie sur une dynamique de va-et-vient entre avancées conceptuelles et retombées applicatives.

« Retombée » : n'y voyons surtout pas une chute d'Icare du ciel des Idées, mais ce mouvement essentiel par lequel les nouveaux concepts essaiment, se concrétisent, et fécondent d'autres territoires mathématiques.

Ce second chapitre sur le thème général des symétries s'ouvre sur un long préambule présentant les idées fondamentales de linéarisation et de représentation en Mathématiques. Nous esquisserons ensuite la théorie des représentations linéaires des groupes, initiée par Frobenius à la fin du XIX^{e} siècle (dans le cas des groupes finis). Un acteur majeur fut H. Weyl qui, en liaison avec ses travaux sur les fondements de la mécanique quantique, fit la jonction inattendue avec l'Analyse de Fourier et créa l'Analyse harmonique non commutative. La théorie s'est ensuite énormément développée et ramifiée sous la maîtrise d'œuvre de Gelfand.

Le rêve de Burnside de mettre à profit l'impressionnante effectivité de la Théorie des représentations linéaires pour classifier tous les groupes finis simples s'est finalement réalisé au bout d'un siècle. Entre-temps, cette théorie avait permis à E. Cartan et Killing de classifier tous les groupes infinis « continus » simples. Nous terminerons en expliquant comment le problème général de classification des représentations linéaires mène à une trichotomie (fini, modéré, sauvage), et comment l'indécidabilité surgit au cœur de situations extrêmement concrètes et apparemment élémentaires (2).

(1) Cité dans G. Bachelard, *Le matérialisme rationnel*, P. U. F., 1953.
(2) Leçon MaMuX du 1er décembre 2007.

1 — Linéarité. Linéarisation

1.1 — Bref retour à l'Algèbre linéaire

Comme nous l'avancions au début du troisième chapitre, l'Algèbre linéaire est la partie la plus simple des Mathématiques. Elle consiste, rappelons-le, en l'étude des espaces vectoriels (espaces où les points, nommés vecteurs, peuvent être additionnés entre eux et multipliés par des nombres) et des applications linéaires qui relient ces espaces, et tout particulièrement, de l'algèbre $\mathcal{L}(V)$ des opérateurs d'un espace vectoriel V (c'est-à-dire des applications linéaires de V dans lui-même), munie de l'addition et de la composition.

Supposons V de dimension finie. Dans une base donnée $e_1, \dots, e_n$, les vecteurs sont repérés par leurs coordonnées. Un opérateur $F \in \mathcal{L}(V)$ étant donné, les coordonnées λ_{ij} des vecteurs $F(e_j)$ forment une matrice Λ, c'est-à-dire un tableau carré de nombres (disons des nombres complexes).

La matrice Λ n'est pas intrinsèquement attachée à F : elle dépend de la base choisie. On peut se demander ce qui, de Λ, reste invariant par changement de base.

L'invariant le plus simple est la *trace* de Λ, c'est-à-dire la somme de ses coefficients diagonaux λ_{ii} :

$$\mathrm{tr}\Lambda = \sum \lambda_{ii} = \mathrm{tr}F,$$

qui jouera un rôle important dans la suite. En fait, tr$F$ est la somme des *valeurs propres* de F, qui ne sont autres que les éléments du spectre de F comptés éventuellement plusieurs fois [3]. En outre, vis-à-vis de la composition des opérateurs, la trace vérifie l'identité

$$\mathrm{tr}FG = \mathrm{tr}GF.$$

C'est un outil de passage du non-commutatif au commutatif.

1.2 — Linéarisation

La *linéarité* est le caractère des situations ou problèmes mathématiques dans lesquels les multiplicités à l'œuvre forment des espaces vectoriels. Le rôle de l'Algèbre linéaire est précisément d'aider à traiter les problèmes linéaires, c'est-à-dire ceux dont les solutions forment *a priori* un espace vectoriel : la somme de deux solutions est encore une solution, de même que la multiplication d'une solution par une constante arbitraire.

La *linéarisation*, certainement l'une des démarches les plus universelles en Mathématiques, des plus abstraites aux plus appliquées, consiste à essayer de ramener des problèmes non-linéaires à des problèmes linéaires, toujours plus abordables grâce notamment à la technologie élémentaire de l'Algèbre linéaire.

La linéarisation se retrouve aussi bien en Analyse qu'en Géométrie et en Algèbre. En Analyse, elle se présente sous la forme de l'*approximation au premier ordre*. En voici trois grands exemples.

(3) Comme on l'a vu au chap. III, 5.1, p. 44, ces éléments sont les nombres μ tels que $F - \mu I$ n'est pas inversible.

En dimension infinie, c'est plus compliqué : pour pouvoir écrire des sommes infinies, on doit introduire un peu de topologie ; la situation la plus commode est celle des espaces de Hilbert, *cf.* chap. III, 4.2, p. 43.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

• Soit f une fonction lisse d'une variable x (« lisse » évoque, intuitivement, quelque chose comme « agréable à caresser » ; formellement : « indéfiniment différentiable ». Pourvoir les chaînons manquants dans l'évolution putative de la notion intuitive à la notion formelle est une gageure tant pour les sciences cognitives que pour l'histoire des Mathématiques...)

Une telle fonction admet un développement en puissances [4] de la variable x

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

où les a_n sont des constantes. La linéarisée de f est $a_0 + a_1 x$ (cela revient si l'on veut à poser, quelque peu brutalement, $x^2 = 0$ dans le développement de f). Avantages quantitatifs et qualitatifs : bonne approximation numérique en pratique, et détection de la croissance (positivité de a_1).

Du point de vue géométrique, cela revient à remplacer le graphe de la fonction f par sa tangente au point d'abscisse 0. Noter qu'on reconstruit f en prenant l'enveloppe de ses tangentes (en tous les points du graphe).

Plus généralement, prendre l'*espace tangent* d'une variété (lisse) en un point est une forme de linéarisation.

• Considérons un groupe « continu » G de transformations [5], par exemple le groupe $GL(V)$ des applications linéaires inversibles de V dans V. L'espace tangent en l'identité est l'*algèbre de Lie* de G : elle est munie d'opération « crochet de Lie » $[\,,\,]$ que l'on obtient en « linéarisant » le commutateur

$$g_1, g_2 \mapsto g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$$

(en fait en regardant le terme d'ordre 2 car il n'y a pas de terme d'ordre 1). La structure d'algèbre de Lie [6] de G est une forme linéarisée de la structure de groupe de Lie. Par exemple, l'algèbre de Lie de $GL(V)$ est l'espace d'opérateurs $\mathcal{L}(V)$, muni du crochet $[F_1, F_2] = F_1 F_2 - F_2 F_1$.

• Les systèmes dynamiques, qui modélisent mathématiquement l'évolution de toutes sortes de systèmes physiques, biologiques, économiques, etc., sont souvent non-linéaires. Considérons par exemple un système du type

$$dy/dt = F(y, t),$$

où t désigne la variable temporelle et $y = (y_1, \ldots, y_n)$ un ensemble de quantités dépendant du temps. Au voisinage d'un point d'équilibre y_0, on peut linéariser le système, ce qui donne

$$dy/dt = DF(y_0, t)(y - y_0),$$

où $DF(y_0, t)$ est maintenant une matrice. De nombreux théorèmes de la théorie des systèmes dynamiques ont pour objet de prédire le comportement du système en fonction du spectre de la matrice $DF(y_0, t)$ (e.g. si le spectre est négatif, l'équilibre est stable...).

(4) En pratique, souvent, ce développement converge et f en est la somme ; on dit alors que f est analytique. La théorie des développements asymptotiques, qui a fait une apparition-éclair à la fin du chapitre V.4, p. 70, permet de donner sens à ces développements même dans le cas divergent.

(5) « Groupe de Lie », *cf. e. g.* J. Stillwell, Naive Lie theory, Springer.

(6) Espace vectoriel muni d'une opération « crochet de Lie » vérifiant des axiomes convenables.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Là se trouve d'ailleurs, semble-t-il, la source historique de la notion de spectre et de valeur propre en Mathématiques, qui a migré de l'Analyse appliquée à l'Algèbre (travaux de Lagrange puis de Laplace sur les petits mouvements d'un système au voisinage d'un point d'équilibre et les inégalités séculaires des planètes, où les parties imaginaires des valeurs propres apparaissent comme des fréquences).

2 — Le concept mathématique de représentation

Nous le ferons émerger de trois doublets successifs : objets généraux/objets particuliers, mode intrinsèque/mode extrinsèque, présentation/représentation.

2.1 — Objets généraux/objets particuliers

Il s'agit là d'une distinction (7) imprécise et presque triviale, mais omniprésente dans le champ mathématique (et pourtant peu soulignée).

Appelons *objets généraux* ces objets indifférenciés dans leur type d'être mathématique, ceux qu'accompagne, plus ou moins tacitement, l'adjectif « quelconque » — comme dans les expressions canoniques « soit ABC un triangle quelconque », « considérons un groupe G », etc.

Souvent, les objets généraux que l'on considère sont tout simplement les objets d'une catégorie donnée (groupes, espaces vectoriels, espaces topologiques, etc.). Un point de vue structuraliste outrancier voudrait que ce soit toujours le cas ; autrement dit, qu'un objet mathématique général ne soit rien d'autre qu'une espèce de structure.

Or ce n'est pas toujours le cas, tant s'en faut : par exemple, les systèmes dynamiques évoqués ci-dessus sont les objets généraux d'un immense chapitre des Mathématiques, qui ne se laissent pas enfermer dans une saisie catégorique, si ce n'est fort artificiellement.

Soit dit en passant, il importe d'être conscient des limites de l'approche catégorique, et surtout de ne pas confondre à cet égard trois « ordres d'universalité » : la notion mathématique d'« universalité » que la Théorie des catégories thématise, l'« universalité » théorique d'application de ses concepts formels (liée au fait que par nature, cette théorie occulte la structure interne des objets), et l'« universalité » — ou plutôt la généralité — relativement limitée, voire précaire, de son importance pratique dans le champ mathématique tout entier.

Les *objets particuliers*, quant à eux, sont des sortes de « personnages » mathématiques qui ont un nom propre. Ils interagissent les uns avec les autres, et avec les objets généraux. Nous en avons déjà rencontré quelques specimens remarquables :

- la fonction exponentielle,
- le facteur moyennable de type II_1 dans la théorie de von Neumann (et plus récemment héros de la Logique des interactions de Girard),

(7) Cette terminologie n'est guère satisfaisante. Nous l'employons par défaut, le doublet « générique/singulier » étant déjà fort employé en Mathématiques, comme nous le verrons au chapitre suivant.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

- la Logique classique (parmi toutes les logiques intuitionnistes),
- le groupe de Galois absolu $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ (objet central de la Théorie des nombres),
- le groupe de Galois cosmique (qui agit sur les constantes de toutes les théories quantiques des champs).

Ces objets particuliers n'ont pas pour fonction d'orner un cabinet de curiosités mathématiques : ils sont d'autant plus fascinants qu'ils sont plus protéiformes et ubiquitaires, c'est-à-dire qu'ils admettent de nombreuses descriptions différentes et interviennent de façon différente dans plusieurs théories mathématiques. Cette *combinaison de singularité et d'ubiquité* enchante bien des mathématiciens, qui considèrent de tels objets particuliers remarquables comme les joyaux de leur discipline. Leur apparition inopinée dans une théorie mathématique qui les ignorait, est le présage de développements exaltants, l'un des catalyseurs de l'unité des Mathématiques en acte. L'explication de cette apparition passe souvent par le façonnage d'objets mathématiques généraux tout à fait nouveaux. L'exploration de ce nouvel inconnu peut alors mener, après un âpre travail, à une classification qui fait apparaître de nouveaux objets particuliers.

Cette dialectique entre objets généraux et objets particuliers, qui nous semble être l'un des moteurs de la recherche mathématique, ne semble pas avoir attiré l'attention des épistémologues.

2.2 — Mode intrinsèque/mode extrinsèque

La question qu'on se pose maintenant est celle du mode sous lequel tel ou tel objet mathématique *particulier* est constitué/envisagé.

Prenons, pour fixer les idées, le cas d'objets géométriques. Traditionnellement, c'est-à-dire depuis les Anciens jusqu'à Gauss, ils étaient envisagés par rapport à un *référent* géométrique : le plan ou bien l'espace euclidien de dimension trois ; l'étude portait donc sur l'*objet plongé*.

C'est Gauss qui, dans son étude fondamentale des surfaces, a mis l'accent sur les propriétés *intrinsèques* [8], c'est-à-dire indépendantes du plongement dans le référent. Cela suppose déjà une vision claire de l'identité (ou plus correctement, de l'« isomorphie ») d'objets géométriques plongés différemment dans un référent. On peut y voir l'une des sources de l'importance prise peu à peu par la notion générale d'isomorphisme, puis de morphisme.

Toutefois, si c'est la notion intrinsèque qui importe en fin de compte, il ne s'agit pas pour autant de se débarrasser d'un référent, la donnée même d'un objet mathématique *particulier* se faisant très souvent de manière extrinsèque, e.g. *via* des équations. Le caractère intrinsèque des objets et propriétés considérés permet alors, selon un libre jeu de changements de repères, de choisir la description la plus commode selon les besoins.

À titre d'exemple, reprenons le cas, évoqué au début de ce chapitre, d'un opérateur linéaire $F \in \mathcal{L}(V)$. Bien souvent, ce qui est donné en pratique, ce n'est pas F lui-même, mais le tableau carré de nombres qu'est sa matrice Λ.

(8) La dialectique intrinsèque/extrinsèque a été bien thématisée par A. Lautman, *Essai sur les notions de structure et d'existence en Mathématiques*. Réédition Vrin 2006, II.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

L'opérateur F est l'objet abstrait intrinsèque défini par Λ dans une base donnée, c'est-à-dire une fois V identifié à $\mathbb{C}^n$. Cette définition est donc de nature extrinsèque : elle dépend du choix d'une base. Lorsqu'on la change, Λ se change en une matrice du type $P\Lambda P^{-1}$, et on peut par exemple tirer profit de cette variation pour se ramener au cas commode d'une matrice triangulaire (*i.e.* n'ayant que des 0 au-dessous de la diagonale).

Nous allons maintenant discuter *deux modes extrinsèques de se donner un objet mathématique particulier : la présentation et la représentation*.

Ces deux modes sont de caractères opposés : la présentation est une description abstraite, formelle, symbolique de l'objet considéré, tandis que la représentation vise à une « concrétisation », une « réalisation », une « incarnation » de cet objet.

2.3 — Présentations

Présenter un objet mathématique, c'est l'exhiber en termes de générateurs et relations.

Pour fixer les idées, considérons le cas d'un groupe. Présenter un groupe G, c'est se donner G par générateurs g_i et relations r_j, de la manière suivante :

- les g_i sont des symboles (sans contenu sémantique spécifié), chacun étant accompagné d'un autre symbole g_i^{-1} (appelé inverse de g_i). On considère l'alphabet (fini ou infini) formé des g_i et des g_i^{-1},
- les $r_j = r_j(g_i, g_i^{-1})$ sont certains mots écrits dans cet alphabet,
- les éléments de G sont les mots qu'on peut écrire dans cet alphabet, *modulo les relations* r_j,
- la loi de composition de G est donnée par la concaténation des mots mis bout à bout. L'élément neutre est le mot vide (sans lettre), noté 1_G ou simplement 1.

L'expression « modulo les relations r_j » demande explication : on entend par là que deux mots m_1 et m_2 sont considérés comme définissant le même élément de G si on peut les obtenir tous deux à partir d'un troisième mot m en effaçant à l'intérieur de m certaines séquences du type r_j, ou $g_i g_i^{-1}$, ou $g_i^{-1} g_i$.

On dit que le groupe G est de *présentation finie* s'il peut être défini par un nombre fini de générateurs g_i et de relations r_j.

Le groupe *libre* engendré par $g_1, \ldots, g_n$ est le groupe ayant pour générateurs les g_i liés par aucune relation. Si $n = 1$, on trouve le groupe des entiers $\mathbb{Z}$ (muni de l'addition). Pour $n \geqslant 1$, ce groupe s'identifie au groupe fondamental du plan privé de n points $x_1, \ldots x_n$ (voir chap. V, 3.2) : les g_i symbolisent des chemins partant et aboutissant à un point-base fixé x, et tournant une fois autour du point manquant x_i dans le sens trigonométrique.

Du point de vue des présentations, les groupes libres jouent le rôle de référents. Dans ce mode extrinsèque de description, un groupe n'apparaît pas comme plongé dans un référent, mais, dualement, comme quotient du référent.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Tout élémentaire et formel que paraisse ce mode de définition d'un groupe, surtout dans le cas de présentation finie où tout se réduit à concaténer et simplifier des mots sur un alphabet fini, la présentation par générateurs et relations recèle en fait de redoutables difficultés, dont le fameux *problème des mots* [9] :

soit G le groupe donné par une présentation finie explicite (g_i, r_j). Donner un algorithme pour déterminer si deux mots m_1 et m_2 (sur l'alphabet formé des g_i et des g_i^{-1}) coïncident modulo les relations r_j, autrement dit, s'ils définissent le même élément de G.

Toute la difficulté réside en ce qu'on ne connaît pas de borne *a priori* pour la longueur du mot m dont dériveraient à la fois m_1 et m_2 par simplification, s'ils définissaient le même élément de G. La réponse au problème des mots a été apportée en 1955 par P. Novikov :

pour certains groupes G de présentation finie, le problème des mots est indécidable.

Ce résultat célèbre est sans doute la première manifestation d'indécidabilité (au sens usuel d'inexistence de machines de Turing capables de trancher algorithmiquement la question) en dehors du domaine de la Logique et de la Théorie des ensembles.

Par la suite, on a pu caractériser les groupes G de présentation finie pour lesquels le problème des mots est décidable : ce sont ceux qui se plongent dans un groupe simple qui lui-même se plonge dans un groupe de présentation finie [10]. De là à savoir construire des groupes où le problème des mots est indécidable, il y a un grand pas... et une riche théorie.

Gardons-nous donc de confondre « indécidable » (qui a un sens logico-mathématique précis à condition d'en préciser le contexte) *et « inconnaissable »* (qui n'en a aucun), *et d'interpréter l'indécidabilité comme on ne sait quel retrait du « manteau » mathématique devant le « toucher de l'esprit »*.

2.4 — Représentations

Représenter un objet mathématique, c'est le décrire en termes de son action sur d'autres objets X préalablement connus.

Pour fixer les idées, reprenons le cas d'un groupe. Représenter un groupe G, c'est se donner G comme groupe de symétries d'un ensemble structuré X. Dans une acception un peu plus générale, c'est se donner un morphisme [11]

$$G \to Aut\, X$$

du groupe G vers le groupe des automorphismes de X. On parle aussi d'*action* de G sur X, et on note $g \cdot x$ l'élément de X qui est le résultat de l'action de l'élément $g \in G$ sur l'élément $x \in X$.

• Par exemple, tout groupe G agit sur lui-même par translations à gauche : $g \cdot x$ étant le produit de g et de x dans G. Ce faisant, G s'incarne comme un groupe de permutations particulières de ses éléments. On peut aussi faire agir G sur lui-même par conjugaison (*cf.* chap. V, 1.3).

(9) Posé par M. Dehn en 1911.
(10) Boone et Higman (1974).
(11) C'est-à-dire une application qui respecte la loi de composition.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

• Le « programme d'Erlangen » de Klein évoqué au chapitre V.2.2 fournit de nombreux exemples d'actions de groupes de déplacements sur des figures géométriques. Ce programme est en fait une réflexion de fond sur la notion d'action en Géométrie.

2.5 — Représentations linéaires

Une représentation est d'autant plus efficace que le substrat X de l'action est élémentaire ou bien connu. Le cas d'un espace vectoriel est à cet égard prometteur.

On parle de *représentation linéaire* lorsque X est un espace vectoriel, qu'on note plutôt V comme d'habitude ; le groupe des automorphismes de V n'est autre que $GL(V)$. Lorsque V est de dimension finie, on parle de *représentation linéaire de dimension finie*.

Une représentation linéaire d'un groupe G dans l'espace vectoriel V, c'est donc un morphisme de groupes [12]

$$\rho : G \to GL(V).$$

En dimension finie et sous l'hypothèse que ρ injectif [13], représenter linéairement un groupe abstrait G, c'est donc le représenter « concrètement » comme *groupe de matrices* [14]. Une représentation linéaire est dite *irréductible* si V n'a pas de sous-espace [15] stable sous l'action de G.

Le leitmotiv de la Théorie des représentations linéaires des groupes est d'essayer de « comprendre » un groupe abstrait G à partir de la collection de ses représentations linéaires (irréductibles).

Voici trois exemples de représentations linéaires.

• Partant d'une action d'un groupe G sur un ensemble structuré X quelconque, voici comment en déduire une représentation linéaire de G. On prend pour V l'espace vectoriel $F(X)$ formé des fonctions sur X à valeurs complexes [16], et on fait agir G sur $F(X)$ par la règle suivante qui définit l'action $g \cdot f$:

$$(g \cdot f) \cdot x = f(g^{-1} \cdot x)$$

(où x désigne un élément de X, f un élément de $F(X)$, g un élément de G).

En particulier, si G agit sur $X = G$ par translation, la représentation linéaire ainsi obtenue (dans l'espace $F(G)$ des fonctions sur G) s'appelle la *représentation régulière* de G et est notée ρ_{reg}.

• Reprenons le premier exemple du numéro précédent, dans le cas particulier d'un groupe continu de transformations G (groupe de Lie) agissant par conjugaison. Par linéarisation, l'action de G sur lui-même induit une représentation linéaire de G sur son algèbre de Lie.

• Considérons une équation différentielle linéaire d'ordre m

$$p_m(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + \cdots + p_1(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p_0(x) = 0,$$

les coefficients $p_i(x)$ étant des polynômes. Les singularités de cette équation sont les racines $x_1, \ldots x_n$ du polynôme $p_m(x)$. Au voisinage de tout point x

(12) Si G est muni d'une topologie, il est naturel de requérir que ce morphisme soit continu.
(13) C'est-à-dire faisant de G un sous-groupe de $GL(V)$.
(14) On renvoie au chapitre III.2.3, p. 36, pour la définition de la composée de deux matrices.
(15) Distinct de $\{0\}$ et de lui-même, bien entendu.
(16) Variante utile en dimension infinie : on peut imposer diverses conditions sur ces fonctions.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

distinct des singularités, les solutions de cette équation différentielle linéaire d'ordre n forment un espace vectoriel V de dimension m. Mais quand on « suit » une solution y le long d'un chemin partant de x et aboutissant à x, mais entourant une ou plusieurs singularités, on retombe en général sur une *autre* solution de l'équation. Ainsi, le groupe fondamental (*cf.* chap. V, 3.2, p. 68) du plan privé de $x_1, \ldots, x_n$ agit sur V : on obtient une représentation du groupe libre à n générateurs, dite *représentation de monodromie*.

On peut additionner et multiplier des représentations linéaires [17], comme suit :

• la *somme* de deux représentations $\rho \oplus \rho' : G \to GL(V \oplus V')$ a pour espace sous-jacent l'ensemble $V \oplus V'$ des couples formés d'un vecteur de V et d'un vecteur de V'. L'action de $g \in G$ est donnée par la formule $g \cdot (v, v') = (g \cdot v, g \cdot v')$.

• le *produit tensoriel* de deux représentations $\rho \otimes \rho' : G \to GL(V \otimes V')$ a pour espace sous-jacent l'ensemble des combinaisons linéaires de symboles $e_i \otimes e'_j$, où les e_i sont des vecteurs de base de V et les e'_j des vecteurs de base de V'. L'action de $g \in G$ est donnée par la formule $g \cdot (e_i \otimes e'_j) = (g \cdot e_i) \otimes (g \cdot e'_j)$.

3 — Représentations linéaires des groupes

3.1 — Caractères : la théorie de Frobenius

La théorie des représentations linéaires des groupes finis est née en 1896, grâce aux efforts de G. Frobenius pour répondre aux questions de R. Dedekind, qui se heurtait à des calculs inextricables en Théorie de Galois des équations algébriques, dès que le degré dépassait 4. Le concept fondamental de sa théorie est celui de *caractère*.

Soit G un groupe à N éléments. On note $F_{cent}(G)$ le sous-espace de $F(G)$ formé des *fonctions centrales*, c'est-à-dire des fonctions f (à valeurs complexes) vérifiant $f(gg') = f(g'g)$ pour tout couple (g, g') d'éléments de G. Le produit scalaire

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{g \in G} \bar{f}_1(g) f_2(g) \tag{VI.1}$$

fait de $F_{cent}(G)$ un espace euclidien complexe (*cf.* chap. III, 4.1).

Soit maintenant $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de dimension finie de G. Son *caractère* χ_ρ est la fonction sur G à valeurs complexes définie par la trace :

$$\chi_\rho(g) = \mathrm{tr}\rho(g).$$

Par la propriété fondamentale de la trace (*cf.* § 1.1), c'est un élément de $F_{cent}(G)$.

Il s'avère qu'une représentation ρ est complètement déterminée par son caractère χ_ρ. En outre, cette *correspondance de Frobenius entre représentations et caractères* jouit des propriétés remarquables suivantes :

• ρ est irréductible $\Leftrightarrow$ χ_ρ est *unitaire* : $\langle \chi_\rho, \chi_\rho \rangle = 1$,

• les caractères unitaires forment une base orthonormée de $F_{cent}(G)$; pour tout élément $f \in F_{cent}(G)$, on a donc la décomposition

$$f = \sum \langle \chi_n, f \rangle \chi_n \tag{VI.2}$$

(17) L'intérêt de ces opérations apparaîtra en 3.3, p. 85.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

où χ_n parcourt les caractères unitaires,

• $\chi_{\rho \oplus \rho'} = \chi_\rho + \chi_{\rho'}$ et $\chi_{\rho \otimes \rho'} = \chi_\rho \cdot \chi_{\rho'}$,

• toute représentation ρ de dimension finie de G est somme directe de représentations irréductibles. La multiplicité avec laquelle la représentation irréductible de caractère χ_n apparaît dans ρ est $\langle \chi_n, \chi_\rho \rangle$. Cas particulier : la décomposition de la représentation régulière est : $\rho_{reg} = \oplus (\dim \rho_n)\, \rho_n$ où ρ_n parcourt toutes les représentations irréductibles.

La correspondance de Frobenius permet d'associer à tout groupe fini sa *table de caractères*, c'est-à-dire le tableau de nombres complexes dont les entrées sont les valeurs des caractères unitaires [18], et *cette table détermine le groupe* (en un sens à préciser). Cette correspondance réalise ainsi l'exploit de *ramener en principe la structure du groupe fini abstrait G à de simples données numériques*. Ainsi, on montre facilement qu'un groupe fini G est

• *simple* [19] si et seulement si pour tout $g \neq 1_G$ et pour tout caractère $\chi \neq 1$, $\chi(g) \neq \chi(1_G)$.

• *commutatif* si et seulement si pour tout caractère unitaire χ, $\chi(1_G) = 1$.

Bien entendu, pour exploiter à fond cette correspondance, encore faut-il la rendre explicite, c'est-à-dire savoir calculer la table des caractères. Il existe pour cela un algorithme simple dû à W. Burnside, l'un des fondateurs de la théorie [20].

3.2 — Représentations linéaires des groupes compacts et Analyse harmonique. L'apport de Weyl

Comme on l'a vu au chapitre III.4.2, on définit en Analyse de Fourier le produit scalaire de deux fonctions périodiques $f_1(t)$ et $f_2(t)$ de période 2π par la formule

$$< f_1, f_2 >= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \bar{f}_1(t) f_2(t)\, dt. \qquad \text{(VI.3)}$$

L'espace $L^2(U(1))$ des fonctions f pour lesquelles $< f, f >$ est bien défini est un espace de Hilbert [21]. Une base orthonormée est donnée par $e_n = e^{\sqrt{-1}nt}$ (où n est un entier quelconque), et tout $f \in L^2(U(1))$ s'écrit de manière unique

$$f = \sum_n < e_n, f > e_n \qquad \text{(VI.4)}$$

(expression mathématique de la décomposition des ondes en somme de modes propres de vibration).

(18) Comme les caractères sont des fonctions centrales, on peut se limiter à considérer leurs valeurs sur des représentants des classes de conjugaison de G, ce qui permet d'obtenir un tableau carré. Par ailleurs ces valeurs sont des nombres d'un type bien particulier : comme tout élément g de G vérifie $g^N = 1_G$, toute valeur propre μ de $\rho(g)$ vérifie $\mu^N = 1$, de sorte que les valeurs de caractères sont toujours des sommes de racines N-ièmes de l'unité.

(19) C'est-à-dire n'admet pas de quotient non trivial ; mais, attention, il peut admettre des sous-groupes non-triviaux, qui ne seront pas normaux.

(20) Voir T. Coquand, B. Spitters, « A constructive proof of the Peter-Weyl theorem », *Mathematical Logic Quarterly* 51.4 (2005), p. 351–359.

(21) C'est-à-dire un espace euclidien complet de dimension infinie (*cf.* chap. III, 4.2, p. 43).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

H. Weyl semble avoir été le premier à remarquer l'analogie (frappante) entre ces formules et les formules (4.1) et (4.2) du paragraphe précédent. On avait affaire à un groupe fini G (non nécessairement commutatif), et à un espace euclidien de dimension finie dont le produit scalaire était défini par une somme finie ; ici, on a affaire au groupe topologique (commutatif) infini $U(1)$ des rotations planes autour de l'origine (qu'on peut identifier au cercle unité, chaque rotation étant épinglée par son angle $t \in]-\pi, \pi]$), et à un espace de Hilbert dont le produit scalaire est défini par une intégrale relative à la mesure de probabilité $\frac{dt}{2\pi}$ sur $U(1)$; les e_n sont les caractères unitaires de $U(1)$.

En Mathématiques, toute analogie est une aubaine : le chercheur n'a de cesse de la creuser jusqu'à sa disparition/absorption dans une théorie qui englobe les théories jumelles. C'est ce qu'a fait Weyl : il a étendu la théorie de Frobenius aux représentations linéaires de dimension finie des *groupes* (*de Lie*) *compacts* non nécessairement commutatifs, et créé l'Analyse harmonique non commutative.

Le prototype d'un groupe compact est le groupe $U(n)$ des opérateurs unitaires d'un espace euclidien de dimension n, voir chap. III, 4.1.

L'analogue pour un groupe compact G de la décomposition de la représentation régulière d'un groupe fini, c'est le théorème de Peter-Weyl : $L^2_{cent}(G)$ se décompose selon les représentations irréductibles de G (il y en a une infinité), chacune intervenant avec une multiplicité égale à sa dimension [22].

3.3 — Problème de Tannaka

Étant donné un groupe compact G, on dispose de la catégorie $Rep\, G$ des représentations linéaires de dimension finie de G [23].

Le leitmotiv général de la Théorie des représentations linéaires formulé ci-dessus (§ 2.5) incite à poser le problème suivant (problème de Tannaka) :

Peut-on reconstituer G à partir de $Rep\, G$?

La réponse est « non... mais presque ». Rappelons (ibidem) que $Rep\, G$ est munie d'une opération interne « produit tensoriel » $\otimes$. Le théorème de Tannaka dit qu'on peut bel et bien reconstruire G à partir de la catégorie $Rep\, G$ munie de $\otimes$.

C'est par le biais d'une vaste généralisation de ce résultat que Grothendieck est parvenu à l'idée de *groupe de Galois motivique*, qui a fait une apparition furtive dans le chapitre précédent (chap. V, 5, p. 71) [24].

3.4 — Représentations linéaires et mécanique quantique

Le produit tensoriel, conçu en Algèbre et pour l'Algèbre, a fait fortune en mécanique quantique : l'état de n particules est décrit non par la somme, mais par le produit tensoriel de n espaces de Hilbert $\mathcal{H}$. Du principe d'indiscernabilité des particules identiques, on déduit une action du groupe $\mathfrak{S}_n$ des

(22) Voir par exemple T. Coquand, B. Spitters, « A constructive proof of the Peter-Weyl theorem », *Mathematical Logic Quarterly* 51.4 (2005), p. 351–359.

(23) Un morphisme de représentations n'étant autre qu'une application linéaire compatible aux actions de G.

(24) Signalons au passage que l'étude des représentations linéaires du groupe de Galois absolu $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ (*cf.* chap. V, 3.1, p. 68) est l'un des domaines les plus actifs de la Théorie des nombres contemporaine. Pour un groupe compact totalement discontinu comme $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, ce n'est d'ailleurs pas le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes qui est le corps naturel de coefficients de ces représentations galoisiennes, mais ce sont ce qu'on appelle les corps p-adiques, *cf.* chap. I, 3.2, p. 11.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

permutations sur n objets sur $\mathcal{H}^{\otimes n}$. Dès les années 1926–27, E. Wigner étudiait cette représentation linéaire. À la même époque, Weyl s'intéressait aux représentations unitaires de dimension infinie du groupe additif des réels $\mathbb{R}$ qui apparaissent en mécanique quantique sous la forme $t \mapsto e^{\sqrt{-1}tH}$ où H est un opérateur hamiltonien (*cf.* chap. III, 6.3, p. 48). La synthèse [25] qu'il a écrite sur la Théorie des représentations et la Mécanique quantique, parue en 1928 (soit fort peu après les travaux fondateurs de Heisenberg et Schrödinger), a eu une influence considérable.

Les théories de jauge, dont les origines remontent d'ailleurs aussi à Weyl, ont par la suite contribué à renforcer l'importance de la Théorie des représentations en Physique des particules. Selon ces théories, c'est *grosso modo* $U(1)$ qui gouverne l'électro-magnétisme, $U(2)$ les forces électro-faibles, $U(3)$ les interactions fortes (les quarks qui, avec les leptons, constituent la matière, furent introduits dans la théorie par Gell-Mann et Neeman en 1964 sur la base de considérations sur les représentations de $U(3)$).

3.5 — Représentations linéaires en dimension infinie. La théorie de von Neumann et l'école de Gelfand

Les travaux de Weyl ont ouvert une nouvelle ère dans la Théorie des représentations : celle de l'étude des représentations de dimension infinie (de préférence unitaires) des groupes topologiques G.

Deux théories, ou deux écoles, en sont nées : la théorie des algèbres d'opérateurs de von Neumann évoquée au chapitre 2, et l'école de Gelfand.

Le lien entre représentations linéaires et algèbres d'opérateurs est le suivant. Soit $\rho : G \to U(\mathcal{H})$ une représentation unitaire d'un groupe topologique G dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. Alors le commutant de $\rho(G)$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ est une algèbre de von Neumann (voir § 5.1).

I. Gelfand et son école se sont principalement occupés de construire et classer des représentations. La théorie est extrêmement ramifiée, mais il en émerge un principe directeur (*principe de Kirillov*) : les représentations irréductibles de dimension infinie d'un groupe de Lie correspondent à certaines orbites pour l'action de ce groupe sur (le dual de) son algèbre de Lie (orbites soumises à une certaine condition de « quantification », dans l'esprit de la mécanique quantique). Ce principe permet de se ramener à des problèmes de dimension finie.

4 — Représentations linéaires et problèmes de classification

4.1 — « Taxinomie » mathématique

Nous avons déjà dit quelques mots sur le rôle de la classification en Mathématiques au chapitre III.6.4. Ce rôle étant moins connu que dans d'autres sciences, les classifications paraissent davantage préservées, dans le domaine mathématique, du discrédit culturel actuel qui bannit presque du champ de la pensée ces avatars scientifiques de la « philatélie », la patience illimitée qu'exige leur exercice étant parfois perçue comme l'antithèse de l'éclair de génie.

(25) *Gruppentheorie und Quantenmechanik* (1928), transl. by H. Robertson, *The Theory of Groups and Quantum Mechanics*, (1931), Dover.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

On sait pourtant comment les grands travaux systématiques botaniques et zoologiques, de Linné à Lamarck et Cuvier, ont forgé, lors de l'élaboration de schèmes classificatoires « naturels », la compréhension progressive de la structure visible et de l'organisation des êtres vivants ; comment la problématique de la classification des éléments simples, culminant avec la combinatoire du tableau périodique de Mendeleieff des 92, a contribué à façonner la rationalité chimique (26), etc.

De même, en Mathématiques, certaines classifications ont eu une importance conceptuelle qui dépasse de bien loin les problèmes de rangement (27) ; c'est certainement le cas de celles que nous allons évoquer ci-dessous.

Les classifications portent sur des objets généraux (au sens du § 2.1, p. 78), mais font parfois apparaître en fin de compte des objets particuliers tout à fait imprévus ; un tel passage ne s'obtient pas par une simple méditation dialectique sur les objets généraux considérés.

4.2 — Classification des groupes finis simples

Un exemple emblématique de classification mathématique est celui de la classification des groupes finis simples. Rappelons encore une fois qu'un groupe fini est dit simple s'il n'a pas de quotient non trivial, ou ce qui revient au même, s'il n'a pas de sous-groupe normal non trivial (*cf.* chap. V, 1.3, p. 65) (28). Tout groupe fini se « dévisse » en groupes finis simples, qui sont, eux, « indévissables ».

Le rêve de Burnside de classifier, en s'appuyant sur la Théorie des représentations, les groupes finis simples a finalement abouti, au bout d'un siècle de travail monumental. On a la liste complète : trois séries infinies mais élémentaires

- groupes cycliques d'ordre premier,
- groupes alternés (29),
- groupes simples de type de Lie (30),

plus *26 groupes sporadiques*, dont le plus gros, appelé « Monstre », a

$$808017424794512875886459904961710757005754368000000000$$

éléments (il est construit par « représentation », comme groupe de symétries d'une certaine structure remarquable en dimension 196883).

Les cinq premiers groupes sporadiques (31) ont été découverts par Mathieu en 1860. Il a fallu plus d'un siècle pour qu'un sixième n'apparaisse, au cours du travail de classification. La fin de ce travail avait été annoncée en 1983, mais un « trou » a été repéré dans une démonstration, trou qui a été « bouché » grâce à un article-rustine de 1300 pages !

(26) *Cf.* G. Bachelard, *op. cit.*, P. U. F., 1953, chap. III.

(27) Il y aurait certes bien des distinctions à faire entre classifications, mais c'est à un philosophe des sciences qu'il revient d'en parler. Remarquons seulement qu'il ne s'agit dans ce chapitre que du cas où la classification aboutit à des listes dénombrables. Bien d'autres problèmes de classification mettent en jeu à la fois des invariants discrets et des modules continus qui forment parfois des objets de même nature générale que ceux que l'on classifie.

(28) La notion, sinon le qualificatif, est due à Galois.

(29) c'est-à-dire groupes de permutations de n lettres composés d'un nombre impair d'échanges de deux lettres. C'est Galois qui a montré que ce sont des groupes simples dès que $n \geqslant 5$.

(30) ce sont, *grosso modo*, des groupes de matrices à coefficients dans un corps fini.

(31) ce qualificatif est dû à Burnside.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

La classification est désormais réputée achevée (32) et les experts sont en train de rédiger une preuve « de seconde génération », plus compacte (environ 5000 pages si tout va bien !) et plus conceptuelle.

Au-delà des groupes finis simples eux-mêmes, qu'en est-il de la classification de leurs *représentations linéaires* ? Autrement dit, que sait-on de leurs tables de caractères ?

Pour les groupes cycliques ou alternés, elles étaient déjà connues de Frobenius. Pour les groupes sporadiques, on possède des atlas de tables de caractères. La question des tables de caractères des groupes finis de type de Lie est en revanche ouverte, c'est même l'objet d'un champ d'investigation vaste et très actif sous la maîtrise d'œuvre de G. Luzstig. Celui-ci a proposé une étonnante conjecture (33) reliant les représentations des groupes finis simples de type de Lie aux représentations des groupes quantiques (34).

4.3 — Classification des groupes de Lie simples

Entre-temps, Cartan et Killing s'étaient attaqués au cas des groupes continus dits groupes de Lie (35), non nécessairement compacts, et avaient classifié les groupes de Lie réels et complexes simples G. La classification se ramène à celle d'objets purement algébriques appelés algèbres de Lie simples $Lie\ G$. C'est alors qu'un peu comme dans la théorie de Frobenius pour les groupes finis, mais de manière beaucoup plus sophistiquée, apparaît de la Géométrie euclidienne.

En fait, à toute algèbre de Lie complexe simple (36) (ou somme directe de telles) est associée un petit bijou de Géométrie euclidienne réelle appelé *système de racines*, qui consiste en un ensemble fini Φ de vecteurs qui engendrent l'espace et qui vérifient les 3 propriétés suivantes :

- pour tout $\alpha \in \Phi$, les seuls éléments de Φ proportionnels à α sont α et $-\alpha$,
- pour tout $\alpha \in \Phi$, Φ est stable par réflexion s_α par rapport à l'hyperplan perpendiculaire à α,
- pour tous $\alpha, \beta \in \Phi$, la projection orthogonale de β sur la droite menée par α est un multiple demi-entier de α.

Le groupe de Weyl est le groupe fini de symétries de Φ engendré par les réflexions s_α.

(32) pour un compte rendu vivant de cette aventure, voir M. Ronan, *Symmetry and the Monster : The story of one of the greatest quests of Mathematics*, Oxford 2006 — qui mène le lecteur jusqu'au fascinant « clair de lune » (« monstrous moonshine ») reliant les représentations du Monstre aux fonctions modulaires classiques en Théorie des nombres. Ce lien est né de la coïncidence entre 196883, dimension d'une représentation du monstre, et un coefficient de la fonction modulaire j de Klein (diminué de 1) — pas si fortuite, puisque qu'elle se répète pour d'autres représentations et d'autres coefficients ; pour rendre compte de cette bizarre numérologie, il a fallu inventer une toute nouvelle théorie (inspirée de la théorie des champs quantiques : algèbres vertex).

(33) Voir chap. X, 5 sur la signification et le rôle des conjectures en général.

(34) Il nous paraît dommage que les philosophes des Mathématiques se penchent si peu sur les problèmes de classification. Si les épistémologies d'inspiration platonicienne semblent à première vue « pré-adaptées » pour décrire cet aspect de la pensée mathématique — ce qui n'est pas si sûr : comment penser le « sporadique » ? —, quel éclairage pourraient apporter d'autres épistémologies ? — par exemple, des épistémologies de type « nominaliste » ou « cognitiviste » sur le Monstre ?

(35) *cf.* J. Stillwell, *Naive Lie theory*, Springer 2008.

(36) sic ! Complexe veut dire ici à coefficients dans le corps des nombres complexes, simple veut dire sans quotient non-trivial.

www.spartacus-idh.com © Spartacus-Idh 2021





Figure VI.1. – Systèmes de racines en dimension 2.

Il reste à classifier les systèmes de racines : c'est affaire de combinatoire et de Géométrie euclidienne élémentaire, quoique subtile. Ceux qui sont indécomposables (ce sont ceux qui correspondent effectivement à des algèbres de Lie simples) se laissent épingler, chacun, par un *diagramme de Dynkin*, dont voici la liste (on a pu dire que ces diagrammes de Dynkin sont des sortes de « lutins qui infestent les Mathématiques ») [37] :



En conclusion, il y a 4 familles infinies (A_n, B_n, C_n, D_n) d'algèbres de complexes simples (les groupes associés sont issus de la Géométrie euclidienne réelle ou complexe, ou de la Géométrie symplectique), plus 5 exceptionnelles $(E_6, E_7, E_8, F_4, G_2)$.

Le problème de la classification des représentations des groupes de Lie simples a été résolu par Weyl pour l'essentiel, qui a donné une formule fondamentale pour les caractères. Il y a une relation entre les représentations de chacun de ces groupes continus et les représentations du groupe de Weyl (fini) correspondant.

(37) leur signification est en gros la suivante : les sommets — ou petits cercles — figurent les racines simples, desquelles toutes les racines se déduisent par combinaison linéaire à coefficients tous positifs ou tous négatifs ; les arêtes figurent l'angle entre deux racines simples non perpendiculaires — simple arête si l'angle est de 120^0, etc.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

4.4 — Classification des représentations linéaires et indécidabilité

Reprenons la notion de représentation linéaire dans son acception générale. On s'est attaché ci-dessus au cas des groupes (abstraits ou topologiques), mais on peut représenter linéairement d'autres structures. La situation la plus générale, semble-t-il, est celle des carquois.

Les *carquois* sont des graphes (en général finis) dont les arêtes (qui peuvent être multiples) sont orientées.

Une *représentation linéaire* d'un carquois Q, c'est la donnée, pour tout sommet x de Q, d'un espace vectoriel V_x (disons de dimension finie pour fixer les idées), et pour toute arête a liant les sommets x et y d'une application linéaire F_a de V_x dans V_y.

Comme pour les représentations de groupes, il y a une notion naturelle de somme, et une représentation est dite indécomposable si elle ne se laisse pas décomposer (non trivialement) en somme.

L'étude des représentations linéaires des carquois, initiée par P. Gabriel, a résolu le problème de classification, en établissant la trichotomie suivante [38], où resurgissent, tels Scarbo, les diagrammes de Dynkin :
Tout carquois Q est de l'un des trois types suivants :

1. (fini) *Q n'a qu'un nombre fini de représentations indécomposables ; c'est le cas si et seulement si Q est un diagramme de Dynkin.*

2. (modéré) *Q a une infinité de représentations indécomposables classifiables algébriquement (en un sens précis que nous n'éluciderons pas ici) ; c'est le cas si et seulement si Q est un diagramme de Dynkin étendu* [39].

3. (sauvage) *Ni* **1** *ni* **2** *; la « théorie » des représentations de Q est alors indécidable.*

En fait, l'indécidabilité dans le cas **3** s'établit en codant le problème des mots (*cf.* § 2.3) dans la théorie des représentations de Q.

Voici un exemple concret (Gelfand-Ponomarev). Soit Q_n le carquois ayant n sommets $x_1, \dots, x_n$ liés par une arête orientée vers un sommet central x_0. La théorie des représentations de Q_n équivaut à celle des systèmes de n sous-espaces $V_1, \dots V_n$ d'un espace vectoriel V_0, considéré à isomorphisme près. Il s'avère que Q_n est

- de type **1** (fini) pour $n \leqslant 3$,
- de type **2** (modéré) pour $n = 4$,
- de type **3** (sauvage) pour $n > 4$: il est donc impossible de classifier, à isomorphisme près, les systèmes de 5 sous-espaces d'un espace vectoriel.

(38) Gabriel, Nazarova *et al.*, voir D. Benson, *Representations and cohomology I : basic representation theory of finite groups and associative algebras*, Cambridge studies in advanced mathematics 30 (1995), §4.4.

(39) obtenu par adjonction d'un sommet à un diagramme de Dynkin selon une règle simple que nous ne préciserons pas ici.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Singularités

« La singularité
est dangereuse en tout. »

Fénelon, *Lettre à l'Académie*.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

1 — Généricité, lissité, singularités [1]

1.1 — Notion de singularité

« Singulier » s'oppose à « générique », mais il n'y a pas de définition formelle générale de ces termes en Mathématiques. Le plus souvent, toutefois, l'adjectif « générique » est employé en Mathématiques dans le sens suivant. Étant donné une collection d'objets x formant un espace X (mesuré, topologique, ou algébrique...), on dit qu'une propriété $\mathcal{P}$ de ces objets est *générique* si elle est vraie « presque partout », c'est-à-dire pour « presque tout » objet x — le sens de « presque partout » variant suivant le contexte [2].

On qualifie parfois l'ensemble des x qui ne vérifient pas $\mathcal{P}$ de *lieu singulier* (eu égard à $\mathcal{P}$). En ce sens très général, « singularité » a donc valeur d' « exception », de « dégénérescence ». C'est par exemple le lieu où certaines fonctions ne sont pas « bien définies », où certaines quantités deviennent infinies, etc.

Toutefois, l'acception la plus courante de ce terme en Mathématiques, celle qui est en jeu dans la Théorie des singularités, concerne le cas où la propriété $\mathcal{P}$ est la *lissité*.

Rappelons qu'intuitivement, *lisse* veut dire « infiniment doux à la caresse » (*cf.* chap. VI, 1.2) ; formellement : indéfiniment différentiable.

On parle ainsi de fonctions et de variétés lisses ; une variété lisse est en tout point *infinitésimalement linéaire*, c'est-à-dire qu'elle s'identifie infinitésimalement à son espace tangent en chacun de ses points.

(1) leçon MaMuX du 15 mars 2008.

(2) dans le contexte mesuré, cela signifie « hors d'un ensemble de mesure nulle » (nous avons déjà rencontré cette acception au chapitre III.3.1) ; dans le contexte topologique, « dans un ouvert dense » ou plus généralement, « dans une intersection dénombrable d'ouverts denses » ; dans le contexte algébrique, « hors d'un sous-ensemble algébrique de dimension moindre que celle de X ».

Le cadre dans lequel la Théorie des singularités opère est celui d'objets géométriques ou de systèmes évolutifs qui sont *génériquement lisses* (3). C'est le cas des systèmes dynamiques de la science classique (optique, mécanique...) dont l'étude est à l'origine de la Théorie des singularités, et en fait de la plupart des modèles mathématiques des sciences de la nature.

Au sens mathématique strict, *une singularité est donc un « défaut de lissité », une « aspérité » ou une « crise », dans un contexte génériquement lisse*.

1.2 — Enjeux

Si le lisse est générique, si donc « la caresse rencontre presque partout de l'infiniment doux », pourquoi se préoccuper des singularités, ces « aspérités exceptionnelles » ?

Une première réponse est que (comme nous allons le voir au paragraphe suivant) les singularités apparaissent « spontanément » même dans des contextes *lisses a priori*, et on ne peut se contenter de les ignorer : la catégorie ayant comme objets les variétés lisses et comme morphismes les applications lisses s'avère vite trop « étroite » pour faire de la Géométrie.

En fait, les singularités et autres bifurcations (changements de régime), loin d'être des « impuretés » dont il faudrait se débarrasser, en disent souvent long sur les systèmes étudiés tout entiers, comme si ces derniers étaient *caractérisés par leurs « crises »*.

En fait, nous verrons plus loin qu'en plusieurs sens, les objets géométriques tendent à être conditionnés, voire caractérisés, par leurs singularités.

Par ailleurs, on remarque que dans le doublet générique/singulier, c'est le générique qui est surdéterminé par rapport au singulier — au sens où la lissité est une propriété spécifique d'un objet géométrique, qui s'exprime en termes du calcul différentiel. Le sens mathématique de ce doublet est donc bien différent du sens philosophique traditionnel.

En effet, les singularités apparaissent *a priori comme de purs négatifs* : carence de lissité, obstruction au principe de linéarisation. Mais la Théorie des singularités va opérer une sorte de renversement dialectique : elle va thématiser ces obstructions, en faire des objets mathématiques à part entière, les décrire, les classifier, etc. Dans ses listes, le point lisse ne figurera plus qu'en tant que « singularité triviale ».

L'aspect le plus remarquable de ce renversement est la description des singularités en termes d'objets combinatoires (par exemple des diagrammes de Dynkin) : au bout du compte, par un mouvement subtil et réversible, *on sera passé d'objets du monde continu à des objets du monde discret*.

Outre l'illustration de ces deux thèses, ce chapitre sera l'occasion de faire un peu de *phénoménologie des singularités : comment elles apparaissent, se déploient, et disparaissent (en laissant quelles traces ?)*

(3) cela exclut donc les objets fractals, même s'ils ont tendance à « rentrer par la petite porte » en Théorie des systèmes dynamiques...

www.spartacus-idh.com © Spartacus-Idh 2021

1.3 — Comment les singularités apparaissent

« Je n'existe que singulier
et comme à l'état naissant.
Ne comprends que ce que j'invente. »
(P. Valéry, *Œuvres*, I, p. 161)

Voici trois modes très communs d'apparition des singularités en Mathématiques.

• *Projections*. Illustrons ce mode en trois versions :

1. projection sur un plan d'une courbe lisse dans l'espace : on peut voir apparaître un croisement, ou un point de rebroussement.




Figure VII.1.

2. projection d'une surface lisse dans l'espace à 3 dimensions sur une surface (e.g. la rétine). Un observateur regarde des collines : les contours sont en général des courbes lisses (plis), mais peuvent apparaître des singularités (fronces...). Figuration des draperies en peinture (études de Dürer [4], Vinci...)

3. projection d'une surface lisse dans l'espace à 3 dimensions sur une droite : lignes de niveau




Figure VII.2.

• *Dégénérescences* : ajout de fibres « dégénérées » dans le processus de compactification d'une famille de variétés lisses. par exemple, si l'on veut compactifier la famille d'hyperboles $x_1x_2 = \lambda$, il faut ajouter les fibres correspondant à $\lambda = 0$ et $\lambda = \infty$. En $\lambda = 0$, il s'agit de deux droites ayant un point d'intersection, qui est donc une singularité.

• *Quotients*, repliements. Il ne s'agit pas ici des quotients « sauvages » qui mènent aux espaces non commutatifs. Des quotients très « modérés », comme celui du plan par un groupe fini de symétries, peuvent présenter des singularités, qui correspondent aux points fixes sous l'action du groupe (voir 5.3 ci-après).

(4) *Geometric libris*, 1532.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com




Figure VII.3.

2 — Points critiques

2.1 — Linéarisation des champs de vecteurs

Considérons une variété lisse M et un champ de vecteurs $\vec{v}$, c'est-à-dire la donnée, pour tout point x de M d'un vecteur tangent $\vec{v}(x)$ qui varie de manière continue et même lisse avec x. Un théorème classique affirme qu'au voisinage de tout point x où $\vec{v}(x)$ ne s'annule pas, le champ de vecteur est linéarisable, c'est-à-dire équivalent à un champ de vecteurs constant (en termes heuristiques : on peut peigner là où il n'y a pas d'épi !) :



Figure VII.4.

2.2 — Points critiques de fonctions

Considérons une fonction lisse f sur M. Un point ξ de M est dit *critique* pour f si la partie linéaire de $f - f(\xi)$ s'annule en ξ. Cela revient à dire que dans des coordonnées locales convenables $x_1, \ldots, x_n$ au voisinage du point ξ, le champ de vecteurs défini par les dérivées partielles $(\partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_n)$ s'annule en ξ [5]. L'image $f(\xi)$ par f d'un point critique ξ s'appelle *valeur critique* de f (ces valeurs sont exceptionnelles).




Figure VII.5.

(5) cette condition ne dépend pas en fait du choix des coordonnées locales, bien que le champ de vecteurs en dépende.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Le théorème de linéarisation précédent implique qu'au voisinage de tout point *non critique*, la fonction f *est équivalente à sa partie linéaire*.

Plus précisément, fixons une valeur ν de f et considérons la fibre $f^{-1}(\nu)$ de f au-dessus ν, c'est-à-dire l'ensemble des points ξ en lesquels f prend la valeur ν (si M représente la surface d'un ensemble de collines, et f est la fonction altitude, $f^{-1}(\nu)$ n'est autre que la *ligne de niveau* ν). Si ν n'est pas une valeur critique, alors en tout point ξ de la fibre $f^{-1}(\nu)$, il existe un système de coordonnées $x_1, \ldots, x_n$ dans lequel cette fibre est définie par l'équation linéaire $a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = \nu$; elle est donc lisse. On voit ainsi que les points critiques correspondent à des singularités, non de M ni de f (qui sont lisses), mais des fibres $f^{-1}(\nu)$ (lignes de niveau).

2.3 — Points critiques génériques

En un point critique ξ (où il n'est plus vrai qu'une fonction soit équivalente à sa partie linéaire), que peut-on dire ?

Il se trouve qu'il y a une hiérarchie de points critiques. En particulier, on peut définir la notion de point critique « générique ». Au voisinage d'un point *critique générique*, la fonction f *est équivalente à sa partie quadratique* : elle est en fait de la forme $f(x) \sim \nu + a_1x_1^2 + \ldots + a_nx_n^2$, les a_i étant non nuls, pour un choix convenable de coordonnées locales $x_1, \ldots, x_n$ (la constante ν étant la valeur de f au point ξ considéré).

L'indice d'un point critique générique est le nombre de a_i positifs. Par exemple, en dimension 2, on trouve trois types de points critiques génériques : le sommet ($f \sim \nu - x_1^2 - x_2^2$, d'indice 0), le col ($f \sim \nu + x_1^2 - x_2^2$, d'indice 1), le bassin ($f \sim \nu + x_1^2 + x_2^2$, d'indice 2).




Figure VII.6.

On montre que toute fonction lisse « générique » f est *de Morse*, c'est-à-dire n'admet que des points critiques génériques, et qu'il n'y a pas deux points critiques en lesquels f prend même valeur.

2.4 — Topographie et Théorie de Morse

L'idée, ancienne, vient de la topographie : représenter un relief, un paysage montagneux, par des lignes de niveaux. Sa mise en œuvre mathématique, ébauchée au XIX^e par le physicien Maxwell et l'avocat-mathématicien Cayley, a abouti au XX^e à la Théorie de Morse, qui montre que *la topologie d'une variété lisse compacte M peut être reconstruite, de manière combinatoire, à partir de l'étude des points critiques (singularités des fibres) d'une fonction auxiliaire f suffisamment générique.*

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Pour en saisir l'intuition, dans l'exemple du paysage montagneux, on peut se représenter que le relief est progressivement submergé par une crue, et essayer de se figurer la variation de la topologie de la partie immergée lors de la montée des eaux. Il est assez clair que celle-ci ne change pas lorsque le niveau n'est pas critique. Avec un certain effort d'attention, on peut se rendre compte que le franchissement d'un sommet revient, topologiquement, à attacher un point supplémentaire (0 – cellule), celui d'un col à attacher un segment (1 – cellule), celui d'un bassin à attacher un disque (2 – cellule).

Il s'agit d'un phénomène général, valable en toute dimension [6] : la partie au-dessus du niveau critique ν se construit, topologiquement, en attachant à la partie au-dessous du niveau ν une cellule de dimension égale à l'indice.

3 — Généricité et stabilité

3.1 — La dialectique générique/singulier selon Poincaré

En jetant les bases de la théorie qualitative des systèmes dynamiques, H. Poincaré a mis en lumière l'importance cruciale du générique dans ce domaine, et la subtilité de la dialectique générique/singulier (bien au-delà de la simple opposition logique) [7].

Dans la perpective des applications de l'étude des systèmes dynamiques aux sciences de la nature, il paraît raisonnable, dans un premier temps, de se limiter aux situations génériques : en effet, les paramètres du système ne sont connus qu'approximativement en pratique, et une modification arbitrairement petite des paramètres permet toujours de sa ramener au cas générique.

Toutefois, l'argument tombe en défaut lorsqu'il s'agit précisément d'analyser une famille de systèmes : on rencontre inévitablement, en général, un lieu de *bifurcation* Σ. Le principe de généricité doit être affiné de la manière suivante : s'il s'agit d'une famille à un paramètre de systèmes, on pourra, en pratique, se limiter aux bifurcations génériques (c'est-à-dire correspondant à presque tous les points de Σ). Plus généralement, on aura une stratification de Σ, les strates de codimension i correspondant aux systèmes à $i+1$ paramètres génériques.

Un programme de classification ambitieux consiste alors à chercher les *formes normales*, c'est-à-dire des équations les plus simples possibles, auxquelles se ramènent les systèmes à i paramètres (ou, si l'on veut, à i degrés de liberté).

3.2 — L'exemple des draperies

Les Mathématiques ont récemment achevé [8], sur le plan théorique, la tradition des études de Dürer et Vinci, en menant à bien la classification complète de toutes les singularités des draperies qui apparaissent lorsque l'observateur-peintre se déplace : il y en a 13.

(6) *cf.* J. Milnor, *Morse Theory*, Princeton 1963.

(7) pour les détails concernant ce paragraphe et les suivants, nous renvoyons à V. Arnold, *Catastroph theory*, Springer, 1984, et D. Bennequin, Caustique mystique, Séminaire Bourbaki 634 (1984).

(8) travaux successifs de Whitney, Arnold, Platonova, Sherback.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Le manteau M est vu comme surface lisse plongée dans l'espace usuel $\mathbb{R}^3$. L'observateur-peintre occupe une position ω (le point de vue) dans $\mathbb{R}^3$, et ce qu'il observe/peint est la projection de M sur un plan $\mathbb{R}^2$, suivant le point de vue ω. Voici la classification des singularités qui apparaissent, suivant le nombre de degrés de liberté qu'on accorde au point de vue.

• Pour un point de vue ω générique, il n'y a, d'après un théorème classique de Whitney, que deux singularités possibles (dépendant de la forme de M dans $\mathbb{R}^3$) : le *pli* et la *fronce*.




Figure VII.7.

Les formes normales de M correspondantes s'écrivent respectivement

$$x_3 = x_1^2, \quad x_3 = x_1^3 + x_1 x_2$$

(dans des coordonnées pour lesquelles la projection est donnée par élimination de la troisième coordonnée, de sorte que ω est considéré comme rejeté à l'infini).

• Pour des points de vue ω à un degré de liberté, s'introduisent trois nouvelles singularités (correspondant à des bifurcations génériques) : la *lèvre*, le *bec-à-bec* et le *passage du chameau*.




Figure VII.8.

Les formes normales de M s'écrivent respectivement

$$x_3 = x_1^3 + x_1 x_2^2, \quad x_3 = x_1^3 - x_1 x_2^2, \quad x_3 = x_1^4 + x_1 x_2.$$

• Pour des points de vue ω à deux degré de liberté, s'introduisent quatre nouvelles singularités (correspondant à des bifurcations de codimension 1). Les formes normales de M s'écrivent respectivement

$$x_3 = x_1^3 + x_1 x_2^3, \quad x_3 = x_1^4 + x_1 x_2 + x_1 x_2^2, \quad x_3 = x_1^5 + x_1^3 x_2 + x_1 x_2, \quad x_1^5 - x_1^3 x_2 + x_1 x_2.$$

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

• Enfin, si l'on tient compte de tous les points de vue possibles, s'introduisent encore quatre nouvelles singularités (correspondant à des bifurcations de codimension 2). Les formes normales de M s'écrivent respectivement

$$x_3 = x_1^3 + x_1x_2^4,\ \ x_3 = x_1^3 - x_1x_2^5,\ \ x_3 = x_1^4 + x_1^2x_2 + x_1x_3,\ \ x_1^5 + x_1x_2.$$

Le théorème de Whitney sur le pli et la fronce a été popularisé par les modélisations (plus ou moins fantaisistes) de la « Théorie des catastrophes appliquée ». Voici un exemple d'interprétation catastrophiste de la fronce [9]. Dans cet essai de « modélisation de la créativité », x_1 mesure l'enthousiasme, x_2 la force technique, x_3 la réussite (!). Sans grand enthousiasme, la réussite croît de façon monotone en fonction de la force technique ; mais si l'enthousiasme est grand, il peut y avoir un saut qualitatif dans la qualité des résultats à partir d'une certaine virtuosité (bifurcation entre maniaques et génies (!)).




Figure VII.9.

« Défiez-vous des ensorcellements
et des attraits diaboliques de la géométrie. »

Fénelon

3.3 — Singularités stables

Une singularité est dite *stable* si toute déformation suffisamment petite des conditions où elle apparaît donne lieu à une singularité « équivalente ».

Exemple : le croisement, comme singularité de projection de courbe, est stable ; en revanche, le point de rebroussement ne l'est pas.



Figure VII.10.

On peut alors se demander si toute singularité générique est stable.

La réponse dépend en fait de ce qu'on entend, ci-dessus, par « équivalente ». Dans le contexte purement topologique [10], la réponse est oui (théorème de Mather).

(9) E.C. Zeeman, *Catastroph theory*, selected papers 1972–77, Addison-Wesley, 1977.
(10) où « équivalente » est entendu comme « isomorphe en tant qu'espace topologique ».

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

4 — Déploiements et catastrophes

4.1 — Comment les singularités se déploient

Considérons à nouveau une fonction f sur une variété lisse de dimension d (par exemple sur une surface, pour fixer les idées) à valeurs réelles (ou complexes), et poursuivons l'étude des points critiques ξ (de valeur critique $f(\xi)=0$ pour fixer les idées), sans plus nous limiter au cas générique.

Plus précisément, penchons-nous sur les singularités isolées ξ de la fibre $f^{-1}(0)$ (l'hypersurface de M définie par $f(x)=0$).

Un *déploiement* de (f,ξ) est une déformation F de f à un ou plusieurs paramètres λ, qui s'annule en ξ (tout comme f). Autrement dit :

$$F(x,0)=f \text{ pour tout } x\in M,\quad F(\xi,\lambda)=0 \text{ pour tout } \lambda.$$

On montre qu'il existe un déploiement F dit *versel* [11], dont tous les autres se déduisent.

L'ensemble des λ pour lesquels la variété définie par $F(x,\lambda)=0$ est singulière (c'est-à-dire non lisse) s'appelle le *discriminant*.

Exemples.

• Le déploiement versel de $(f(x)=x^3,0)$ est $F(x)=x^3+\lambda x$. Le discriminant est $\lambda=0$.

• Le déploiement versel de $(x^4,0)$ est $x^4+\lambda_1x^2+\lambda_2x$. Le discriminant est une fronce.

• Le déploiement versel de $(x^5,0)$ est $x^5+\lambda_1x^3+\lambda_2x^2+\lambda_3x$. Le discriminant est une *queue d'aronde*




Figure VII.11.

4.2 — Singularités simples

Une singularité est dite *simple* si, par déformation suffisamment petite, elle n'« engendre » qu'un nombre fini de classes d'équivalence de singularités.

La classification complète des singularités simples du type précédent (singularités isolées d'hypersurfaces) est achevée, et fait intervenir — encore eux ! — les diagrammes de Dynkin (*cf.* chap. VI, 4.3). En fait, ces singularités correspondent exactement aux diagrammes de Dynkin sans arête double, c'est-à-dire les diagrammes de type A, D, E, la liste des formes normales étant la suivante (Arnold et al...) :

(11) pas tout-à-fait universel, il y a un petit grain de sel technique...

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

$$A_n : \ \circ - \circ - \cdots - \circ - \circ \quad \rightsquigarrow \quad f = x_1^{n+1} + \textstyle\sum_3^d x_i^2,$$

$$D_n : \ \circ - \circ - \cdots - \circ < \begin{matrix}\circ \\ \circ\end{matrix} \quad \rightsquigarrow \quad f = x_1^{n-1} + x_1 x_2^2 + \textstyle\sum_3^d x_i^2,$$

$$E_6 : \quad \begin{matrix} & & \circ & & \\ \circ - \circ - & & \circ & & - \circ - \circ \end{matrix} \quad \rightsquigarrow \quad f = x_1^3 + x_2^4 + \textstyle\sum_3^d x_i^2,$$

$$E_7 : \quad \begin{matrix} & & \circ & & \\ \circ - \circ - & & \circ & & - \circ - \circ - \circ \end{matrix} \quad \rightsquigarrow \quad f = x_1^3 + x_1 x_2^3 + \textstyle\sum_3^d x_i^2,$$

$$E_8 : \quad \begin{matrix} & & \circ & & \\ \circ - \circ - & & \circ & & - \circ - \circ - \circ - \circ \end{matrix} \quad \rightsquigarrow \quad f = x_1^3 + x_2^5 + \textstyle\sum_3^d x_i^2.$$

Le principe du codage par les diagrammes est le suivant : dans un déploiement versel, la singularité se transforme en un ensemble de cercles (dits *évanescents*) [12], chacun étant figuré par un sommet du diagramme ; une arête relie deux sommets quand les cercles associés se touchent.




Figure VII.12.

4.3 — Géométrie symplectique et catastrophes

De même que la Géométrie euclidienne est modelée sur l'espace euclidien, défini par un crochet $\langle\ ,\ \rangle$ symétrique (*i.e.* inchangé lorsque l'on permute les deux vecteurs), la Géométrie symplectique [13] est modelée sur l'espace symplectique, défini par un crochet $\langle\ ,\ \rangle$ antisymétrique : le signe change lorsque l'on permute les deux vecteurs.

Cette géométrie, qui est sous-jacente à la mécanique hamiltonienne, est aussi celle sous-jacente à la Théorie des catastrophes [14] développée par Thom et Arnold.

Il se trouve que les catastrophes sont classifiées, elles aussi, par les diagrammes de Dynkin de type A, D, E. L'explication est que cette classification se ramène à la précédente : les catastrophes ne sont autres que les singularités des discriminants des déploiements versels des singularités isolées simples d'hypersurfaces. Par exemple, en dimension $\leqslant 4$, on trouve les catastrophes élémentaires de Thom :

A_2 : le pli,
A_3 : la fronce,

(12) *Cf.* les petits films de C. Sorger, http:/www.math.sciences.univ-nantes.fr/~sorger/
(13) le terme est dû à Weyl.
(14) techniquement : les catastrophes associées aux applications lagrangiennes en Géométrie symplectique.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

A_4 : la queue d'aronde,
D_4 : l'ombilic (dont Thom distingue deux sous-espèces),
A_5 : le papillon,
D_5 : le champignon.

5 — Le contexte analytique (*i.e.* « plus-que-lisse »)

5.1 — Principe du prolongement analytique

Si le lisse est l'infiniment doux à la caresse, que peut bien être le plus-que-lisse ? Eh bien, c'est ce dont la forme est si harmonieuse que le toucher ou la contemplation d'un fragment permet de deviner la forme entière !

Par exemple, les *fonctions analytiques* sont celles qui sont non seulement développables en puissances de la variable x à un ordre arbitraire, mais qui sont en fait sommes de leur série de puissances : $f(x) = \sum_0^\infty a_n x^n$ (on parle de même de *variété analytique* M (réelle ou complexe), de fonction analytique f sur M, etc.).

Le *principe de prolongement analytique* [15] assure que si on étend un germe de fonction analytique sur M le long d'un chemin tracé sur M, ce prolongement ne change pas si on déforme le chemin, à extrémités fixées [16].

En revanche, le long de deux chemins non déformables l'un sur l'autre, on peut très bien aboutir à deux valeurs différentes de la fonction. On a déjà vu ces ambiguïtés galoisiennes au chapitre II.2.1 et au chapitre V.3.2.

5.2 — Comment les singularités disparaissent

On connaît deux moyens de faire disparaître les « aspérités » en Géométrie, qu'on pourrait comparer à la « lime » et à la « dynamite » respectivement.

On peut parfois « limer » les singularités par déploiement (c'est par exemple le cas des singularités simples isolées d'hypersurfaces). Les « traces » qu'elles laissent en se déployant sont ces cercles évanescents évoqués en 4.2 ci-dessus.

L'autre moyen, plus « brutal » mais qui marche toujours dans le cadre *analytique* en vertu d'un théorème fondamental de Hironaka (1964), est d'*éclater* les singularités.

L'exemple le plus simple d'éclatement est celui de l'origine O dans le plan : on remplace O par l'ensemble des droites passant par O (ensemble qui lui-même forme une droite projective, c'est-à-dire un cercle dans le cas réel), ce qui revient à faire le changement de variable $(x_1, x_2) \mapsto (x_1, x_2/x_1)$.

Partant d'une variété M ayant un lieu singulier Σ (qui peut être un point, ou une sous-variété de dimension quelconque), le procédé de désingularisation

(15) mis en forme par Weierstrass dans les années 1880.

(16) Thom voyait dans ce principe la source du caractère prédictif des théories physiques [17] : « Il existe en mathématique une seule procédure d'extrapolation canonique, le prolongement analytique. De fait c'est par prolongement analytique que l'on procède lorsque l'on fait des prédictions. Par conséquent, on parvient au résultat que les possibilités d'actions effectives dans le futur, face à une situation déterminée, sont toujours liées à la possibilité d'avoir une modlisation analytique des phénomènes. »

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

de Hironaka [18] consiste à éclater une sous-variété lisse soigneusement choisie de Σ, et à itérer autant de fois qu'il le faut pour aboutir à une variété lisse $\tilde{M}$. On peut même s'arranger pour que l'image inverse de Σ dans $\tilde{M}$ soit une réunion d'hypersurfaces [19] lisses H_i se coupant transversalement.




Figure VII.13.

Autrement dit, M s'obtient à partir de la variété analytique lisse $\tilde{M}$ par contraction des hypersurfaces H_i sur Σ. Hors de Σ et des H_i respectivement, M et $\tilde{M}$ coïncident. Les H_i sont en quelque sorte la « trace » que laisse le lieu singulier Σ en disparaissant par éclatement [20].

5.3 — Le rôle des « groupes platoniciens »

Soit G l'un des groupes finis suivants : le groupe cyclique des rotations d'un polygone à n côtés, le groupe diédral de toutes les symétries d'un tel polygone, l'un des trois groupes de symétries d'un solide platonicien (tétraèdre, cube/octaèdre, icosaèdre/dodécaèdre).

Le quotient du plan, fabriqué en identifiant des points au moyen de G, est singulier à l'origine (qui est un point fixe de G). Là encore, la singularité se code au moyen des diagrammes de Dynkin A, D, E :

A_n correspond aux groupes cycliques,
D_n aux groupes diédraux,
E_6 au groupe du tétraèdre,
E_7 au groupe du cube,
E_8 au groupe de l'icosaèdre.

Le principe de ce codage par les diagrammes est le suivant : dans une résolution par éclatements à la Hironaka, la singularité se transforme en un ensemble de droites projectives — c'est-à-dire de cercles dans le cas réel —, chacune étant figurée par un sommet du diagramme ; une arête relie deux sommets quand les cercles associés se touchent.

(18) dont la preuve a été progressivement considérablement simplifiée, voir J. Kollar, Lectures on Resolution of Singularities, 2007 ; le procédé a même été algorithmisé, voir http://www.risc.uni-linz.ac.at/projects/basic/adjoints/blowup/index.html

(19) c'est-à-dire de sous-variétés de dimension un de moins que la dimension de $\tilde{M}$.

(20) pour une résonance/*rai*sonance en musique de ces considérations sur l'indiscernabilité liée à la singularité et sa résolution, voir le chapitre sur le moment-faveur dans *Le Monde-Musique* de F. Nicolas, I. L'œuvre musicale et son écoute, Aedam Musicae 2015.

www.spartacus-idh.com © Spartacus-Idh 2021

Au bout du compte — après ce qui a été dit plus haut des discriminants de singularités isolées simples et des catastrophes en Géométrie symplectique —, on voit que *la classification des catastrophes en toute dimension se ramène à celle des groupes platoniciens*. Retour au *Timée* de Platon ? (21)

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

(21) « La première chose à expliquer ensuite, c'est la forme que chacun d'eux a reçue et la combinaison de nombres dont elle est issue. Je commencerai par la première espèce, qui est composée des éléments les plus petits. Elle a pour élément le triangle dont l'hypoténuse est deux fois plus longue que le plus petit côté. Si l'on accouple une paire de ces triangles par la diagonale et qu'on fasse trois fois cette opération, de manière que les diagonales et les petits côtés coïncident en un même point comme centre, ces triangles, qui sont au nombre de six, donnent naissance à un seul triangle, qui est équilatéral. Quatre de ces triangles équilatéraux réunis selon trois angles plans forment un seul angle solide, qui vient immédiatement après le plus obtus des angles plans. Si l'on compose quatre angles solides, on a la première forme de solide, qui a la propriété de diviser la sphère dans laquelle il est inscrit en parties égales et semblables. La seconde espèce est composée des mêmes triangles. Quand ils ont été combinés pour former huit triangles équilatéraux, ils composent un angle solide unique, fait de quatre angles plans. Quand on a construit six de ces angles solides, le deuxième corps se trouve achevé. Le troisième est formé de la combinaison de deux fois soixante triangles élémentaires, c'est-à-dire de douze angles solides, dont chacun est enclos par cinq triangles plans équilatéraux, et il y a vingt faces qui sont des triangles équilatéraux. Après avoir engendré ces solides, l'un des triangles élémentaires a été déchargé de sa fonction, et c'est le triangle isocèle qui a engendré la nature du quatrième corps. Groupés par quatre, avec leurs angles droits se rencontrant au centre, ces isocèles ont formé un quadrangle unique équilatéral. Six de ces quadrangles, en s'accolant, ont donné naissance à huit angles solides, composés chacun de trois angles plans droits, et la figure obtenue par cet assemblage est le cube, qui a pour faces six tétragones de côtés égaux. Il restait encore une cinquième combinaison. Le Démiurge s'en est servi pour achever le dessin de l'univers (54d-55d). »

© Spartacus-Idh 2021

Dualité I

« Both matter and radiation possess a remarkable duality of character,
as they sometimes exhibit the properties of waves,
at other times those of particles.
Now it is obvious that a thing cannot be a form of wave motion
and composed of particles at the same time
— the two concepts are too different. »
W. Heisenberg, *The physical principles of the quantum theory*.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

La dualité est présente depuis la nuit des temps dans la pensée humaine.

Elle a traversé toute la philosophie occidentale, de Platon à Descartes et au-delà, en se modifiant considérablement. Elle a hanté la physique : rappelons le rôle capital joué par la dualité onde-corpuscule, dont l'histoire s'étend de Huygens et Newton à Heisenberg et De Broglie.

Aussi est-il curieux de constater que la dualité ne fait son entrée que tardivement dans l'histoire des Mathématiques, aux alentours de 1820 (à propos de Géométrie projective). Cette idée fondamentale a peu à peu essaimé, sous divers avatars, dans toutes les branches des Mathématiques, tout en conservant son sens originel précis [1].

1 — Dualité linéaire

1.1 — Débuts et vicissitudes de la Géométrie projective

C'est dans le contexte de la Géométrie projective que la dualité apparaît en Mathématiques. Nous allons donc commencer par dire quelques mots de cette dernière.

On considère que son acte de naissance est le traité de 1822 du capitaine Poncelet intitulé « Traité des Propriétés Projectives des Figures ». Mais il s'inspire fortement de la Géométrie descriptive de ses maîtres Monge et L. Carnot [2].

(1) leçon MaMuX du 17 mai 2008.

(2) pour remonter davantage dans le temps, les transformations projectives et les points à l'infini avaient été étudiés et utilisés un siècle avant eux par Desargues dans sa théorie de la perspective centrale, qui eut le malheur de déplaire aux artistes, et tomba en oubli malgré le soutien de Descartes. Voir chap. I, 3.1.

L'histoire singulière de ces trois personnages mérite sans doute d'être très brièvement évoquée. Chacun d'eux fut non seulement géomètre, mais aussi ingénieur, administrateur et homme public (politique ou militaire).

Monge, jacobin puis bonapartiste, fut le cofondateur de l'École Normale et de l'École Polytechnique.

Carnot, montagnard modéré, général, créa les 14 armées de la République en 1793 ; proscrit en 1795 puis banni, il fut entre-temps élu à l'Académie et exclu l'année suivante pour céder son fauteuil (sur l'instigation de Monge !) à... Bonaparte, qui le rappela comme ministre de la guerre. Il fut réélu à l'Académie en 1800 et banni à nouveau, comme régicide, sous la restauration (qui exclut Monge à son tour de l'Académie).

Quant à Poncelet, lieutenant dans la campagne de Russie, il fut laissé pour mort sur le champ de Krasnoié en 1812. Transféré par marche forcée, à 300 lieues de là, dans les prisons de Saratov, il y reconstitua l'enseignement de Monge et Carnot, puis développa *ab ovo* la Géométrie projective, avant de rentrer en France en 1814, où il finit sa carrière comme général commandant Polytechnique. Connu pour son goût de la polémique (3), il réussit à se brouiller avec quasiment tous les contemporains notables qui s'intéressèrent à ses travaux : admirateurs et disciples (qu'il accusait de plagiat) comme adversaires.

La Géométrie projective avait pour objet d'étudier celles des propriétés des figures qui sont stables par projection (e.g. les propriétés d'incidence), dans l'espace « projectif » (espace complété par un plan à l'infini). L'enthousiasme qui habitait les disciples est palpable dans cette vigoureuse citation de Gergonne :

> Il ne s'agit pas moins que de commencer, pour la géométrie, mal connue depuis près de deux mille ans sans qu'on s'en occupe, une ère tout-à-fait nouvelle ; il s'agit d'en mettre tous les anciens traités à peu près au rebut, de leur substituer des traités d'une forme tout-à-fait différente, des traités vraiment philosophiques qui nous montrent enfin cette étendue, réceptacle universel de tout ce qui existe, sous sa véritable physionomie, que la mauvaise méthode d'enseignement adoptée jusqu'à ce jour ne nous avait pas permis de remarquer ; il s'agit, en un mot, d'opérer dans la science une révolution aussi impérieusement nécessaire qu'elle a été jusqu'ici peu prévue.
>
> Ce n'est précisément pas parce que la nouvelle doctrine promet une moisson plus abondante de théorèmes qu'elle mérite toute notre attention. Qu'importent, en effet, quelques théorèmes de plus qui demeureront peut-être éternellement sans applications ? [...] Mais, comme toutes les révolutions, celle qui se prépare dans la science de l'étendue, et que M. Poncelet regarde peut-être à tort comme étant presque achevée, doit compter pour adversaires, ou tout au moins pour spectateurs indifférents, tous ceux qui n'y auront pas coopéré.

Un peu plus loin :

> Ce qu'il y a de plus important et de plus éminemment philosophique dans ces recherches, c'est, ce nous semble, d'une part cette double face de la

(3) ce goût n'a pas disparu dans la profession, mais ses tenants omettent de rendre hommage au grand ancêtre !

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

> géométrie que son dernier mémoire a pour objet de mettre en évidence, et de l'autre la possibilité de démontrer, sans aucune sorte de calculs ni de constructions, la totalité peut-être des théorèmes qui ne dépendent ni des relations d'angles ni des relations de longueur.

Ce à quoi fait allusion Gergonne, c'est d'une part le principe de dualité (*cf.* ci-dessous), et d'autre part le « principe de continuité » [4] de Monge-Poncelet qui exprime que la déformation continue d'une configuration n'altère pas ses propriétés descriptives quitte à interpréter correctement les modifications survenues (par exemple une sécante devenant tangente, etc.).

Ce dernier principe, proche de la métaphysique de Leibniz (« la Nature ne procède pas par sauts »), fut sévèrement critiqué, notamment par Cauchy. À titre d'exemple, voyons comment on en dérive, en un tour de main, le théorème de Bézout selon lequel deux courbes dans le plan projectif, de degrés m et n, s'intersectent en mn points (comptés avec multiplicité) : on peut toujours faire dégénérer, par déformation, une courbe plane de degré m en une réunion de m droites en position générale, et dans ce cas le résultat devient évident.

La Géométrie projective (au sens de Poncelet et Gergonne) s'étiola vers le milieu du XIX^{e} siècle, en partie parce qu'elle ne faisait plus guère qu'accumuler des résultats sans portée générale, mais aussi parce que le principe de continuité de Poncelet était mathématiquement mal fondé (il dut attendre plus d'un siècle un fondement rigoureux et général).

Assez récemment, toutefois, on assiste à un regain d'intérêt en raison d'interactions insoupçonnées avec d'autres disciplines, comme

• la Physique théorique : les idées de la symétrie-miroir notamment ont permis de résoudre une série de problèmes réputés inaccessibles de Géométrie projective (énumérative).

• l'imagerie scientifique : plus précisément, la Photogrammétrie, où l'on se pose le problème de reconstituer une image 3D à partir de sections planes (photographies). Voir le projet zürichois d'application à la reconstruction des Bouddhas de Bamiyan dynamités par les Talibans [5].

1.2 — Dualité en Géométrie projective

L'histoire de la dualité en Mathématiques débute donc par la découverte commune de Gergonne et de Poncelet (source de leur polémique) [6].

Poncelet remarque d'abord la symétrie de certains énoncés (ou configurations) de Géométrie projective plane si l'on échange dans ces énoncés les mots « point » et « droite ».

Par exemple la configuration formée de trois points sur une droite admet comme duale la configuration formée de trois droites concourantes : les relations d'incidence sont inversées. Le tétraèdre est auto-dual, le dual d'un cube

(4) que Monge appelait « principe des relations contingentes ».

(5) http://www.photogrammetry.ethz.ch/research/bamiyan/pub/index.html

(6) voir J.D. Gergonne, Réflexion sur le précédent article. Annales de Gergonne, 17 (1826–1827), 272–276 (http://www.numdam.org). — Polémique mathématique. Réclamation de M. le capitaine Poncelet (extraite du bulletin universel des annonces et nouvelles scientifiques) ; avec des notes. Annales de Gergonne, 18 (1827–1828), p. 125 (http://www.numdam.org).

J.V. Poncelet, Traité des propriétés projectives des figures, 1822. http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/thumbnails.php?album=433

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

est un octaèdre, le dual d'un icosaèdre est un dodécaèdre. La duale de la duale est la configuration originale.

Poncelet déduit de là un principe général de dualité qui permet de démontrer automatiquement de nouveaux théorèmes à partir d'anciens.

Un peu plus tard, Chasles (7) proposera une autre variante, dynamique, de la dualité projective, qui échange translations et rotations autour d'un axe :

> Mais ne peut-on pas supposer, maintenant, que les deux mouvements inséparables des corps de l'Univers doivent donner lieu à des théories mathématiques, dans lesquelles ces deux mouvements joueraient identiquement le même rôle ? Et alors, le principe qui unirait ces deux théories, qui servirait à passer de l'une à l'autre, comme le théorème sur lequel nous avons basé la dualité géométrique de l'étendue au repos [...], pourrait jeter un grand jour sur les principes de la philosophie naturelle.
> Peut-on prévoir même où s'arrêteraient les conséquences d'un tel principe de dualité ? Après avoir lié deux à deux tous les phénomènes de la nature et les lois mathématiques qui les gouvernent, ce principe ne remonterait-il point aux causes même de ces phénomènes ?

Nous reviendrons sur cette mystérieuse dualité de Chasles à la fin du chapitre.

1.3 — Formes linéaires et dualité

Plutôt que la dualité projective, c'est la dualité linéaire, c'est-à-dire entre espaces vectoriels qui est désormais considérée comme fondamentale en Mathématiques.

Soit V un espace vectoriel (réel ou complexe). Son dual V^* est l'espace vectoriel formé des *formes linéaires* sur V, c'est-à-dire des fonctions linéaires (à valeurs réelles ou complexes selon le cas).

On a donc un accouplement de dualité entre V^* et V, qui à la forme linéaire $v^* \in V^*$ et au vecteur v associe le nombre (réel ou complexe)

$$< v^*, v > = v^*(v).$$

Cet accouplement permet, au rebours, de voir v comme un forme linéaire sur V^*, c'est-à-dire un élément du bidual V^{**}. Lorsque V est de dimension finie, ceci permet d'identifier V et son bidual V^{**}.

Dans le cas d'un espace euclidien V, on a déjà un produit scalaire $< , >$ sur V. Celui-ci permet d'identifier V avec son propre dual V^*.

Le lien avec le cas projectif est le suivant. Plutôt que de voir un espace projectif P de dimension n comme un espace usuel vectoriel complété à l'infini, on peut le voir comme l'espace des droites $P(V)$ d'un espace vectoriel de dimension $n+1$.

L'espace projectif dual P^* n'est autre que l'espace $P(V^*)$ attaché à l'espace vectoriel dual.

(7) *Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en Géométrie*, 1837, cité dans G. Châtelet, *Les enjeux du mobile*, Seuil, ch. 5.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2 — Dualités catégoriques

2.1 — Exemple primordial : espaces vectoriels de dimension finie

Voyons la dualité linéaire d'un point de vue catégorique : soit *Vec* la catégorie des espaces vectoriels (réels ou complexes, au choix) de dimension finie. La dualité transforme tout objet V de *Vec* en un autre V^*, et $V^{**} \overset{can}{\cong} V$. Mais on a plus : la dualité est un foncteur contravariant : elle transforme tout morphisme (c'est-à-dire toute application linéaire) $F : V \to W$ en un autre qui va dans l'autre sens $F^* : W^* \to V^*$, l'*adjoint de F*, et vis-à-vis de la composition, on a la formule

$$(GF)^* = F^*G^*.$$

Ceci amène à généraliser, et appeler *dualité* dans une catégorie quelconque toute auto-équivalence *contravariante* (elle renverse le sens des flèches) et *involutive* (on dit aussi : réflexive : en l'appliquant deux fois, on trouve l'identité).

2.2 — Autres exemples

• *Inversion dans un groupe* : tout groupe peut être vu comme catégorie à un seul objet, les éléments du groupe étant les (auto)morphismes de cet objet. L'inversion $g \mapsto g^{-1}$ est une dualité (au sens catégorique).

• *Ensembles ordonnés* : tout ensemble (partiellement) ordonné Δ peut être vu comme une catégorie (il y a une flèche — et une seule — entre x et y si et seulement si $x \leqslant y$). Une dualité est une involution de Δ qui inverse l'ordre.

Cas particulier : en Logique classique (et plus généralement dans un treillis de Boole), la négation est une dualité [8], qui échange « et » (l'inf) et « ou » (le sup) ; en Logique intuitionniste, ce n'est plus une dualité au sens précédent car l'involutivité est perdue.

Autre cas particulier : soit V un espace vectoriel de dimension finie, et soit $S \subset V$ un convexe (i.e contenant tout l'intervalle joignant deux quelconques de ses points) contenant 0. Son *polaire* $S^* \subset V^*$ est le convexe, contenant 0, formé des v^* tels que

$$< v^*, v > \leqslant 1$$

pour tout $v \in S$. On a $S^{**} = S$. La polarité échange réunion et intersection. Dans un espace euclidien (donc autodual), la polarité est donc une dualité sur l'ensemble ordonné par inclusion des convexes contenant 0.

2.3 — Produit tensoriel et dualité

Rappelons (chap. VI, 2.5) qu'il existe la notion de produit tensoriel $V \otimes W$ de deux espaces vectoriels (de dimension finie). Étant donné un troisième espace vectoriel U, on a alors un isomorphisme canonique

$$Hom(U \otimes V^*, W) \overset{can}{\cong} Hom(U, V \otimes W) :$$

(8) dualité de De Morgan, *Formal Logic : or, The calculus of inference, necessary and probable*, 1847.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

les foncteurs $- \otimes V^*$ et $V \otimes -$ sont adjoints (*cf.* chap. II, 5.3). La notion de dualité est donc subordonnée à celle de produit tensoriel.

En fait cela s'étend, dans le contexte de Tannaka (*cf.* chap. VI, 3.3), aux représentations de groupes compacts. Le $\otimes$ permet de retrouver le produit du groupe, et la dualité permet de retrouver l'inverse. (9)

3 — Dualités analytiques

3.1 — Dualité linéaire topologique

En dimension infinie, on n'a plus $V = V^{**}$: V est seulement un sous-espace de V^{**}. Par ailleurs, on l'a déjà vu (*cf.* chap. III, 2.4), l'Algèbre linéaire ne marche pas seule en dimension infinie, il faut y mettre de la topologie, par exemple au moyen de normes. Ainsi, si V est un espace vectoriel topologique (par exemple un espace de Hilbert), on définit son *dual* comme l'espace vectoriel des formes linéaires *continues* sur V. En ce sens, l'espace de Hilbert est auto-dual.

3.2 — Distributions

L'idée de base est la suivante : on part d'un espace de fonctions-test ϕ qui ne posent pas de problèmes (lisses et nulles hors d'un compact).

Alors toute fonction (mesurable (10)) f définit une forme linéaire sur cet espace :

$$< f, \phi >= \int f\phi \, dt.$$

Si f est lisse, on a

$$< \frac{df}{dt}, \phi >= - < f, \frac{d\phi}{dt} > .$$

Cela suggère de considérer, suivant L. Schwartz, toutes les formes linéaires (11) D (appelées *distributions*) sur l'espace de fonctions-test, et de *définir* la dérivée $\frac{dD}{dt}$ de D par la formule

$$< \frac{dD}{dt}, \phi >= - < D, \frac{d\phi}{dt} > .$$

Exemple : la distribution de Dirac δ, définie par $\delta(\phi) = \phi(0)$. C'est la dérivée de la fonction-marche d'escalier de Heaviside (qui vaut 0 pour $t < 0$, 1 pour $t > 0$). En fait, toute distribution est, localement, la dérivée itérée d'une fonction continue.

(9) *Note :* Parfois, on va même jusqu'à appeler « dualité » tout couple d'anti-équivalences adjointes entre deux catégories. Par exemple, la dualité de Gelfand entre algèbres stellaires commutatives et espaces compacts (*cf.* chap. III, 5.2).

(10) *cf.* chap. III, 3.1, en prenant pour $\mathfrak{B}$ la plus petite tribu contenant les ouverts et les parties de mesure nulle. Dans le cadre de ces leçons, il suffit de savoir que toutes les fonctions qu'on rencontre en pratique sont mesurables — en fait, on ne peut construire de fonction non mesurable sans invoquer l'axiome du choix non dénombrable.

(11) continues, par rapport à une topologie sur les fonctions-test qui tient compte de toutes les dérivées.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Ainsi *toute fonction, même non dérivable* (= *non différentiable*), *devient dérivable au sens des distributions*. En un sens, on évacue d'emblée, à l'aide de cette géniale idée de dualité, la question des singularités ! Mais il y a un prix à payer : il est très difficile de *multiplier* les distributions (et davantage encore de les diviser), ce qui rend délicat leur emploi dans les problèmes non-linéaires.

3.3 — Transformée de Fourier. Dualité onde-corpuscule

La transformée de Fourier d'une fonction f est la fonction $\hat{f}$ définie par

$$\hat{f}(\omega) = \int f(t)e^{-i\omega t}dt.$$

Plus f est concentrée, plus $\hat{f}$ est diffuse, et réciproquement.

La transformation de Fourier s'étend en un automorphisme de l'espace des distributions « tempérées » [12]. Elle a la vertu d'échanger dérivation et multiplication par $i\omega$.

La transformation de Fourier permet de passer d'une fonction des positions et du temps (q, t) à une fonction des impulsions et de la fréquence (p, ω). Ce que Heisenberg nous a appris à voir comme un changement de repère en mécanique quantique, associé à la dualité onde-particule.

La dualité onde-particule stipule que tous les objets du domaine quantique présentent simultanément des propriétés d'ondes et de particules, ces deux aspects ne pouvant adéquatement être pris isolément. L'origine de ce principe remonte à la concurrence entre la théorie ondulatoire de la lumière de Huygens et celle, corpusculaire, de Newton. Avec la théorie des ondes électromagnétiques de Maxwell, la théorie ondulatoire (qui rendait compte du phénomène de polarisation) sembla occulter sa concurrente, avant que les travaux d'Einstein, de Broglie, Heisenberg et d'autres n'imposent le principe de dualité. Les relations d'incertitude de Heisenberg limitent les points de vue en dualité.

3.4 — Transformée de Legendre. Mécanique lagrangienne et Mécanique hamiltonienne.

La dualité est aussi très importante dans les problèmes d'extrémaux et d'optimisation (en Mécanique, Économie mathématique, transport optimal [13], etc.). Elle apparaît souvent *via* la notion de transformée de Legendre.

Soit V un espace vectoriel réel (de dimension finie, ou un Hilbert, disons) et soit V^* son dual.

Soit $f : V \to \mathbb{R}$ une fonction convexe (c'est-à-dire majorée sur tout segment par la fonction affine qui prend les mêmes valeurs aux extrémités du segment). Sa transformée de Legendre $f^* : V^* \to \mathbb{R}$ est la fonction convexe définie par

$$f^*(v^*) = sup < v^*, v > -f(v),$$

où v^* désigne un élément quelconque de V^*. On a

$$f^{**} = f.$$

(12) variante des distributions obtenue en prenant pour fonctions-test les fonctions lisses rapidement décroissantes à l'infini.

(13) des remblais... une théorie initiée par Monge et actuellement très active.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

(On ignore ici les discontinuités). On a donc

$$< v^*, v > \leqslant \ f^*(v^*) + f(v),$$

c'est-à-dire la majoration d'un *produit* scalaire par la *somme* d'une fonction du premier argument et d'une fonction du second argument. On peut choisir la fonction convexe f arbitrairement, et tirer de là (et du fait que le minimum de $f - v^*$ est $-f^*(v^*)$) beaucoup d'inégalités fondamentales de l'Analyse (inégalités de Hölder, Minkowski, ...).

Voici un exemple en Mécanique rationnelle. En prenant pour V l'espace des vitesses $\dot{q}$, et pour V^* l'espace des impulsions p, la transformée de Legendre de $\frac{m\dot{q}^2}{2}$ est $\frac{p^2}{2m}$. C'est le cas particulier le plus élémentaire du fait que le passage du lagrangien $L(q, \dot{q}, t)$ à l'hamiltonien

$$H(p, q, t) = p\dot{q} - L(q, \dot{q}, t)$$

(avec $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$) est une transformée de Legendre (par rapport à $\dot{q}$). L'équation de Lagrange

$$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}) = \frac{\partial L}{\partial q}$$

est alors équivalente aux équations de W. Hamilton

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}, \ \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p},$$

où p et q sont les coordonnées usuelles de l'espace des phases (impulsions et positions), et où le point $\dot{()}$ désigne traditionnellement la dérivée temporelle.

4 — Dualités géométriques/homologiques

4.1 — Dualité de Poincaré

Les nombres de Betti b_i d'une variété M (compacte orientable) de dimension n sont définis en termes de « triangulations » (par exemple si M est la sphère, $b_0 = b_n = 1$, et les autres b_i sont nuls). La première manifestation de la dualité (1893) est que

$$b_i = b_{n-i}.$$

L'argument (d'abord troué, et corrigé à plusieurs reprises par Poincaré) exploite une sorte de dualité entre cellules, qui généralise la dualité de Poncelet-Gergonne entre polyèdres.

En termes de ces cellules, on définit en fait des espaces vectoriels d'*homologie* $H_i(M)$, dont la dimension est b_i. La dualité de Poincaré proprement dite est que

$$H_i(M) = (H_{n-i}(M))^*.$$

4.2 — Dualité de De Rham-Hodge

Soit ω une *i-forme différentielle* : une expression du type

$$\omega \ = \ \sum f_{j_1,\ldots,j_i} \cdot dx_{j_1} \wedge \ldots \wedge dx_{j_i}, \ \ j_1 < \ldots < j_i,$$

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

où les x_j sont des coordonnées locales sur M, et $f_{j_1,\dots,j_i}$ des fonctions sur M. On peut l'intégrer sur les i-cellules σ — c'est sa raison d'être —, d'où un accouplement

$$< \omega, \sigma > = \int_\sigma \omega.$$

On peut aussi définir le bord $d\omega$, qui est une $i+1$-forme différentielle, et démontrer la « formule de Stokes »

$$< d\omega, \sigma > = < \omega, \partial\sigma >$$

où $\partial\sigma$ est le bord de la cellule σ. *Le bord du bord est toujours nul* [14] : $dd\omega = 0$.

Supposons maintenant M muni d'une structure riemannienne : l'espace tangent en tout point est un espace euclidien de dimension n. À partir de la dualité entre i-plans et $(n-i)$-plans dans un tel espace, Hodge a introduit un *opérateur* $*$, involutif (au signe près), qui transforme i-formes différentielles en $(n-i)$-formes différentielles sur M. Cet opérateur de Hodge permet de définir d'abord le *cobord* $\partial\omega = *d*\omega$ (qui est une $(i-1)$-forme différentielle), puis les espaces vectoriels de *cohomologie* de De Rham-Hodge $H^i(M)$ formés des i-formes différentielles de bord et cobord nuls (formes dites *harmoniques*).

Le théorème de De Rham-Hodge affirme que l'intégration induit une dualité

$$H_i(M) = (H^i(M))^*$$

(la terminologie « homologie/cohomologie » et la notation par indice inférieur/supérieur indiquent d'ailleurs la dualité). En outre, traduite en terme de cohomologie de De Rham-Hodge, la dualité de Poincaré est induite par l'opérateur $*$ de Hodge. Ces dualités sont fonctorielles par rapport aux applications continues entre variétés.

L'intérêt à la fois théorique et pratique du théorème de De Rham-Hodge est la possibilité de calculer l'homologie indirectement en termes de formes différentielles, sujettes au calcul leibnizien. On retrouve ici le principe déjà vu au chapitre III.3.4 à propos d'espaces et de fonctions, et de la « dualité » entre point de vue géométrique et point de vue fonctionnel : le côté spatial se prête à l'intuition géométrique (mais on ne peut guère calculer directement sur les points ni sur les cellules), tandis que les fonctions tout comme les formes différentielles se prêtent au calcul et à la puissance opératoire de l'algèbre.

Ces dualités géométriques ont de nombreux avatars, mais nous préférons terminer par une application dans le contexte de l'électromagnétisme de Maxwell.

4.3 — Dualité de Maxwell

Maxwell a unifié en un ensemble d'équations l'électricité, le magnétisme et l'induction. Les équations de Maxwell pour les champs électrique E et magnétique B dans l'espace-temps (vide) $\mathbb{R}^4$ s'écrivent

$$\nabla \times B = \frac{\partial E}{\partial t},\ \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t},$$
$$\nabla . B = 0, \nabla . E = 0.$$

(14) Formule fondamentale de la topologie algébrique et de l'algèbre homologique, que Thom a commentée d'un point de vue éthologique dans le texte mentionné en chap. II, 1.3.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Elles sont donc invariante par $E \mapsto B$, $B \mapsto -E$. C'est l'exemple primordial de dualité en physique classique.

Dans le dernier chapitre de son livre *Les enjeux du mobile*, G. Châtelet restitue la longue quête de Faraday, Maxwell et Hamilton, à partir d'une intuition du philosophe Schelling, pour interpréter géométriquement la dualité électricité-magnétisme. Le symbole ∇ de Hamilton lui-même (que celui-ci introduisait *via* ses quaternions) en est dérivé.

En termes modernes, la dualité implicite dans les équations de Maxwell s'explicite comme une dualité mathématique de la façon suivante. Selon les idées des « théories de jauge (abéliennes) », les composantes de E et de B sont les 6 composantes [15] d'une 2-forme différentielle ω sur l'espace de Minkowski $(\mathbb{R}^4, ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 - c^2dt^2)$, qui s'avère être un bord, donc vérifier

$$d\omega = 0,$$

(ce qui traduit la 1ère et la 4ème équations de Maxwell), tandis que l'équation de jauge (Yang-Mills) s'écrit

$$\partial\omega = 0,$$

ou, ce qui revient au même,

$$d * \omega = 0$$

(ce qui traduit la 2ème et la 3ème équations de Maxwell, compte tenu de ce que l'action de l'opérateur $*$ de Hodge se traduit par $E \mapsto B$, $B \mapsto -E$).

Ce « tire-bouchon » qu'est *l'opérateur de Hodge en dimension* 4 *rend compte non seulement de la dualité de Maxwell, mais aussi de la dualité de Chasles* (*en dimension* 3), *qu'il unifie* : « la rotation est à la translation ce que le magnétisme est à l'électricité ».

C'est pour conserver cette symétrie en présence de charges et de courants que Dirac a fait l'hypothèse du monopôle magnétique, non encore détecté expérimentalement. Plus récemment, on s'est aperçu que la symétrie complète est récupérée dans le cadre d'une théorie de jauge à 4 supersymétries en dimension 4, qui échange courte et longue échelles (Sen, 1994), ce qui a mené aux *dualités étranges* qui hantent les théories de cordes d'aujourd'hui.

Sous des dehors très divers, toutes ces dualités sont au fond des variations sur le même thème, la dualité linéaire (deux espaces « se regardant en chiens de faïence, crocs apparents » $< \ >$).

(15) les composantes de E sont celles de ω en les $dx_i \wedge dt$, celles de B sont celles de ω en les $dx_i \wedge dx_j$.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Dualité II. Qu'est-ce que coagir ? Fondation et circularité

« ... principe général :
tout calcul relatif aux cogèbres
est trivial et incompréhensible. »
J.-P. Serre, *Gèbres*.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Voilà, de la part d'une grande figure des mathématiques contemporaines, un exergue peu prometteur !

C'est qu'en combinant deux types de relations fort claires — *action* et *dualité* — déjà rencontrées dans deux chapitres précédents, on aboutit à une troisième — *coaction* — nettement plus obscure. Que peut bien signifier coagir ?

La question nous mènera vers les questions de fondements. Un des axiomes de la théorie des ensembles orthodoxe est l'axiome de fondation, qui prétend éradiquer les apories du type « l'ensemble de tous les ensembles » en interdisant les chaînes descendantes infinies d'ensembles contenus les uns dans les autres. Le problème est qu'en éliminant les cercles vicieux, cet axiome élimine en même temps bien des « cercles vertueux » tout à fait pertinents dans plusieurs domaines, notamment en informatique théorique, où les boucles sont chose commune.

En 1983, M. Forti et F. Honsell ont proposé un axiome « d'antifondation » qui, bien qu'en contradiction avec l'axiome de fondation, élimine aussi bien les paradoxes tout en ouvrant un vaste espace à la circularité. Contradiction ?

Non : au bout du compte, réinterprétées en termes d'action et coaction, les théories orthodoxe et antiorthodoxe s'avèrent duales l'une de l'autre [1].

1 — Action et dualité

Comme nous l'avons déjà vu, ces deux universaux ont traversé l'histoire de la pensée depuis l'antiquité, et ont été questionnés tardivement par la mathématique, en une remarquable coïncidence spatio-temporelle : la décennie 1820 à Paris — dans les travaux de Galois et de Poncelet respectivement. Action et dualité sont peu à peu devenues deux concepts mathématiques extrêmement flexibles et féconds. Pour autant, ils sont restés l'un comme l'autre très proches du contenu intuitif dont ils dérivent, et cette proximité, qui facilite tant leur emploi, est l'une des clés de leur fortune.

(1) exposé au colloque « Relation/Objet » de l'ÉNS, 18 mai 2014 s'appuyant en partie sur des discussions avec L. Fiorot et F. Honsell.

1.1 — Action

L'action est l'une des dix catégories d'Aristote — *poien* : agir/produire. Catégorie toujours extraordinairement valorisée depuis (*cf.* « Am Anfang war die Tat » de Goethe), notamment sous sa forme éthique, l'action humaine. Pour autant, contrairement à bien d'autres catégories d'Aristote — grandeur, forme, lieu, mouvement — déjà investies par les mathématiques depuis très longtemps, ce n'est qu'à la fin des années 1820 qu'un concept mathématique d'action s'est fait jour, avec les travaux de Galois.

Non pas l'action d'un géomètre traçant une figure, mais bien celle d'un objet mathématique sur un autre. Ceci est schématisé par le diagramme suivant (dans le cas de l'action d'un groupe G de transformations sur un ensemble X) :

$$G \times X \to X, \quad (g, x) \mapsto g(x)$$

ou bien $A \otimes V \to V$ dans le cas linéaire : action d'une algèbre A sur un module V ; $g(x)$ désignant le résultat de l'action de $g \in G$ sur l'élément $x \in X$. On impose la compatibilité entre composition des transformations et composition des actions :

$$gf(x) = (gf)(x),$$

formule qui est la raison de cette notation qui inverse l'ordre des transformations — gf pour : f d'abord, g après...

Après, mais *combien de temps après ?* demandait M. Kontsevich ! C'est qu'il y a en effet toujours un « temps sous-jacent » de l'action, souvent non explicité (ne serait-ce que la séquence imposée par l'ordre des opérations, même quand cet ordre n'importe pas). Déjà Aristote, qui analyse « l'être dans le temps » dans le livre 4 de sa Physique, y situe l'action — sans qu'il soit bien clair au demeurant si c'est par accident ou par essence.

Quoi qu'il en soit, ce temps de l'action est en partie élucidé par la théorie moderne de la complexité, qui en calcule la durée en fonction de la complexité des opérations élémentaires, et qui, au-delà des visées pratiques, pose des questions théoriques d'envergure, comme le fameux problème $P = NP$ (hors du champ de cet exposé, mais voir le chapitre X.2).

Mais outre un temps sous-jacent, une action requiert un arrière-plan, des situations ; tout un théâtre, le théâtre des opérations, qui lui donne sens...

Examinons ce qu'il en est du théâtre galoisien. Les situations initiales sont des situations d'ambiguïté — d'ailleurs Galois appelait son œuvre la « théorie de l'ambiguïté ». Son geste inaugural consiste à poser que les ambiguïtés ne constituent pas des nuisances, elles constituent un groupe ! (concept qu'il introduit à cette occasion). Dans les situations galoisiennes, l'ambiguïté comme lacune de la connaissance vient de la symétrie du système (en l'occurrence symétries entre les racines d'une équation) — Galois passe de la symétrie inerte entre racines d'une équation, qu'il brise pas à pas, à des symétries actives : certaines substitutions de ces racines. Le groupe de Galois formé de ces symétries agit sur les racines par définition, mais aussi bien sur toute expression algébrique en les racines. Le ressort de ce théâtre, la tension qui l'anime, consiste alors en la correspondance (en fait une dualité) entre symétries (actives) et expressions invariantes. Je dis tension car cette correspondance

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

n'est pas neutre, les deux membres ne jouent pas le même rôle, et l'intrigue tire toujours parti de la connaissance qu'on a de la structure des groupes, pour la transférer via leur action, aux expressions algébriques.

Ce principe de correspondance entre symétries et invariants va beaucoup plus loin, comme Galois lui-même l'avait pressenti. De fait, comme l'a proposé F. Klein dans son programme d'Erlangen, le théâtre galoisien permet de comprendre et classifier les géométries. Le point de vue que promeut Klein est que c'est le groupe sous-jacent qui fonde une géométrie, car c'est lui qui permet la définition même de l'identité des figures. Qu'il apparaisse encore, en second lieu, comme groupe de symétries des figures est le reflet du principe de correspondance galoisienne.

Cette correspondance entre symétries et invariants est aussi l'essence des théorèmes fondamentaux d'E. Noether en physique mathématique : équivalence entre lois de conservation et symétries (infinitésimales) de l'intégrale d'action.

1.2 — Dualité

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la dualité, présente depuis la nuit des temps dans la pensée humaine, ne fait son entrée que tardivement dans l'histoire des Mathématiques, aux alentours de 1820 dans les travaux de Poncelet sur la Géométrie projective. Poncelet remarque d'abord la symétrie de certains énoncés (ou configurations) de Géométrie projective plane si l'on échange dans ces énoncés les mots point et droite.

Cette idée de dualité n'a cessé de se développer dans toutes les mathématiques, en se raffinant. En fait, on a peu à peu distingué entre dualité entre objets, et dualité entre notions.

C'est la théorie des catégories qui rend compte de la manière la plus simple et élégante de cette dernière, grâce à la notion de catégorie duale : mêmes objets, toutes flèches renversées. Cette vue toute simple recèle pourtant des surprises ; en voici une : on apprend dès l'école élémentaire à représenter une fonction $X \to Y$ par son graphe (un sous-ensemble du produit $X \times Y$), selon la vieille technique des abaques ; on n'apprend pas à la représenter, ce qu'on peut peut aussi bien, par son cographe (un quotient de la somme disjointe $X \coprod Y$) (cette représentation est celle des livres de comptes à deux colonnes — crédit et débit, se compensant l'une l'autre —, popularisée par Pacioli vers 1500).

2 — Coaction

Après plus d'un siècle d'appropriation progressive de ces deux universaux par la mathématique, est apparue leur combinaison : on peut dualiser la notion d'action, ce qui donne la notion de *coaction*. Les tout premiers exemples sont ceux de fonctions sur un groupe et d'homologie d'un espace, dont l'importance justifie déjà de creuser cette notion, et de se familiariser avec l'étrange type de calculs qu'elle suscite. Étrange car, contrairement aux cas des actions où l'intuition accompagne la main à chaque étape du calcul, dans le cas des coactions, on a subitement l'impression de faire ces calculs aveuglément, guidé par des automatismes qui s'apprennent, dénués de tout guide heuristique — trouble dont témoigne la citation de Serre en exergue.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2.1 — Ce que c'est

Si l'on part de l'action d'une algèbre A sur un espace vectoriel V, pour fixer les idées, ce qui est représenté par le diagramme

$$A \otimes V \to V,\ a \otimes v \mapsto a(v),$$

l'interprétation est transparente : A agit sur V, chacun de ses éléments a agit sur chaque point v de V, le produit de la transformation étant noté $a(v)$; le symbole $\otimes$ est là pour rappeler certaines compatibilités avec l'addition et la multiplication.

La multiplication qui donne la structure d'algèbre de A n'est autre qu'une action de A sur elle-même :

$$A \otimes A \xrightarrow{\mu} A,\ a \otimes b \mapsto ab.$$

Si l'on dualise cette notion d'action d'une algèbre, au sens catégorique où le sens des flèches est inversé, on trouve le diagramme

$$V \to C \otimes V,\ v \mapsto \sum c_i \otimes v_i,$$

où C est une *cogèbre* (duale d'une algèbre) :

$$C \xrightarrow{\Delta} C \otimes C,\ c \mapsto \sum c_i \otimes c_j.$$

A titre d'exemple de cogèbre, rappelons que la Topologie algébrique associe à certains bons espaces X (comme les variétés compactes) des groupes d'homologie $H_*(X)$ de manière fonctorielle (*cf.* chap. VIII, 4.1). La diagonale $X \to X \times X$ induit alors une structure de cogèbre sur $H_*(X)$. Par extension, dans le cas général, on peut penser à Δ comme à une sorte de *diagonale*.

Mais qu'est-ce que ce diagramme de coaction peut bien vouloir dire ?

Il n'y a plus ni agent ni patient identifiable.

C'est ce défaut de contenu intuitif qui donne au mathématicien la fâcheuse impression de faire les calculs sans comprendre... Certes, on peut utiliser la dualité linéaire (dualité entre objets), qui transforme toute coaction en une action, mais ce n'est pas satisfaisant (d'autant que cette dualité n'est réversible que dans le cas de dimension finie) [2].

Coagir ne peut signifier *réagir*, qui est de l'ordre de l'agir (contre), ni *agir ensemble*, même si l'expression $\sum c_i \otimes v_i$ ou $\int c_t \otimes v_t dt$ peut faire penser à quelque chose comme une *intégrale de destins*. Cela ne peut non plus signifier *pâtir* (qu'Aristote met dans une autre catégorie), qui reste cependant du domaine de l'agir, l'agent fût-il inconnu.

(2) peut-être la familiarité avec les actions a-t-elle à voir avec l'importance donnée à l'école élémentaire aux tables de multiplication, et l'embarras vis-à-vis des coactions avec le manque d'usage des factorisations : en effet, lister toutes les possibilités de factorisations d'un nombre entier (et présenter la liste sous forme de somme formelle) définit une coaction, certes élémentaire dans sa formulation, mais éminemment non-élémentaire dans sa pratique — une partie de la cryptographie repose sur cette difficulté intrinsèque. Les combinatoriciens, dans la mouvance de G.-C. Rota sont sans doute ceux qui se tirent le mieux, et même avec virtuosité, de cet embarras vis-à-vis des coactions.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2.2 — F-cogèbres

Pour mener cette quête de sens, il faut dépasser les considérations formelles et prendre en compte les situations dans lesquelles apparaissent les coactions, en physique mathématique ou en informatique théorique par exemple.

C'est cette dernière qui a généralisé le plus radicalement la notion d'algèbre, au point d'englober aussi l'action dans le concept élargi : un endofoncteur $F : \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ étant donné (le cas classique correspond au carré tensoriel), une F-algèbre est un morphisme $FA \to A$.

La notion, active, d'algèbre $FA \to A$ est pensée comme ensemble de données. Le formalisme actif des F-algèbres permet de rendre compte de manière constructive des *processus*.

Exemple : création des entiers naturels : $F : Ens \to Ens,\ X \mapsto X \coprod \{*\}$, $\mathbb{N}$ est une F-algèbre via (successeur, 0). Il ne s'agit pas d'une n-ième construction arbitraire des entiers, mais de la perspective théorique la plus avancée sans doute sur le processus de production des entiers dans nos ordinateurs.

La notion duale, coactive, de F-cogèbre $C \mapsto FC$, intervient dans une tout autre approche, inspirée par la physique statistique, la mécanique quantique et la théorie de l'information, et basée sur la notion d'*états* d'un système. Ces états eux-mêmes ne sont pas directement accessibles (ils peuvent être infinis, ou cachés), mais leurs fluctuations le sont. Le formalisme coactif des F-cogèbres permet de rendre compte de manière constructive de ces changements d'états.

En filant la métaphore théâtrale, introduite ci-dessus à propos de Galois, on pourrait rapprocher le contexte des processus, où opèrent les notions algébriques, du théâtre classique où un petit nombre de protagonistes mènent l'action dans un champ spatio-temporel circonscrit. Le contexte où opèrent les notions cogébriques serait analogue, quant à lui, à ces opéras où le protagoniste est un peuple, et où de scène en scène, les changements d'états sont marqués d'intégrales de destins. On pourrait aussi parler de *diagonale de situation* (3).

3 — Circularité

3.1 — Cercles vicieux et vertueux

Ces notions coactives, dans le cadre d'une approche par états d'un système, sont particulièrement pertinentes lorsqu'entrent en jeu de manière essentielle des boucles. Au demeurant, une coaction requiert, tout comme une action, un temps ; le contexte informatique suggère que ce n'est pas le temps usuel des processus, mais un temps qui permet les allers-retours, les boucles.

Ces notions coactives sont en fait capables de prendre en compte et de rendre compte des phénomènes de circularité.

Comme pour la dualité, on peut distinguer la circularité des objets et celle des définitions, les deux sont liées et ont très mauvaise presse dans la tradition mathématique. Les définitions circulaires sont bannies de la saine logique.

(3) En fait, on trouve souvent ces deux notions combinées dans celle de bigèbre, telle que celle des fonctions sur un groupe.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

De même, les ensembles qui sont éléments d'eux-mêmes sont bannis de la théorie orthodoxe des ensembles pour éviter les paradoxes ; plus généralement, l'axiome de fondation interdit à un ensemble de contenir une chaîne infinie dont chaque maillon est un élément du précédent.

[Une image qui fait comprendre ce qu'on veut éliminer est celle de la préformation : dans la querelle à propos de la reproduction animale, au XVIII^{e} s., entre préformation et épigenèse, la première soutenait que tout animal (ou au moins d'un des deux sexes) avait en lui toutes les générations futures potentielles contenues les unes dans les autres en gigogne infinie...]

Pourtant les circularités se rencontrent fréquemment en informatique théorique — ailleurs aussi : invariance d'échelle etc — et tous ces cercles ne sont pas vicieux, tant s'en faut.

Il revient à M. Forti et F. Honsell, puis à P. Aczel, d'avoir bâti une théorie coactive de la circularité vertueuse, ainsi que la théorie des ensembles non orthodoxe qui la sous-tend.

3.2 — L'axiome d'antifondation

Dans la théorie orthodoxe des ensembles, l'axiome de fondation de Zermelo (4) interdit tout régression à l'infini de la relation d'appartenance. Il interdit d'emblée toute circularité, vicieuse ou non.

Dans la théorie non-orthodoxe, cet axiome est remplacé par l'axiome d'antifondation. Heuristiquement, cet axiome affirme que toute équation d'ensembles admet une et une seule solution. Par exemple, il y a un et un seul ensemble Ω tel que $\Omega = \{\Omega\}$ (le type même d'ensemble exclu par l'axiome de fondation).

La formulation précise fait intervenir les *carquois* (alias graphes orientés, *cf.* chap. VI, 4.4) ; rappelons qu'un carquois est juste une collection de sommets et de flèches qui les relient (5). *Décorer* un carquois, c'est munir chaque sommet v d'un ensemble Ω_v qui soit égal à l'ensemble des décorations Ω_w des descendants immédiats w du sommet v.

L'axiome d'antifondation s'énonce :

tout carquois (fini ou non) est décorable d'une seule façon.

Par exemple, dans le cas du carquois formé d'une boucle sur un seul sommet v, on trouve $\Omega_v = \{\Omega_v\}$.

Il se trouve que cet axiome d'antifondation, violemment incompatible avec l'axiome de fondation (6), parvient tout aussi bien à interdire les paradoxes de la circularité, et à éviter la béance. C'est un axiome d'existence et d'unicité : axiome d'existence qui émancipe l'existence ensembliste usuelle, ouvrant la porte à tout un monde de circularités vertueuses ; axiome d'unicité qui barre la route à l'arbitraire et aux apories.

(4) qui avait découvert indépendamment de Russell — et peut-être avant lui — les paradoxes de la théorie naïve des ensembles, et correspondait à ce propos avec Hilbert et Husserl.

(5) c'est bien moins qu'un diagramme : ainsi, il n'y a aucun sens à parler d'un graphe commutatif ; le diagramme suppose qu'il y ait sens à composer des flèches (ce qui est par exemple le cas lorsque les flèches sont des morphismes d'une catégorie).

(6) plus précisément, leur domaine de compatibilité se réduit au cas des carquois arborescents et sans descendance infinie, les décorations de tels carquois correspondant alors aux ensembles orthodoxes.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

3.3 — Action et coaction : fondation et antifondation

Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec les coactions et les cogèbres ? Voici.

Soit P l'endofoncteur de la catégorie des ensembles *Ens* qui associe à un ensemble l'ensemble de ses parties. A ceci près que *Ens* n'est pas un ensemble, l'axiome de fondation revient à postuler que *Ens* est une *P-algèbre initiale* (au sens de la théorie des catégories).

L'axiome d'antifondation revient en revanche à postuler que *Ens* est une *P-cogèbre finale*.

Il y a donc une dualité à l'œuvre entre les deux théories, a priori antagonistes (on pourrait parler de cofondation plutôt que d'antifondation). On sait d'ailleurs construire un modèle de l'une dans l'autre ; de sorte que la consistance de l'une équivaut à celle de l'autre ; situation analogue à celle de la résolution du conflit, au XIX^{e} s., entre géométrie euclidienne et géométrie non-euclidienne.

3.4 — Perspectives philosophiques

Revenons au concept philosophique d'action et plus particulièrement de l'action humaine fugacement évoquée. Depuis la question frappante de Wittgenstein : « que reste-t-il du fait que je lève le bras si on soustrait le fait que mon bras se lève ? », il est possible qu'une part de la philosophie de l'action se soit ensablée dans une « sempiternelle ratiocination sur les statuts » (causalisme/non-causalisme...) [7]. N'y aurait-il pas lieu de puiser dans la théorie esquissée ci-dessus des figures de pensée pour une philosophie de la coaction ?

Au demeurant, c'est plutôt du côté de la philosophie de l'événement d'A. Badiou que les vues ensemblistes non-orthodoxes semblent être les plus pertinentes. Son ouvrage « L'être et l'événement » [8] énonce la thèse radicale que depuis l'origine, c'est la mathématique et elle seule qui déploie la pensée de l'être en tant qu'être ; plus spécifiquement, depuis Cantor, la théorie des ensembles — réinterprétée par le philosophe. Au fil de méditations construisant/sondant le concept d'événement, apparaît l'idée qu'il s'agirait d'un site excédant cette ontologie (mathématique), du fait de « l'appartenance du signifiant de l'événement à sa signification ». Tout événement est ontologiquement formalisé par l'un de ces ensembles proscrits par l'axiome de fondation, lequel « ruine toute possibilité de nommer un être-multiple de l'événement ». Badiou conclut que « de l'événement, l'ontologie n'a rien à dire » (chap. 18), et développera plus tard une Logique de l'apparaître, largement inspirée de la logique toposique (*cf.* chap. II, 6), qui puisse en rendre compte.

Toutefois, dans le chapitre 20 sur « l'intervention, ce par quoi un multiple est reconnu comme événement », il souligne que la récurrence événementielle est ce qui la fonde, que son « essentielle historicité ne renvoie pas au temps comme à un milieu mesurable » mais prend « appui sur la circulation, déjà décidée, d'un multiple événementiel », et qu'elle est une « diagonale de la situation ».

(7) parallèle à cette sempiternelle ratiocination sur le statut des objets mathématiques que G. Châtelet reprochait à certaine épistémologie.

(8) Seuil, 1988.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Voilà qui consonne étrangement avec ce qui a été dit plus haut à propos de la coaction et sa temporalité, et de la circularité. Vu que la théorie non-orthodoxe des ensembles (avec l'axiome d'antifondation, à peu près contemporain de la rédaction de « L'être et l'événement ») est en dualité avec la théorie orthodoxe, et qu'en outre ces deux théories incompatibles se reflètent/modèlent l'une en l'autre nonobstant (tout comme la géométrie euclidienne et la géométrie non-euclidienne), n'y aurait-il pas lieu de considérer la théorie ensembliste non-orthodoxe comme un avatar de l'ontologie (mathématique), qui rendrait compte de l'événement ?

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

S'orienter dans la pensée mathématique

Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, pour un mathématicien ?

Du mystère à la théorie, de la recherche des questions fécondes à la formulation et à la démonstration des théorèmes, quelles boussoles pour le guider ? (1)

En effleurant ces questions profondes de l'intellectualité mathématique (2), nous nous efforcerons surtout de mettre en lumière le rôle singulier qu'y joue *l'art des conjectures*. Hétérogènes à l'appareil déductif du discours mathématique, les conjectures ont un statut heuristique transitoire et semblent suspendues à leur mystérieux pouvoir d'énonciation ; telles des phares, elles pointent une cible sans indiquer le chemin qui y mène.

Avant d'aborder notre thème proprement dit, il va nous falloir déblayer un peu le terrain, en tentant de récuser deux des préjugés les plus courants sur les Mathématiques.

1 — L'arbuste

Le premier préjugé que nous avons en vue a trait à l'*architecture* des Mathématiques. Nous l'épinglerons par l'image de « l'arbuste des mathématiques ». En référence, bien sûr, à la célèbre image cartésienne de l'arbre de la philosophie

> Ainsi toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à trois principales : à savoir la médecine, la mécanique et la morale ; j'entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. (*Principes de la Philosophie*).

Et les mathématiques, dans cette image cartésienne ? Elles sont la sève de l'arbre.

L'arbuste des mathématiques, lui, aurait pour racines la Logique, pour tronc la Théorie des ensembles, et pour branches l'Algèbre, l'Analyse, la Géométrie.

Nous voudrions soulever quatre objections contre cette image.

1. Cette image rend compte de manière totalement faussée de l'état des lieux, en paraissant donner un rôle central et nourricier à la Logique et à la Théorie des ensembles. En réalité :

(1) cet épilogue est la version abrégée d'un article intitulé « Le problème de l'orientation dans la pensée mathématique et l'art des conjectures », parue chez Delatour (2012), issu d'un exposé au séminaire MaMuPhi de l'IRCAM/ÉNS, 10 décembre 2005.

(2) en nous limitant aux Mathématiques dites pures — donc en laissant de côté tout ce qui touche aux applications.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

i) ces deux disciplines occupent une place à la fois marginale et relativement congrue dans le paysage mathématique (ce qui n'ôte rien à leur intérêt propre) ;

ii) loin d'entretenir un rapport nourricier avec la « grande composante connexe » des Mathématiques (Algèbre, Théorie des nombres, Géométrie algébrique et différentielle, Topologie algébrique et différentielle, les grands domaines de l'Analyse linéaire et non-linéaire, etc.), elles en sont presque disconnectées (*cf.* chap. I, 2.5) ;

Si l'on tenait à l'image de l'arbuste, il faudrait du moins convenir que la fascinante unité des Mathématiques n'est pas fondée sur une racine ou un tronc, mais sur la circulation d'une mystérieuse sève entre les nombreux rameaux qui forment la « grande composante connexe ».

2. Contre le *réductionnisme* qui accompagne cette image : ce réductionnisme, qui opère en deux mouvements, est surtout le fait d'un certain courant d'épistémologie bien implanté ; nous appellerons ses adeptes les « épistémologues courants » (en empruntant le mot à A. Badiou).

Le premier mouvement de réduction est l'*élagage de l'arbuste* : ces « épistémologues courants », tout préoccupés de fondements, se figurent que pour penser les Mathématiques, il suffit, si celles-ci reposent sur la Logique et la Théorie des ensembles, de ne retenir que ces dernières en ignorant tout le reste. Ce « reste » ne serait qu'épiphénomènes laissés aux techniciens.
Une fois ce sciage de branches effectué, ils sont alors aussi bien placés pour parler des fondements des Mathématiques que le serait un sourd n'ayant jamais ouvert une partition, mais possédant son solfège, pour parler des fondements de la musique !

Or voici, après l'élagage, le second mouvement de réduction, le *rabougrissement de l'arbuste* : pour « améliorer » encore leur point de vue, nos « épistémologues courants » se sont avisés qu'on ne comprend jamais si bien un domaine de la pensée qu'à travers ses crises. Dès lors, ils focalisent toute leur attention sur la petite trentaine d'années dite de « la crise des fondements », au début du siècle dernier.
À les lire, on a souvent l'impression que les Mathématiques furent pendant une génération entière comme frappées de tétraplégie, jusqu'à ce que l'organe central, la Logique, eût enfin réparé les ravages causés par le traumatisme des paradoxes. Il est à peine besoin de mentionner à quel point cette vision est fausse, absurde, ridicule : le début du XX^{e} fut en réalité une époque extraordinairement fertile, qui vit la naissance de l'Algèbre abstraite, de l'Analyse abstraite, de la Topologie générale et algébrique, etc.

3. Contre le *caractère de fondement de la Logique* : A. Lautman avait soutenu dès 1937

> cette idée que la véritable logique n'est pas *a priori* par rapport aux mathématiques mais qu'il faut à la logique une mathématique pour exister.

Cette idée trouve dans les travaux contemporains très influentiels de J.-Y. Girard, créateur de la Logique linéaire, une confirmation éloquente. Outre ses objections vigoureuses contre le piètre fondement que constitue la traditionnelle régression à l'infini des méta-, méta-méta-théories logiques, se soutenant

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

l'une l'autre en gigogne, mentionnons son programme actuel qui, renversant l'image traditionnelle, vise à fonder la Logique sur les Mathématiques, et les Mathématiques parmi les plus avancées : la Géométrie non commutative (3).

Il y a un autre aspect de l'évolution de la Logique mathématique qui conduit à lui dénier tout statut spécial *a priori*, c'est le rôle récent et de plus en plus important qu'elle joue en informatique théorique, qui n'est pas du tout celui d'un fondement, mais celui d'un outil au service de l'invention de nouveaux langages de programmation ou d'algorithmes...

À notre sens, c'est une émancipation : enfin des rôles créatifs et non plus de soutènement ! Le logicien Atlas est libéré, sans que la voûte des Mathématiques ne s'effondre dans le Tartare !

4. Contre l'illusion de la recherche « essentialiste » de fondements immuables : pendant qu'Atlas s'en est allé cueillir les pommes de silicium au jardin de l'informatique, il n'est nul besoin qu'un Hercule le remplace... Nous ne développerons pas ce point, qui nous entraînerait trop loin (4).

Voilà pour les objections contre l'image de « l'arbuste des mathématiques ».

2 — Le tricotin

Venons-en au second préjugé, qui touche non plus à l'architecture des Mathématiques vivantes, mais à sa *nature* même. Nous épinglerons ce préjugé par l'image du « tricotin », ce jouet de bois jadis populaire, portant quatre épingles, à l'aide duquel on tricotait indéfiniment une tresse de laine, la seule variation possible étant celle des couleurs des fils enroulés autour des épingles.

Ce que nous visons ici, c'est une certaine forme vulgaire de logicisme, et cette image des Mathématiques qu'elle véhicule : des axiomes enroulés ad libitum autour de quatre épingles, tricotés indéfiniment en une tresse ininterrompue de vérités qui s'en déduisent, modus ponens, modus tollens, maille à l'endroit, maille à l'envers !...

Nous voudrions de nouveau soulever quatre objections contre cette image.

1. Certes, le discours mathématique est un discours déductif, qui soumet ses énoncés à un ordre rigoureux. Mais l'image du tricotin omet un point évident (déjà chez Euclide) : à savoir qu'un texte mathématique n'est pas un enchaînement uniforme d'implications, mais apparaît polarisé entre « énoncés » d'un côté, et « démonstrations » de l'autre ; en outre, le côté « énoncé » est lui-même stratifié suivant une hiérarchie d'importance et de profondeur, en lemmes, propositions, théorèmes, corollaires. Ni cette polarisation, ni cette hiérarchie, qui percent l'universalité égalitaire du texte ne résultent d'une loi formelle, mais de choix délicats du mathématicien qui vont bien plus loin que de simples choix rédactionnels ou de style.

(3) voir *Le point aveugle*.

(4) la critique la plus radicale à cet égard est celle d'Alain Badiou, pour qui il ne saurait être question de fondements ontologiques sur lesquels s'appuieraient les Mathématiques : selon la thèse inaugurale de son livre *L'être et l'événement* évoqué au chapitre IX.3.4 est justement l'identité : Mathématiques = Ontologie ; plus précisément : « les mathématiques sont l'historicité du discours sur l'être-en-tant-qu'être ».

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2. Contre le *réductionnisme* du logicisme vulgaire, qui consiste à réduire les Mathématiques à la suite de symboles dont est tricoté le texte mathématique, et aux règles élémentaires du tricotage.

Certes, c'est une singularité de la Mathématique parmi les sciences que de s'être *dotée d'une écriture propre* (on peut en dire autant de la musique parmi les arts). Pour autant, elle ne se réduit pas à son écriture.

Rien n'empêche, certes, d'étudier de manière purement formelle un certain discours mathématique idéalisé, comme le fait notamment la Théorie de la démonstration ; pourvu qu'on ne prétende pas représenter ainsi la pensée mathématique, ni même les démonstrations réelles des mathématiciens, — mais seulement leur trace formelle. Une des aberrations les plus visibles de ce réductionnisme grossier est de faire table rase de toute heuristique, à commencer par l'opposition, si fondamentale dans la pensée du mathématicien, entre le trivial et le profond.

3. La démonstration, celle pratiquée par le mathématicien au travail, n'est pas un processus formel, elle ne tient pas de la bureaucratie des formules et des procès-verbaux. Démonstration n'est pas identique à vérification.

Certaines vérifications peuvent être automatisées. La démonstration présuppose une idée — ce que les mathématiciens appellent une idée de démonstration —, même si elle se réduit à un calcul. Les mathématiciens savent bien, d'ailleurs, qu'il y a des démonstrations de qualités bien différentes — indépendamment des questions de rigueur —, et ils passent beaucoup de temps à reprouver des théorèmes connus. Les démonstrations les plus frustes — et frustrantes — sont celles qui se réduisent à un calcul : elles emportent conviction, certes, mais il reste à comprendre le calcul lui-même — *pourquoi* cela marche. À l'autre extrême, il y a des démonstrations qui illuminent, qui ouvrent des horizons. L'un des reflets techniques de cette dialectique entre comprendre et vérifier est le fameux problème $P = NP$ en informatique théorique : grosso modo, il s'agit de savoir si pour tout problème dont on peut *vérifier* rapidement (en temps polynomial) qu'une solution est correcte, on peut bel et bien trouver rapidement une solution.

4. Contre l'arbitraire des axiomes. Que sont les axiomes, en fait ? Ce sont des parties constitutives de la définition d'un concept, ou plus largement d'un cadre conceptuel mathématique. Or les mathématiciens sont généralement de grands adeptes du rasoir d'Ockham, et détestent la multiplication gratuite des concepts (et donc des axiomes) ; ils travaillent assidûment à la recherche du « bon cadre conceptuel », qui fait l'objet de débats passionnés entre spécialistes, et est tout sauf arbitraire. Les changements de systèmes d'axiomes correspondent à des changements de cadre conceptuel, à des mutations de point de vue, hautement significatifs pour l'histoire de la discipline. Si, suivant Cantor, « l'essence des Mathématiques, c'est la liberté », la liberté du mathématicien ne consiste certainement pas dans l'arbitraire et le gratuit.

3 — Brouillards et analogies

Nous sommes maintenant prêts à aller au cœur du sujet de ce chapitre. Nous irons vite, pour arriver enfin aux conjectures ; qu'on nous pardonne de commencer un peu comme un catéchisme !

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

— Qu'est-ce qui meut le mathématicien dans sa pensée ?
— Le désir.
— Quel désir ?
— Le désir de comprendre.
— Comprendre quoi ?
— Certaines choses concernant les objets mathématiques, et surtout les mystères de leurs rapports mutuels.
— Et ce qui excite ce désir ?
— Le mystère même ; le mystère qui enflamme l'imagination, qui elle-même fait surgir les idées nouvelles, qui déchireront le voile.

La plupart du temps, il est vrai, cette pêche au mystère, cette recherche des problèmes, n'est qu'un cabotage le long des côtes bien familières des théories constituées. Souvent aussi, il s'agit de la recherche d'un isthme entre deux terres connues mais jusque-là séparées. Quelquefois, il s'agit vraiment de pêche en eaux profondes.

Ce qui s'y joue, A. Weil l'a peint dans un célèbre passage (5) :

> Rien n'est plus fécond, tous les mathématiciens le savent, que ces obscures analogies, ces troubles reflets d'une théorie à l'autre, ces furtives caresses, ces brouilleries inexplicables ; rien aussi ne donne plus de plaisir au chercheur. Un jour vient où l'illusion se dissipe ; le pressentiment se change en certitude ; les théories jumelles revèlent leur source commune avant de disparaître ; comme l'enseigne la *Gita*, on atteint à la connaissance et à l'indifférence en même temps. La métaphysique est devenue mathématique, prête à former la matière d'un traité dont la beauté froide ne saurait plus nous émouvoir. [...] Heureusement pour les chercheurs, à mesure que les brouillards se dissipent sur un point, c'est pour se reformer sur un autre.

Ainsi, ces « obscures analogies » conditionnent-elles, orientent-elles à la façon d'une boussole — mais encore dans le trouble — le cheminement de la pensée mathématique.

4 — Points de vue féconds

C'est là, dans le passage mystérieux des troubles reflets initiaux à la découverte de questions, notions, théorèmes nouveaux, que se pose la question de l'orientation de la pensée mathématique. Le jour « où l'illusion se dissipe » n'advient qu'après la longue patience de ce travail d'orientation. A. Grothendieck a admirablement décrit le rôle qu'y joue *la recherche de points de vue féconds* (6) :

> [...] ces innombrables questions, notions, énoncés [...] ne prennent [...] un sens qu'à la lumière d'un tel « point de vue » — ou pour mieux dire, ils en naissent spontanément, avec la force de l'évidence. [...] Le point de vue fécond est celui qui nous révèle, comme autant de parties vivantes d'un même Tout qui les englobe et leur donne un sens, ces questions brûlantes que nul ne sentait, et (comme en réponse peut-être à ces questions) ces notions tellement naturelles que personne n'avait songé à dégager, et ces

(5) De la métaphysique aux mathématiques, 1960.
(6) Récoltes et Semailles.

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

énoncés enfin qui semblent couler de source, et que personne ne risquait de poser, aussi longtemps que les questions qui les ont suscités, et les notions qui permettent de les formuler, n'étaient pas apparues encore. Plus encore que ce qu'on appelle les théorèmes-clef en Mathématique, *ce sont les points de vue féconds qui sont, dans notre art, les plus puissants outils de découverte — ou plutôt, ce ne sont pas des outils, mais ce sont les yeux même du chercheur qui, passionnément, veut connaître la nature des choses mathématiques*.

5 — Conjectures

se perdre en conjectures...

L'idée que nous voudrions développer est que dans cette traversée « de la métaphysique aux mathématiques », comme disait Weil, dans ce long cheminement labyrinthique allant des brouillards vers la clarté du théorème, ce qui oriente la pensée non plus à la manière d'une boussole, mais *comme un phare éclairant de loin la petite porte cachée qui ouvre sur la clarté*, c'est la conjecture. Aux avant-postes de ces points de vue dont parle Grothendieck, les conjectures marquent et éclairent un but... mais pas du tout le chemin pour l'atteindre.

« Conjecture » a un sens bien précis en Mathématiques. Il s'agit d'un *énoncé destiné à devenir un théorème.* Ce qui manque encore, c'est la démonstration. La conjecture fait donc partie du domaine heuristique. Son existence, en tant que conjecture, est en principe transitoire. Elle n'a aucune place dans l'image logiciste des Mathématiques.

Une fois la conjecture formulée, la question de l'orientation de la pensée dans cette aventure mathématique devient celle de la recherche de stratégies de démonstration (ou de réfutation, éventuellement !). Après maint tatônnement, on a fini par mettre un doigt sur le nœud du mystère, on en a un condensé formulé, un précipité ; et l'aventure se poursuit sur un mode plus concret et souvent plus technique.

Cela peut même se traduire par un relais des compétences : les conjectures sont souvent ce point où les « theory-builders » (les bâtisseurs de théories) passent le relais aux « problem-solvers » (les résolveurs de problèmes). Mais le cycle se referme : la résolution des grandes conjectures s'accompagne souvent d'idées tout à fait nouvelles, dont l'approfondissement est alors l'occasion d'un passage de relai dans l'autre sens.

Critères. Pour être acceptée comme telle, une conjecture doit satisfaire à certains critères (qui naturellement sont bien différents des critères de vérité, de preuve rigoureuse, exigés pour un théorème). Nous en distinguerons quatre :

1. puisqu'elle est censée devenir, telle quelle, un théorème, son énonciation doit satisfaire aux *mêmes critères formels que ceux d'un théorème* : précision, absence d'ambiguïté, unité interne. Ce n'est pas une simple question.

2. À défaut de preuve, elle doit être accompagnée de ce qu'on appelle en anglais « *some evidence* » (ce qui n'est pas de l'évidence, mais ce qu'on pourrait traduire par « témoignage en faveur de » ou « bien-fondé heuristique »). Cette « evidence » peut être de nature diverse et hétérogène : il peut s'agir d'expérimentations (numériques ou non), de la démonstration de cas particuliers, ou encore d'analogies précises avec des énoncés qui sont déjà des théorèmes.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

3. La conjecture doit être *en situation*, se rapporter à un problème identifié. On doit pouvoir lui attribuer une portée non nulle. Cela exclut les simples devinettes.

4. En formulant une conjecture, l'auteur de la conjecture s'engage, *prend parti*. C'est une sorte de pari. La réputation de l'auteur, comme expert et comme visionnaire, joue un rôle certain dans l'obtention de l'assentiment de la communauté. Ce dernier critère doit toutefois être nuancé. Notamment lorsqu'il s'agit de conjectures anciennes — parfois présentées par leurs auteurs comme des questions intéressantes « qui les entraîneraient trop loin » ; c'est la postérité qui en a fait des conjectures.

Gestes. Nous avons parlé, à propos de conjecture, de condensation, de prédiction, d'engagement, de pari. La conjecture, par nature transitoire, est suspendue au mystérieux pouvoir de son énonciation. G. Châtelet écrivait ceci

> les vérités mathématiques sont bien éternelles, mais leur conquête, en vue de leur stratification dans un savoir, présuppose des gestes qui les font ressortir pour les arracher au tissu de l'Être.

Ainsi sont ces gestes qui posent les conjectures architectoniques : gestes qui captent et qui pointent. Et qu'il ne faut pas confondre avec ces événements capitaux, ces grands catalyseurs de la pensée mathématique, que sont les irruptions d'idées nouvelles ; autres gestes : déchirure, coup d'aile.

Typologie. En tant que « phares », les conjectures sont de portée très variable. Les plus puissantes sont celles que nous appellerons, en suivant le mathématicien B. Mazur, *architectoniques* : elles façonnent le paysage conjectural d'un domaine.

Parfois, elles engendrent de véritables programmes de travail mettant en jeu de nombreux mathématiciens, ce qu'on a pu ironiquement appeler les *plans quinquénaux* des Mathématiques.

Par ailleurs, il arrive dans certains domaines mathématiques que les conjectures ne soient pas isolées, mais nombreuses et liées les unes aux autres par des liens logiques ou heuristiques très forts ; c'est typiquement le cas dans la Théorie des « motifs », créée par Grothendieck, où les conjectures forment comme l'armature idéale dans laquelle s'échafaude la théorie.

Exemples. Mentionnons brièvement deux exemples emblématiques de conjecture architectonique, déjà évoqués dans des chapitres précédents :

1. la conjecture de Riemann, toujours ouverte, qui jette une lumière sur la distribution des nombres premiers, et au-delà sur bien des questions ayant trait à l'articulation mystérieuse entre addition et multiplication des nombres (*cf.* chap. I, 4.2).

2. la conjecture de W. Thurston (1976), contenant la conjecture de Poincaré (1905) comme cas particulier, qui dessine le paysage de la Géométrie en dimension 3. Les profonds travaux d'Analyse de G. Perelman (2004) ont transformé cette conjecture en un théorème (*cf.* chap. IV, 2.4).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

6 — Conclusion

On sera peut-être surpris de n'avoir pas entendu, jusqu'à ce point, de tirade sur la beauté des Mathématiques, comme aiment à les faire les mathématiciens. C'est que, s'il est aisé de chanter l'épithalame de la beauté et de la vérité en Mathématiques, il semble bien difficile de *penser* leur union, ou même de marquer les modalités précises de rencontre entre elles.

En guise de conclusion, nous voudrions hasarder que les conjectures architectoniques illustrent la modalité suivante :

Beauté, promesse de vérité.

Il ne s'agit que d'une « conjecture » ! Et la seule « evidence » que nous avons à verser au dossier, c'est que nous ne connaissons pas d'exemple de conjecture architectonique qui se soit révélée fausse ! Ce qui étaie quelque peu le sentiment fréquent du mathématicien devant les grandes idées heuristiques : « c'est trop beau pour être faux » (7).

Et même si cela arrivait, ce serait peut-être encore plus intéressant — que le bouleversement complet de nos conceptions dans le domaine qu'elle éclaire conduise à une nouvelle traversée du désert, ou bien qu'elle s'accompagne de la découverte d'une réalité mathématique insoupçonnée. Du reste, l'essentiel n'est peut-être pas d'atteindre le but marqué par la conjecture : il est plutôt dans les *idées nouvelles* qui surgissent dans l'effort déployé vers ce but, et dont la portée peut dépasser celle de la conjecture originaire au point de rendre celle-ci dérisoire.

Une des sources de la beauté en Mathématiques réside dans la cohérence et l'harmonie. Il en est ainsi dans ces constellations de conjectures que nous évoquions. Voici, pour finir, ce qu'en dit Grothendieck (*op. cit.* p. 211), grand maître ès conjectures s'il en fut :

> Dix choses soupçonnées seulement, dont aucune [...] n'entraîne conviction, mais qui mutuellement s'éclairent et se complètent et semblent concourir à une même harmonie encore mystérieuse, *acquièrent dans cette harmonie force de vision*. Alors même que toutes les dix finiraient par se révéler fausses, le travail qui a abouti à cette vision provisoire n'a pas été fait en vain...

(7) dans l'autre sens, il arrive fréquemment en recherche que l'on écarte d'emblée telle ligne d'attaque d'un problème en raison de son manque d'élégance. Sur le rôle des considérations esthétiques dans « l'invention mathématique », on pourra lire le bel article de Poincaré portant ce titre (1908).

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Index des notions

algèbre **III.2.5**,
algèbre de Lie **VI.1.2**, VI.3.5, VI.4.3,
algèbre de von Neumann **III.6**, VI.3.5,
algèbre stellaire **III.4.3**, III.5, III.6,
analyticité I.1.3, VI.1.2, **VII.5.1**,
application **II.1.5**, II.3.1, II.5.1, II.5.2,
application linéaire **III.2**, III.4.3, III.5.2, VI.1.1, VI.1.2, VI.3.3, VI.4.4, VIII.2.1,
associativité II.1.4, II.5.1, **III.1**, III.2.1, III.2.5, III.7, V.1.2,
automorphisme, isomorphisme **II.5.1**, V.1.2, V.3, V.4, VI.2.4, VIII.3.3,
base **III.2.3**, III.4.1, III.4.2, VI.1.1, VI.2.2, VI.2.5, VI.3.1, VI.3.2,
bifurcation **VII.3.1**, VII.3.2,
bijection ..... I.2.1, I.2.2, **II.1.5** ,
bord **VIII.4.2**,
caractère III.5.1, **VI.3.1**,
cardinal **I.2.2**, I.2.4,
carquois **VI.4.4**,
catastrophe **VII.4.3**, VII.5.3,
catégorie II.2.3, II.4.1, **II.5.1**, II.5.2, II.6.1, III.2.2, V.3.2, VI.2.1, VI.3.3, VIII.2.2,
champ de vecteurs II.3.2, **VII.2.1**,
coaction, cogèbre **IX.2.1**, IX.3.3,
cohomologie II.3.3, II.4.1, **VIII.4.2**,
(non) commutativité II.3.3, II.5.1, **III.1**, III.3.5, III.6.1, III.6.5, V.1.2, VI.1.1, VI.3.1, VI.3.2,
compacité, compactification **I.3.2**, **III.3.2**,
complétude, complétion **III.3.2**,
composition II.2.3, II.3.1, **II.5.1**, II.5.2, **III.1**, III.2, III.4.3, VI.1.1, VI.2.3, VIII.2.1,
conjugaison III.6.3, **V.1.3**, VI.3.1,
continuité **I.1.4, II.1.5**, II.3.2, II.5.1, III.2.5, III.3.2, III.5.2, VI.2.5, VII.2.1, VIII.1.1, VIII.3.1,
corps **V.1.2**, V.1.3, V.3.1,
courbure I.1.2, III.3.3, IV.1.4, **IV.2.1**, **IV.2.2**, IV.2.6,
covariance, contravariance II.4.1, **II.5.2**, VIII.2.1,
déploiement **VII.4.1**, VII.4.3, VII.5.2,
dérivabilité, dérivée, différentiabilité **I.1.2**, III.3.3, VI.1.2, **V.4**, VII.1.1, VIII.3.2,
diagramme de Dynkin **VI.4.3**, VI.4.4, VII.4.2, VII.4.3, VII.5.3,
dimension II.1.1, **II.3.1**, III.2, **III.2.3**, III.4.2, III.6.2,
discriminant **VII.4.1**, VII.4.3,
distribution **VIII.3.2**, VIII.3.3,
divergence **I.4.1**, I.4.2, V.4, V.6,
éclatement **VII.5.2**, VII.5.3,
équation algébrique **V.1.1**,
équation différentielle I.2.3, **V.4**, VI.2.5,
équivalence de catégories II.4.1, **II.5.2**,
espace de Hilbert **III.4.2**, VI.3.2,

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

espace dual **VIII.1.3**, VIII.3.1,
espace euclidien II.5.3, **III.4.1**, III.4.2, III.5.1, VI.3.1, VI.3.2, VI.4.3, VIII.1.3,
espace topologique .. **II.1.1**, II.1.4, II.3.1, II.4.1, II.4.2, II.5.4, II.6.3, III.5.1, III.5.2, VII.3.3,
espace vectoriel III.2, **III.2.1**, III.4.1, III.6.2, V.1.2, V.4, VI.1.1, VI.1.2, VI.2.5, VI.4.4, VIII.1.3,
évanescence **VII.4.2**, VII.5.2,
facteur (de von Neumann) III.6, **III.6.1**,
facteur moyennable **III.6.4**,
faisceau II.3.1, **II.3.2**, II.3.3, II.4.1, II.4.2, II.5.1, II.5.3, II.5.4,
fibre **II.5.4**,
filtre **II.1.2**, II.1.4,
flot de Ricci **IV.2.3**, IV.2.4, IV.2.6,
fonction **I.1.2, II.1.5**, II.2.1, II.2.2, III.2.5, III.3, III.4.2, III.5.2, V.4, VI.1.2, VII.2, VII.2, VIII.3.2,
foncteur II.4.1, **II.5.2**, II.5.3, II.5.4, V.3.2, VIII.2.1, VIII.2.3,
foncteurs adjoints **II.5.3**, II.5.4, II.6.2, II.6.3, VIII.2.3,
forme différentielle **VIII.4.2**, VIII.4.3,
forme linéaire **VIII.1.3**, VIII.3.1,
forme normale **VII.3.1**,
généricité **VII.1.1**, VII.3,
groupe II.3.3, II.4.1, III.2.1, **V.1.2**,
groupe de Galois **V.1.2**, V.3, V.4, V.5, V.6, VI.3.3,
groupe de Lie simple **VI.4.3**,
groupe fini simple **VI.4.2**,
groupe fondamental (de Poincaré) **V.3.2**, V.3.3, VI.2.5, X.5,
intérieur **II.1.3**, II.6.3,
intégrale **I.1.2**, III.5.2, V.5,
limite I.1.4, I.3.2, **II.5.3**, V.3.1, V.3.2,
lissité **VI.1.2**, VII.5.1,
matrice **III.2.3**, III.3.5, III.6.1, V.4, VI.1.1,
mesurabilité, mesure I.4.1, **III.3.1**, III.5.2, VI.3.2,
monodromie V.4, **VI.2.5**,
morphisme II.2.3, II.3.1, **II.5.1**, II.5.2, III.2.2, VI.2.4,
nombre algébrique, nombre transcendant **V.3.1**, **V.5**,
nombre (réel, complexe) **II.1.5**, **I.2.1**,
norme **III.4.1**, III.4.2, III.4.3, III.5.2, VIII.3.1,
obstruction II.3.3, V.2.3,
opérateur **III.2**, III.4, III.5, III.6, VI.1.1,
opérateur adjoint II.5.3, **III.4.1**, III.6.1, VIII.2.1,
opérateur unitaire **III.4.1**, III.6.2, VI.3.1, VI.3.2, VI.3.4,
ordinal **I.2.2**, I.2.3,
ordre I.2.2, **II.1.4**, II.5.1, VIII.2.2,
orthogonalité **III.4.1**, VI.4.3,
point critique **VII.2**, VII.4,
présentation **VI.2.3**,
projecteur (orthogonal) **III.4.1**, III.6.2,
produit scalaire **III.4.1**, III.4.2, VI.3.1, VI.3.2, VIII.1.3,
produit tensoriel **VI.2.5**, VI.3.3, VIII.2.3,
prolongement analytique I.4.1, I.4.2, **VII.5.1**,
racine d'une équation algébrique **V.1.1**, V.1.2,
renormalisation I.4.2, V.6,
représentation **VI.2.4**,
représentation linéaire **VI.2.5**, VI.3, VI.4,

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

résolubilité V.1.1, **V.1.3**, V.2.4, V.4,
revêtement **II.2.2**, II.2.3, V.3.2, V.3.3,
singularité V.4, VI.2.5, **VII.1.1**, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VIII.3.2,
site **II.2.3**, II.4.2,
stabilité VI.1.2, **VII.3.3**,
surface de Riemann **II.2.2**, II.4.2, V.3.2,
symplectique VI.4.3, **VII.4.3**, VII.5.3,
topologie **II.1**, II.2.3, III.2.4,
topos **II.4**, II.5.4, II.6,
trace **VI.1.1**, VI.3.1,
transformée de Fourier **VIII.3.3**,
transformée de Legendre **VIII.3.4**,
treillis **II.1.4**, II.1.5, II.2.3, II.4.1, II.6.3, V.2.2, VIII.2.2,
uniformisation **IV.2.4**,
variété **II.3.1**, II.3.3, III.3.5,
variété algébrique **II.2.3**, II.4.1,
variété analytique **VII.5.1**, VII.5.2,
variété lisse II.3.2, **VII.1.1**, VII.5.2,
variété riemannienne III.3.3, **VIII.4.2**,
vecteur ..... III.2, **III.2.1**, III.4, VI.1.1, VI.4.3.

Index de mathématiciens cités

Abel N. (1802–1829) V.1.1, V.2.3,
Aczel P. (1941–) IX.3.1,
Arnold V. (1937–2010) VII.3.2, VII.4.2, VII.4.3,
Bolzano B. (1781–1848) I.1.4,
Borel E. (1871–1956) IV.1.2,
Bourbaki N. (1935–) I.2.5, II.1.1,
Burnside W. (1852–1927) VI.3.1, VI.4.2,
Cantor G. (1845–1918) I.1.4, I.2.1, I.2.2, I.2.4, III.2, III.3.1,
Carnot L. (1753–1823) VIII.1.1,
Cartan É. (1869–1951) VI.4.3,
Cartan H. (1904–2008) II.3.1,
Cartier P. (1932–) II.5.3, II.6,V.6,
Cauchy A. (1789–1857) I.1.4,
Cayley A. (1821–1895) V.1.2, VII.2.4,
Chasles M. (1793–1880) VIII.1.2, VIII.4.3,
Cohen P. (1934–2007) I.2.4,
Connes A. (1947–) III.3.5, III.6.3, III.6.4, V.5,
D'Alembert, J. (1717–1783) I.1.4, IV.1.3, V.1.1,
Dedekind R. (1831–1916) I.1.4, I.2.1, I.2.5, III.2, VI.3.1,
Deligne P. (1944–) II.4.1,
Desargues G. (1591–1661) I.3.1, VIII.1.1,
Dieudonné J. (1906–1992) I.1.2, I.1.3, I.4.1,
Drinfeld V. (1954–) V.3.3,
Dynkin E. (1924–2014) VI.4.3, VI.4.4, VII.4.2, VII.4.3, VII.5.3,
Euler L. (1707–1783) I.1.2, I.1.4, I.4.1, I.4.2,
Forti M. (1958–) IX.3.1,
Fourier J. (1768–1830) III.4.2, VIII.3.3,
Frobenius G. (1849–1917) VI.3.1, VI.4.2,
Gabriel P. (1933–2015) VI.4.4,

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Galilée G. (1564–1642) IV.1.1, IV.1.2,
Galois É. (1811–1832) V.1, V.2, V.4, VI.4.2,
Gauss F. (1777–1855) III.3.3, IV.2.2, V.1, VI.2.2,
Gelfand I. (1913–2009) III.5.1, III.5.2, VI.3.5,
Gergonne J. (1771–1859) VIII.1.1, VIII.1.2,
Girard J.-Y. (1947–) III.7, X.1,
Gödel K. (1906–1978) I.2.4, I.2.5,
Goodstein R. (1912–1985) I.2.3,
Grassmann H. (1809–1877) III.2,
Grothendieck A. (1928–2014) .. II.2.3, II.4.1, II.4.2, II.5.4, II.6.1, V.3.2, V.3.3, V.5, VI.3.3,
Hamilton R. (1943–) IV.2.1, IV.2.3, IV.2.4,
Hausdorff F. (1868–1942) II.1,
Hilbert D. (1862–1943) III.4.2,
Hironaka H. (1931–) VII.5.2,
Hodge W. (1903–1975) VIII.4.2,
Honsell F. (1958–) IX.3.1,
Jones V. (1952–) III.6.5,
Klein F. (1849–1925) V.2.2, V.3.2,
Killing W. (1847–1923) VI.4.3,
Kontsevich M. (1964–) IX.1.1,
Lagrange L. (1736–1813) I.1.2, I.1.3, I.1.4, V.1.1, VI.1.2, VIII.3.4,
Laplace P.-S. (1749–1827) I.2.3, VI.1.2,
Leibniz G. (1646–1716) I.1.1, I.1.2, I.1.4, II.1, III.3.4, VIII.1.1,
Leray J. (1906–1998) II.3.1, II.4.2,
Lie S. (1842–1899) VI.1.2, VI.3.5, VI.4.2, VI.4.3,
Liouville J. (1809–1882) V.4,
MacLane S. (1909–2005) II.5.1,
Monge G. (1746–1818) VIII.1.1,
Newton I. (1643–1727) I.1.1, III.5.1, III.6.1, VIII.3.3,
Noether E. (1888–1935) IX.1.1,
Novikov P. (1901–1975) VI.2.3,
Peano G. (1858–1932) III.2, I.2.3,
Perelman G. (1966–) IV.2.4, IV.2.5, IV.2.6, X.5,
Poincaré H. (1854–1912) V.3.2, VIII.4.1,
Poncelet V. (1788–1867) VIII.1.1, VIII.1.2,
Ramis J.-P. (1943–) V.4,
Ricci-Curbastro G. (1853–1925) IV.1.4, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.6,
Riemann B. (1826–1866) I.1.4, I.3.2, I.4.2, II.1, II.2.2, III.3.1, III.3.3, V.3.2,
Riesz F. (1880–1956) III.5.2, III.6.1,
Schwartz L. (1915–2002) VIII.3.2,
Serre J.-P. (1926–) IX.2,
Thom R. (1923–2002) II.1.3, VII.4,
Thurston W. (1946–2012) X.5,
Viète F. (1540–1603) V.1.1,
Voevodsky V. (1966–2017) I.1.4,
Von Neumann J. (1903–1957) III.6.1, III.6.2, VI.3.5,
Weierstrass K. (1815–1897) I.1.4, VII.5.1,
Weil A. (1906–1998) II.4, X.3, X.5,
Weyl H. (1885–1955) VI.3.2, VI.3.4, VI.4.3, VII.4.3,
Whitney H. (1907–1989) ..... VII.3.2.
Zermelo E. (1871–1953) ..... I.2.4, IX.3.2.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

Glossaire des notions de base

Notions et notations ensemblistes *Ces notions traitent des « multiplicités », dans la plus grande généralité.*

L'*ensemble vide* est noté $\varnothing$.
La notation $x \in X$ veut dire : x appartient à l'ensemble X, *i.e.* est un *élément* de X.
La notation $A \subset X$ veut dire : A est une *partie* de X, *i.e.* est un ensemble d'éléments de X.
Si A et B sont deux parties de X, $A \cap B$ désigne leur *intersection* (ensemble des éléments appartenant à A et à B), $A \cup B$ leur *réunion* (ensemble des éléments appartenant à A ou à B). $X \setminus A$ désigne le *complémentaire* de la partie A dans X (ensemble des éléments de X n'appartenant pas à A).
Le *produit cartésien* $X_1 \times \ldots \times X_n$ d'ensembles $X_1, \ldots, X_n$ est l'ensemble des suites $(x_1, \ldots, x_n)$ avec $x_1 \in X_1, \ldots, x_n \in X_n$. Si $X_1 = \ldots = X_n = X$, on le note X^n.

Une *application* d'un ensemble (*source*) X vers un ensemble (*but*) Y est une règle f qui associe à tout élément x de X un élément $f(x)$ de Y. On utilise souvent les notations $f : X \to Y$, $X \xrightarrow{f} Y$ et $x \mapsto f(x)$. On dit parfois *fonction* au lieu d'application, surtout lorsque Y est l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels ou bien l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.
L'*application identique* de X est l'application de X dans X qui ne modifie aucun élément. Elle est notée id_X ou 1_X.
La *composée* d'une application $f : X \to Y$ et d'une application $g : Y \to Z$ est l'application de X vers Z (notée $g \circ f$ ou simplement gf) définie par $x \mapsto g(f(x))$.
Le *graphe* de $f : X \to Y$ est l'ensemble des couples $(x, f(x))$, lorsque x parcourt les éléments de X (lorsque X et Y sont des intervalles de $\mathbb{R}$, c'est la notion familière de courbe plane représentant la fonction f).
On dit que f est une *bijection* si tout élément y de Y est l'image par f d'un et d'un seul élément $f^{-1}(y)$ de X ; ce qui permet de définir la bijection inverse $f^{-1} : Y \to X$.
L'*image inverse* $f^{-1}(B)$ d'une partie B de Y par une application $f : X \to Y$ est la partie de X formée de tous les éléments que f applique dans B.

Notions topologiques *Ces notions traitent qualitativement des « lieux » et des « relations spatiales ».*

Un *espace topologique* est un ensemble X muni d'une collection $\mathfrak{O}$ de parties dites *ouvertes*, qui comprend $\varnothing$ et X, qui est stable par réunion et par intersection finie. Les éléments de X sont appelés *points*. L'exemple de base est celui de $X = \mathbb{R}$ en prenant pour $\mathfrak{O}$ la collection de toutes les réunions d'intervalles privés de leurs extrémités (et plus généralement $\mathbb{R}^n$, en remplaçant intervalles privés de leurs extrémités par boules privées de leur circonférence).
La partie complémentaire d'une partie ouverte est dite *fermée*.
On appelle *voisinage* d'un point $x \in X$ toute partie de X qui contient une partie ouverte à laquelle x appartient.

Une application $f : X \to Y$ entre espaces topologiques est dite *continue* si l'image inverse de toute partie ouverte de Y est une partie ouverte de X (lorsque X et Y sont des intervalles de $\mathbb{R}$, cela correspond à la notion « intuitive » : on peut « tracer le graphe de f sans lever le crayon »).
On dit que f est un *isomorphisme* (ou *homéomorphisme*) si f est une bijection continue dont l'inverse f^{-1} est aussi continue.

Une *variété* topologique de dimension n est un espace topologique X qui est réunion de parties ouvertes U_i (appelés *cartes*) isomorphes à des ouverts de $\mathbb{R}^n$ (on démontre que la dimension n est alors définie sans ambiguïté). Sur les intersections $U_i \cap U_j$, on

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

dispose donc de bijections, appelées *changements de cartes*, d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ vers un autre. Selon les propriétés particulières de ces changements de cartes, lissité, analyticité, etc., on parle de variétés lisses, analytiques, etc.

Un espace topologique X est *compact* si, de quelque manière qu'on l'écrive comme réunion de parties ouvertes U_i, X est déjà réunion d'un nombre fini d'entre les U_i (on démontre qu'une partie X de $\mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée).

Notions algébriques *La notion de groupe modélise l'aspect «opératoire» de toutes sortes de « symétries ».*

Un *groupe* est un ensemble G muni d'une application $G \times G \xrightarrow{\cdot} G$ *associative* (*i.e.* vérifiant $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$), qui admet un *élément neutre* 1_G (*i.e.* tel que $1_G \cdot x = x \cdot 1_G = x$), et eu égard à laquelle tout élément $x \in G$ admet un inverse x^{-1} (*i.e.* tel que $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1_G$). L'exemple de base est le groupe des permutations des éléments d'un ensemble X, pour la composition, l'élément neutre étant l'application identique de X (en fait, tout groupe est sous-groupe d'un groupe de permutations).
Un groupe G est dit *commutatif* ou *abélien* si on a $x \cdot y = y \cdot x$ pour tout $(x, y) \in G^2$. L'exemple de base est le groupe des entiers, pour l'addition.

Un *morphisme* (ou *homomorphisme*) de groupes $f : G \to H$ est une application de G vers H telle que $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$ pour tout $(x, y) \in G^2$. Par exemple, étant donné $g \in G$, la *congugaison* par g est le morphisme de G dans lui-même défini par $h \mapsto ghg^{-1}$.

En termes informels, un corps est un ensemble dans lequel il est possible d'« effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (sauf par 0) ».

Précisément, un *corps* est un ensemble K muni de deux applications $K \times K \xrightarrow{+,\cdot} K$, telles que $(K, +)$ soit un groupe abélien (dont l'élément neutre est noté 0), que $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ soit aussi un groupe abélien (dont l'élément neutre est noté 1), les deux étant reliés par *distributivité* : $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$. Les exemples de base sont le corps $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels (fractions), le corps $\mathbb{R}$ des nombres réels, et le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

La notion d'espace vectoriel donne un substrat aux combinaisons linéaires, qui mobilisent à la fois l'addition de certaines « grandeurs » entre elles et leur multiplication par des « nombres ».

Précisément, un *espace vectoriel* sur un corps K est la donnée d'un groupe abélien $(V, +)$ et d'une application $K \times V \xrightarrow{\cdot} V$ associative (eu égard aux lois $\cdot$ de K et V), vérifiant

$$1 \cdot v = v,\ \lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w,\ (\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$$

pour tout $(\lambda, \mu, v, w) \in K^2 \times V^2$. Les éléments de V sont appelés *vecteurs* (le *vecteur nul* ou *origine* est l'élément neutre de $+$). L'exemple de base est $\mathbb{R}^n$, $+$ étant l'addition coordonnée par coordonnée, $\cdot$ étant la multiplication de chaque coordonnée par un même nombre.

Une application $f : V \to W$ entre espaces vectoriels sur K est dite *linéaire* si elle préserve les combinaisons linéaires, *i.e.* $f(\lambda \cdot v + \mu \cdot w) = \lambda \cdot f(v) + \mu \cdot f(w)$ pour tout $(\lambda, \mu, v, w) \in K^2 \times V^2$. Lorsque $V = W$, on parle d'*opérateur* (*linéaire*) sur V. Lorsque f est une bijection, son inverse est linéaire. Le groupe des opérateurs linéaires inversibles (pour la composition) est noté $GL(V)$.

Notions catégoriques *La notion de catégorie fournit un point de vue très général sur les objets mathématiques où l'on occulte délibérément leur structure interne pour mettre l'accent sur leurs rapports mutuels — et sur la composition de ces rapports, ce qui confère à ce point de vue un aspect à la fois dynamique et algébrique.*

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

Une *catégorie* $\mathcal{C}$ consiste d'une part en une collection d'*objets* A, et d'autre part en la donnée, pour tout couple d'objets (A, B), d'un ensemble $\mathcal{C}(A, B)$ dont les éléments sont appelés *morphismes* ou *flèches* de A vers B. On requiert que les morphismes se composent lorsque cela fait sens (*i.e.* le *composé* gf de $f \in \mathcal{C}(A, B)$ et de $g \in \mathcal{C}(B, C)$ est un élément de $\mathcal{C}(A, C)$), la composition étant associative (*i.e.* vérifiant $h(gf) = (hg)f$) ; on requiert aussi qu'il y ait un morphisme identité 1_A de A vers lui-même, qui composé avec tout morphisme de source ou de but A, ne le modifie pas. Les exemples de base sont la catégorie des ensembles (les morphismes étant les applications), la catégorie des espaces topologiques (les morphismes étant les applications continues), la catégorie des espaces vectoriels (les morphismes étant les applications linéaires).
On dit que $f \in \mathcal{C}(A, B)$ est un *isomorphisme* s'il admet un inverse, *i.e.* s'il existe $g \in \mathcal{C}(B, A)$ tels que $fg = 1_B$, $gf = 1_A$; que f est un *automorphisme* si de plus $A = B$.

De même que les ensembles sont reliés par des applications, les catégories sont reliées par des foncteurs, qui agissent tant sur les objets que sur les morphismes.

Un *foncteur* $\phi : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ associe à chaque objet A de $\mathcal{C}$ un objet $\phi(A)$ de $\mathcal{D}$ et à chaque morphisme $f \in \mathcal{C}(A, B)$ un morphisme $\phi(f) \in \mathcal{D}(\phi(A), \phi(B))$. On requiert que ϕ préserve les identités et la composition. Le foncteur identique $Id_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ est celui qui ne modifie ni objet ni morphisme.
Les foncteurs de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{D}$ peuvent être vus comme les objets d'une nouvelle catégorie : un morphisme (ou *transformation naturelle*) de ϕ_1 vers ϕ_2 est une règle qui associe à tout objet A de $\mathcal{C}$ un morphisme $u_A \in \mathcal{D}(\phi_1(A), \phi_2(A))$, de sorte que pour tout morphisme $f \in \mathcal{C}(A, B)$ dans $\mathcal{C}$, on ait $\phi_2(f) \circ u_A = u_B \circ \phi_1(f)$.
Deux catégories $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ sont dites *équivalentes* s'il existe des foncteurs $\phi : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, $\psi : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ tels que les foncteurs composés $\psi\phi$ et $\phi\psi$ soient isomorphes aux foncteurs identiques $Id_{\mathcal{C}}$ et $Id_{\mathcal{D}}$ respectivement.

www.spartacus-idh.com
© Spartacus-Idh 2021

© Spartacus-Idh 2021

Table des matières

Introduction . . . . . **ix**
I Infini **1**
1 L'infini(tésimal) et son calcul 1
1.1 L'infini à penser — à propos du mouvement *1*
1.2 Calcul et écriture de l'infini *2*
1.3 L'Analyse du XVIII^e et la maîtrise du calcul *4*
1.4 L'Analyse du XIX^e et la rigueur du calcul. *5*
2 Les multiplicités infinies et leur mesure 6
2.1 Dedekind et Cantor *6*
2.2 Le transfini. Procession des ordinaux et cardinaux *7*
2.3 L'infini derrière le fini. La patience de Goodstein *7*
2.4 L'enjeu des grands cardinaux *9*
2.5 (Non-)influence de la Théorie des ensembles sur les Mathématiques *9*
3 L'horizon : l'infiniment loin 11
3.1 Points de fuite *11*
3.2 Compactifications *11*
3.3 L'infiniment proche *12*
4 L'infini importun 12
4.1 Contrôler la divergence *12*
4.2 Dépasser la divergence *13*
II Espace I **15**
1 Topologie générale 16
1.1 Ce que c'est *16*
1.2 Voisinages *17*
1.3 Intérieur et frontière *18*
1.4 De l'espace topologique au treillis de ses ouverts *19*
1.5 Applications continues *19*
2 L'idée de surface de Riemann. Sites 20
2.1 Ambiguïtés *20*
2.2 Revêtements à plusieurs feuillets *21*
2.3 Du treillis des ouverts aux sites de Grothendieck *21*
3 Du local au global. Faisceaux 21
3.1 Données locales. Préfaisceaux *22*
3.2 Recollement de données locales compatibles. Faisceaux *22*
3.3 Théorie des obstructions *23*
4 Faisceaux sur un site. Topos de Grothendieck 23
4.1 Ce que c'est *23*
4.2 Espaces et topos *24*
5 Catégories, foncteurs, adjonction 25
5.1 Catégories *25*
5.2 Foncteurs *26*
5.3 Foncteurs adjoints *27*
5.4 Application : morphismes de topos et points d'un topos *27*
5.5 Du bon usage des catégories *28*

6 Topos et Logique intuitionniste . . . 29
6.1 Les topos entre Géométrie et Logique . . . 29
6.2 Règles du calcul propositionnel . . . 29
6.3 Logique intuitionniste et treillis de Heyting . . . 30

III Espace II . . . 33
1 Associativité et commutativité . . . 33
2 Petite boîte à outils d'algèbre linéaire . . . 35
2.1 Espaces vectoriels . . . 35
2.2 Applications linéaires . . . 35
2.3 Bases, dimension, matrices . . . 36
2.4 Importance des problèmes linéaires . . . 36
2.5 Algèbres . . . 37
3 Espaces et fonctions . . . 38
3.1 Grandeur . . . 38
3.2 Localité . . . 39
3.3 Topographie . . . 39
3.4 Le point de vue fonctionnel sur les espaces . . . 39
3.5 L'idée de Géométrie non commutative . . . 40
4 Espaces de Hilbert et Analyse fonctionnelle . . . 42
4.1 Espaces euclidiens . . . 42
4.2 Espaces de Hilbert . . . 43
4.3 Opérateurs sur un espace de Hilbert et algèbres stellaires . . . 44
5 Spectres . . . 44
5.1 De Newton à Gelfand . . . 44
5.2 Retour au point de vue fonctionnel . . . 45
6 Algèbres de von Neumann, facteurs et poids . . . 46
6.1 Ce que c'est . . . 46
6.2 Facteurs de type II et géométrie en dimension continue . . . 47
6.3 Facteurs de type III et dynamique . . . 48
6.4 Classification des facteurs moyennables . . . 49
6.5 Prolongements . . . 49
7 Logique des interactions . . . 50

IV Temps . . . 51
1 Géométrisation du temps . . . 51
1.1 Géométrisation galiléenne du mouvement . . . 51
1.2 Temps-repère vs. trajectoires . . . 52
1.3 Temps irréversible . . . 54
1.4 Continuum espace-temps de la relativité . . . 55
2 Temps propre d'objets géométriques . . . 55
2.1 La goutte d'huile et le flot de courbure . . . 55
2.2 Courbure en dimension supérieure . . . 56
2.3 Flot de Ricci et temporalité d'objets géométriques . . . 57
2.4 « Télicité » et uniformisation d'objets géométriques . . . 57
2.5 Entropie, catastrophes, finitude . . . 58
2.6 Conclusion . . . 59

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

V Symétries I. 61
1 Théorie de Galois des équations algébriques 62
1.1 Résolubilité par radicaux 62
1.2 Groupe de Galois 63
1.3 Correspondance de Galois 65
2 Portée et enjeux de la « théorie de l'ambiguïté » 65
2.1 Émergence d'un corps de concepts d'un type nouveau 66
2.2 Fécondité du principe de correspondance galoisienne 66
2.3 Thématisation des obstructions 67
2.4 Changement de paradigme dans la conception des problèmes 67
3 Revêtements, groupes fondamentaux. 68
3.1 La « montée vers l'absolu ». Le groupe $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 68
3.2 Théorie de Galois des revêtements 68
3.3 Une vision géométrique de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 69
4 Ambiguïtés galoisiennes en Analyse 70
5 Groupes de Galois et nombres transcendants 71
6 Un groupe de Galois « cosmique » ? 72

VI Symétries II 75
1 Linéarité. Linéarisation 76
1.1 Bref retour à l'Algèbre linéaire 76
1.2 Linéarisation. 76
2 Le concept mathématique de représentation 78
2.1 Objets généraux/objets particuliers 78
2.2 Mode intrinsèque/mode extrinsèque 79
2.3 Présentations 80
2.4 Représentations 81
2.5 Représentations linéaires 82
3 Représentations linéaires des groupes 83
3.1 Caractères : la théorie de Frobenius 83
3.2 Groupes compacts et Analyse harmonique 84
3.3 Problème de Tannaka 85
3.4 Représentations linéaires et mécanique quantique 85
3.5 Représentations linéaires en dimension infinie 86
4 Problèmes de classification 86
4.1 « Taxinomie » mathématique 86
4.2 Classification des groupes finis simples 87
4.3 Classification des groupes de Lie simples 88
4.4 Classification des représentations linéaires et indécidabilité 90

VII Singularités 91
1 Généricité, lissité, singularités 91
1.1 Notion de singularité 91
1.2 Enjeux 92
1.3 Comment les singularités apparaissent 92

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

2 Points critiques 94
2.1 Linéarisation des champs de vecteurs. 94
2.2 Points critiques de fonctions 94
2.3 Points critiques génériques. 95
2.4 Topographie et Théorie de Morse 95
3 Généricité et stabilité 96
3.1 La dialectique générique/singulier selon Poincaré 96
3.2 L'exemple des draperies 96
3.3 Singularités stables 98
4 Déploiements et catastrophes 99
4.1 Comment les singularités se déploient 99
4.2 Singularités simples. 99
4.3 Géométrie symplectique et catastrophes 100
5 Le contexte analytique 101
5.1 Principe du prolongement analytique 101
5.2 Comment les singularités disparaissent 101
5.3 Le rôle des « groupes platoniciens » 102

VIII Dualité I. 105
1 Dualité linéaire 105
1.1 Débuts et vicissitudes de la Géométrie projective 105
1.2 Dualité en Géométrie projective 107
1.3 Formes linéaires et dualité 108
2 Dualités catégoriques 109
2.1 Exemple primordial : espaces vectoriels de dimension finie 109
2.2 Autres exemples 109
2.3 Produit tensoriel et dualité. 109
3 Dualités analytiques 110
3.1 Dualité linéaire topologique 110
3.2 Distributions. 110
3.3 Transformée de Fourier. Dualité onde-corpuscule 111
3.4 Transformée de Legendre. Mécanique lagrangienne et Mécanique hamiltonienne 111
4 Dualités géométriques/homologiques 112
4.1 Dualité de Poincaré. 112
4.2 Dualité de De Rham-Hodge 112
4.3 Dualité de Maxwell 113

IX Dualité II 115
1 Action et dualité. 115
1.1 Action. 116
1.2 Dualité 117
2 Coaction 117
2.1 Ce que c'est 118
2.2 F-cogèbres 119

© Spartacus-Idh 2021 www.spartacus-idh.com

3 Circularité 119
3.1 Cercles vicieux et vertueux 119
3.2 L'axiome d'antifondation 120
3.3 Action et coaction : fondation et antifondation 121
3.4 Perspectives philosophiques 121

X Épilogue 123
1 L'arbuste 123
2 Le tricotin 125
3 Brouillards et analogies 126
4 Points de vue féconds 127
5 Conjectures 128
6 Conclusion 130

Index & glossaire 131

Déjà parus

Visions des sciences — Hermann

Bailly, F., Longo., G. *Mathématiques et sciences de la nature. La singularité physique du vivant.* Paris, 2006.

Girard, J. - Y. *Le Point Aveugle I : Vers la Perfection.* Paris, 2006.

Girard, J. - Y. *Le Point Aveugle II : Vers l'Imperfection.* Paris, 2007.

Franceschelli, S., Roque, T., Paty, M. *Chaos et systèmes dynamiques : Eléments pour une épistémologie.* Paris, 2007.

Ricard, J. *Pourquoi le tout est plus que la somme de ses parties.* Paris, 2008.

Collectif. *Ouvrir la logique au monde. Philosophie et mathématique de l'interaction.* Édité par J.-B. Joinet et S. Tronçon. Paris, 2009.

Bächtold, M. *L'interprétation de la mécanique quantique. Une approche pragmatiste.* Paris, 2009.

Malaterre, C. *Les Origines de la vie : émergence ou explication réductive ?* Paris, 2010.

Barbara, J. - G. *Le Paradigme neuronal : De la Physiologie expérimentale à la cognition.* Paris, 2010.

Varenne, F. *Formaliser le vivant : Lois, théories, modèles ?* Paris, 2010.

Collectif, *La Transdisciplinarité. Comment explorer les nouvelles interfaces.* Édité par C. Debru. Paris, 2011.

Kauark-Leite, P. *Théorie quantique et philosophie transcendantale : dialogues possibles.* Paris, 2012.

Cavazzini, A. *Signes, formes, gestes : Études sur les régimes symboliques des sciences.* Paris, 2012.

d'Alessio, P. *et al.* *La sinuosité du vivant.* Paris, 2012.

Fraisopi, F. *La Complexité et les Phénomènes. Nouvelles ouvertures entre science et philosophie.* Paris, 2012.

Lanciani, A. A. *Analyse phénoménologique du concept de probabilité.* Paris, 2012.

Poinat, S. *Mécanique quantique. Du formalisme mathématique au concept philosophique.* Paris, 2014.

Gualandi, A. *L'Œil, la main et la voix.* Paris, 2014.

Gens, H. *Jakob von Uexküll, explorateur des milieux vivants.* Paris, 2014.

Miquel, P. - A. *Sur le concept de Nature.* Paris, 2015.

Benoist, J., Paul. T. *Le Presque.* Paris, 2015.

Bitbol, M. *La pratique des possibles.* Paris, 2015.

Cavazzini, A. *Sciences de la vie, mathesis, infini.* Paris, 2016.

Lestocart, L. - J. *Esthétique de la complexité – Pour un cognitivisme non-linéaire.* Paris, 2017.

Nouvelles visions des sciences — Spartacus Idh

Longo, G. (éd.) *Lois des dieux, des hommes et de la nature.* Paris 2017.

Séguy-Duclot, A. *Généalogie des mathématiques.* Paris 2019.

Charaud, N. *Georg Cantor – Infini et inconscient.* Paris 2019.

Bouleau, N. *Introduction à la philosophie des sciences.* Paris 2020.

Cantor, G. *Sur les fondements de la théorie des ensembles transfinis*, notes et préface de F. Zalamea, Paris 2020.

André, Y. *Dix regards sur la mathématique contemporaine.* Paris 2021.

Paul T., Schmidt M. (éds) *Rigueur.* Paris 2021.

Vulpiani, A. *Hasard, probabilité et complexité.* Paris 2021.

Illustration de couverture

A woman has fallen asleep while playing solitaire, with her head laid down on the cards on the table, photo by W. E. Daugherty, 1904.

N° d'édition : 331338343-1
Dépôt légal : juin 2021
Achevé d'imprimer : juin 2021

Imprimé en France par

AQUIPRINT

33520 Bruges
www.impression-edition-gironde.com